

东北林业大学

2015—2016 学年第 1 学期 阶段考试试题

考试科目： 线性代数

试卷总分： 100 分

考试时间： 90 分钟

占总评比例： 30%

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 卷面分 |
|------|---|---|---|-----|
| 得分 | | | | |
| 评卷教师 | | | | |

得分 一、填空题（本大题共 8 小题，每空 2 分，总计 20 分）

1、排列 1,3,5,7,2,4,6,8 的逆序数是多少： 6；

2、行列式 $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \underline{-24}$ ； $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (1 \ 2 \ 3)$ ，则 $A^{100} = 6^{99} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

3、设 $|A_{3 \times 3}| = 5$ ，则 $|2A| = \underline{40}$ ；设 $|B_{n \times n}| = 2$ ， $|C_{n \times m}| = 3$ ，则 $|BC^{-1}| = \underline{\frac{2}{3}}$

4、设方阵 A 满足 $A^2 - A - 2E = 0$ ，则 $A^{-1} = \underline{\frac{A-E}{2}}$ ；

5、设 $a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0$ ，则 $\begin{pmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & \ddots \\ & & & a_n \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} a_1^{-1} & & \\ & a_2^{-1} & \\ & & \ddots \\ & & & a_n^{-1} \end{pmatrix}$ ；

6、设 A 和 B 分别是 m 阶和 n 阶矩阵，令 $P = \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}$ ，则 $P^T = \begin{pmatrix} 0 & B^T \\ A^T & 0 \end{pmatrix}$ ；

7、齐次线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 - x_2 = 0 \\ (2\lambda + 1)x_1 + \lambda x_2 = 0 \end{cases}$ 有非零解，参数 λ 满足： $\lambda = \underline{-1}$ ；

8、行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \underline{16}$ 。

| | |
|----|--|
| 得分 | |
|----|--|

二、证明题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，总计 20 分）

1、设 A, B 都是 n 阶矩阵，且 A 是对称阵， $P = B^T AB$ ，（1）证明 P 是对称阵；（2）证明 P^2 是对称阵；（3）令 $f(x) = x^2 + x - 2$ ，证明 $f(P)$ 是对称阵。

证明：（1）由已知 A 是对称阵，所以 $P^T = (B^T AB)^T = B^T A^T (B^T)^T = B^T AB = P$ ；

$$(2) \quad (P^2)^T = (PP)^T = P^T P^T = PP = P^2$$

$$(3) \quad f(P) = P^2 + P - 2E,$$

$$\text{所以 } f(P)^T = (P^2 + P - 2E)^T = (P^2)^T + P^T - (2E)^T = (P^2 + P - 2E) = f(P)$$

2、设 $n (n \geq 2)$ 阶方阵 A 可逆，

（1）证明其伴随矩阵 A^* 也可逆；（2）如果 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ ，求 A 。

（1）证明： $AA^* = |A|E_n$ ，所以 $|A^*| = |A|^{n-1} \neq 0$ ，故 A^* 也可逆；

（2） $A = |A|(A^*)^{-1}$ ，由 $|A^*| = -2$ ，可知 $|A| = -2$ ，从而 $A = -2(A^*)^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$

或： A 为二阶矩阵，故 $A^* = \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ ，所以 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$

| | |
|----|--|
| 得分 | |
|----|--|

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 15 分，总计 60 分）

1、设 $D_n = \begin{vmatrix} x & a & \cdots & a \\ a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & \cdots & x \end{vmatrix}$, (1) 求 D_n 的值; (2) 令 $a=2$, 求 $D_n=0$ 的根。

解: D_n 所有列加到第 1 列 $\begin{vmatrix} x+(n-1)a & a & \cdots & a \\ x+(n-1)a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x+(n-1)a & a & \cdots & x \end{vmatrix}$

$$= [x+(n-1)a] \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots \\ 1 & x-a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \cdots & x-a \end{vmatrix} = [x+(n-1)a](x-a)^{n-1}$$

(2) 当 $n=1$ 时, $D_n = x = 0 \Rightarrow x=0$

当 $n>1$ 时, $D_n = [x+2(n-1)](x-2)^{n-1} = 0 \Rightarrow x = -2(n-1)$ 或 $x=2$

2、设 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 4 \\ 4 & 1 & -1 & 16 \\ 8 & -1 & 1 & 64 \end{vmatrix}$, (1) 求 D 的值; (2) 求 $2A_{41} + 2A_{42} + 2A_{43} + A_{44}$ 的值。

解: (1) $D = (4-2)(4+1)(4-1)(1-2)(1+1)(-1-2) = 180$

(2) $2A_{41} + 2A_{42} + 2A_{43} + A_{44} = -A_{44} = -\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -(1-2)(1+1)(-1-2) = -6$

课程名称:

班级:

学号

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

姓名:

3、设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 1 \end{pmatrix}$, (1) 求 $|A|$; (2) 求 A^{-1} ; (3) 求 A^2 及 A^{2n}

解: (1) $|A| = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = -25$

(2) $A^{-1} = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}^{-1} & \\ & \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{25} & \frac{4}{25} & 0 & 0 \\ \frac{4}{25} & \frac{-3}{25} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 1 \end{pmatrix}$

(3) $A^2 = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}^2 & \\ & \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 25 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 25 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 10 & 1 \end{pmatrix}$

$A^{2n} = \begin{pmatrix} 25 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 25 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 10 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 25^n & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 25^n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5n & 1 \end{pmatrix}$

4、设 $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, $\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $AP = P\Lambda$, (1) 求 P^{-1} ; (2) 求 A ; (3) 求 A^n 。

解: (1) $|P| = 2$, $P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

(2) $A = P\Lambda P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$

(3) $A = P\Lambda^n P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 - 2^{n+1} & 2^{n+1} - 2 \\ 4 - 2^{n+2} & 2^{n+2} - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 2^n & 2^n - 1 \\ 2 - 2^{n+1} & 2^{n+1} - 1 \end{pmatrix}$