



CÁLCULO

FICHA 8

Integração usando substituição

1. Calcule as seguintes primitivas, usando a substituição aconselhada em cada caso.

(a) $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx.$

Esta é uma função do tipo $R(x, \sqrt{a^2 - b^2 x^2})$ com $a = b = 1$, pelo que a substituição aconselhada é $x = \sin(t)$.

Seja $g : [\alpha, \beta] \rightarrow [1, 2]$ definida por $g(t) = \sin t$. Então $g'(t) = \cos t$. Quantos aos extremos de integração, tem-se

$$\begin{cases} x = 0 \\ x = \sin t \Leftrightarrow t = \arcsin x \end{cases} \Rightarrow t = \arcsin 0 = 0$$
$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ x = \sin t \Leftrightarrow t = \arcsin x \end{cases} \Rightarrow t = \arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$$

Então

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sin^2(t)}{\sqrt{1-\sin^2(t)}} \cos(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sin^2(t)}{|\cos(t)|} \cos(t) dt$$

Como $\cos(t) > 0$, para $t \in [0, \frac{\pi}{6}]$,

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sin^2(t)}{\cos(t)} \cos(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin^2(t) dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \left(\frac{1 - \cos(2t)}{2} \right) dt = \frac{1}{2} \left[t - \frac{\sin(2t)}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{6}} \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{\pi}{6} - \frac{\sin(\frac{\pi}{3})}{2} - \left(-\frac{\sin(0)}{2} \right) \right] = \frac{2\pi - 3\sqrt{3}}{24} \end{aligned}$$

(b) $\int_{-3}^0 x (x+3)^{\frac{1}{3}} dx.$

Esta é uma função do tipo $R(x, (ax+b)^{p/q})$ com $a = 1$, $b = 3$, $p = 1$ e $q = 3$, pelo que a substituição aconselhada é $(ax+b) = (x+3) = t^m$, onde $m = \text{m.m.c}(3) = 3$, ou seja, $x+3 = t^3$.

Seja $g : [\alpha, \beta] \rightarrow [-3, 0]$ definida por $g(t) = t^3 - 3$. Então $g'(t) = 3t^2$. Quantos aos extremos de integração, tem-se

$$\begin{cases} x = -3 \\ x = t^3 - 3 \Leftrightarrow t = \sqrt[3]{x+3} \end{cases} \Rightarrow t = \sqrt[3]{-3+3} = 0$$
$$\begin{cases} x = 0 \\ x = t^3 - 3 \Leftrightarrow t = \sqrt[3]{x+3} \end{cases} \Rightarrow t = \sqrt[3]{0+3} = \sqrt[3]{3}$$

Então

$$\begin{aligned}
 \int_{-3}^0 x (x+3)^{\frac{1}{3}} dx &= \int_0^{\sqrt[3]{3}} (t^3-3) (t^3)^{\frac{1}{3}} 3t^2 dt = \int_0^{\sqrt[3]{3}} (t^3-3) t 3t^2 dt \\
 &= 3 \int_0^{\sqrt[3]{3}} (t^6-3t^3) dt = 3 \left[\frac{t^7}{7} - \frac{3t^4}{4} \right]_0^{\sqrt[3]{3}} \\
 &= 3 \left[\frac{(\sqrt[3]{3})^7}{7} - \frac{3(\sqrt[3]{3})^4}{4} - 0 \right] = 3 \left[\frac{9\sqrt[3]{3}}{7} - \frac{9\sqrt[3]{3}}{4} - 0 \right] \\
 &= -\frac{81}{28} \sqrt[3]{3}
 \end{aligned}$$

(c) $\int_2^8 \frac{\sqrt{x}}{x - \sqrt[3]{x}} dx.$

Esta é uma função do tipo $R(x, x^{p/q}, x^{r/s})$ com $p = 1$, $q = 2$, $r = 1$, $s = 3$ pelo que a substituição aconselhada é $x = t^m$, onde $m = \text{m.m.c}(2, 3) = 6$, ou seja, $x = t^6$.

Seja $g : [\alpha, \beta] \rightarrow [2, 8]$ definida por $g(t) = t^6$. Então $g'(t) = 6t^5$. Quanto aos extremos de integração, tem-se

$$\begin{cases} x = 2 \\ x = t^6 \Leftrightarrow t = \sqrt[6]{x} \end{cases} \Rightarrow t = \sqrt[6]{2}$$

$$\begin{cases} x = 8 \\ x = t^6 \Leftrightarrow t = \sqrt[6]{x} \end{cases} \Rightarrow t = \sqrt[6]{8}$$

Então

$$\int_2^8 \frac{\sqrt{x}}{x - \sqrt[3]{x}} dx = \int_{\sqrt[6]{2}}^{\sqrt[6]{8}} \frac{\sqrt{t^6}}{t^6 - \sqrt[3]{t^6}} 6t^5 dt = \int_{\sqrt[6]{2}}^{\sqrt[6]{8}} \frac{t^3}{t^6 - t^2} 6t^5 dt = 6 \int_{\sqrt[6]{2}}^{\sqrt[6]{8}} \frac{t^6}{t^4 - 1} dt$$

Como não se trata de uma fracção simples e o grau do numerador é maior que o grau do denominador, vamos efectuar a divisão

$$\left. \begin{array}{l} t^6 + 0t^5 + 0t^4 + 0t^3 + 0t^2 + 0t + 0 \\ -t^6 + 0t^5 + 0t^4 + 0t^3 + t^2 + 0t + 0 \\ \hline 0t^6 + 0t^5 + 0t^4 + 0t^3 + t^2 + 0t + 0 \end{array} \right| \frac{t^4 - 1}{t^2}$$

Assim, podemos escrever

$$\frac{t^6}{t^4 - 1} = t^2 + \frac{t^2}{t^4 - 1} = t^2 + \frac{t^2}{(t^2 - 1)(t^2 + 1)}$$

Como o denominador da última fracção racional tem raízes 1 e -1 (ambas de multiplicidade 1), e $\pm i$, tem-se

$$\frac{t^2}{(t^2 - 1)(t^2 + 1)} = \frac{A}{t - 1} + \frac{B}{t + 1} + \frac{Cx + D}{t^2 + 1}$$

onde $A = 1/4$, $B = -1/4$ e $C = 1/2$. Portanto

$$t^2 + \frac{t^2}{(t^2 - 1)(t^2 + 1)} = t^2 + \frac{1}{4(t - 1)} - \frac{1}{4(t + 1)} + \frac{1}{2(t^2 + 1)}$$

e

$$\begin{aligned}
\int_2^8 \frac{\sqrt{x}}{x - \sqrt[3]{x}} dx &= 6 \int_{\sqrt[6]{2}}^{\sqrt[6]{8}} \left(t^2 + \frac{1}{4(t-1)} - \frac{1}{4(t+1)} + \frac{1}{2(t^2+1)} \right) dt \\
&= 6 \left[\frac{t^3}{3} + \frac{1}{4} \ln |t-1| - \frac{1}{4} \ln |t+1| + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} t \right]_{\sqrt[6]{2}}^{\sqrt[6]{8}} \\
&= 6 \left[\begin{aligned} &\frac{\sqrt[6]{8}^3}{3} + \frac{1}{4} \ln |\sqrt[6]{8} - 1| - \frac{1}{4} \ln |\sqrt[6]{8} + 1| + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \sqrt[6]{8} \\ &- \left(\frac{\sqrt[6]{2}^3}{3} + \frac{1}{4} \ln |\sqrt[6]{2} - 1| - \frac{1}{4} \ln |\sqrt[6]{2} + 1| + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \sqrt[6]{2} \right) \end{aligned} \right] \\
&= 6 \left[\begin{aligned} &\frac{2\sqrt[6]{2}}{3} + \frac{1}{4} \ln |\sqrt[6]{8} - 1| - \frac{1}{4} \ln |\sqrt[6]{8} + 1| + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \sqrt[6]{8} \\ &- \left(\frac{\sqrt[6]{2}}{3} + \frac{1}{4} \ln |\sqrt[6]{2} - 1| - \frac{1}{4} \ln |\sqrt[6]{2} + 1| + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \sqrt[6]{2} \right) \end{aligned} \right]
\end{aligned}$$

(d) $\int_0^1 \frac{3^x}{3^{2x} - 3^x - 2} dx.$

Esta é uma função do tipo $R(x, 3^x, 3^{2x})$ pelo que a substituição aconselhada é $3^{mx} = t$, onde $m = \text{m.d.c}(1, 2) = 1$, ou seja, $3^x = t$.

Seja $g : [\alpha, \beta] \rightarrow [0, 1]$ definida por $g(t) = \log_3 t$. Então $g'(t) = \frac{1}{t \ln 3}$. Quantos aos extremos de integração, tem-se

$$\begin{cases} x = 0 \\ x = \log_3 t \Leftrightarrow t = 3^x \end{cases} \Rightarrow t = 3^0 = 1$$

$$\begin{cases} x = 1 \\ x = \log_3 t \Leftrightarrow t = 3^x \end{cases} \Rightarrow t = 3^1 = 3$$

Então

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \frac{3^x}{3^{2x} - 3^x - 2} dx &= \int_1^3 \frac{t}{t^2 - t - 2} \cdot \frac{1}{t \ln 3} dt = \frac{1}{\ln 3} \int_1^3 \frac{1}{t^2 - t - 2} dt \\
&= \frac{1}{\ln 3} \int_1^3 \frac{1}{(t-2)(t+1)} dt = \frac{1}{\ln 3} \int_1^3 \left[\frac{1}{3(t-2)} - \frac{1}{3(t+1)} \right] dt \\
&= \frac{1}{\ln 3} \left[\frac{1}{3} \ln |t-2| - \frac{1}{3} \ln |t+1| \right]_1^3 \\
&= \frac{1}{\ln 3} \left[\begin{aligned} &\frac{1}{3} \ln |3-2| - \frac{1}{3} \ln |3+1| \\ &- \left(\frac{1}{3} \ln |1-2| - \frac{1}{3} \ln |1+1| \right) \end{aligned} \right] \\
&= \frac{1}{\ln 3} \left[\begin{aligned} &\frac{1}{3} \ln 1 - \frac{1}{3} \ln 3 \\ &- \left(\frac{1}{3} \ln 1 - \frac{1}{3} \ln 2 \right) \end{aligned} \right] = \frac{1}{\ln 3} \left[-\frac{1}{3} \ln 3 + \frac{1}{3} \ln 2 \right] \\
&= -\frac{1}{3} + \frac{1 \ln 2}{3 \ln 3}
\end{aligned}$$

(e) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 9}}.$

Esta é uma função do tipo $R(x, \sqrt{x^2 + 9})$ pelo que a substituição aconselhada é $x = \sinh(t)$.

Seja $g : [\alpha, \beta] \rightarrow [0, 1]$ definida por $g(t) = 3 \sinh t$. Então $g'(t) = 3 \cosh t$. Quantos aos extremos de integração, tem-se

$$\begin{cases} x = 0 \\ x = 3 \sinh t \Leftrightarrow t = \operatorname{argsenh} x \end{cases} \Rightarrow t = \operatorname{argsenh} 0 = \ln(0 + \sqrt{1+0}) = 0$$

$$\begin{cases} x = 1 \\ x = 3 \sinh t \Leftrightarrow t = \operatorname{argsenh} x/3 \end{cases} \Rightarrow t = \operatorname{argsenh} 1/3 = \ln(1/3 + \sqrt{1+1/9}) = \ln(1 + \sqrt{10/9})$$

Então

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x^2+9}} &= \int_0^{\ln(1+\sqrt{10/9})} \frac{1}{\sqrt{9 \sinh^2(t)+9}} 3 \cosh(t) dt \\ &= \int_0^{\ln(1+\sqrt{10/9})} \frac{1}{|3 \cosh(t)|} 3 \cosh(t) dt\end{aligned}$$

Como $\cosh(t) > 0, \forall t \in [0, +\infty[$

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x^2+9}} &= \int_0^{\ln(1+\sqrt{10/9})} 1 dt \\ &= [t]_0^{\ln(1+\sqrt{10/9})} = \ln(1 + \sqrt{10/9})\end{aligned}$$