贝叶斯方法先确定后验，抽样与近似发生在计算环节

蓝灰：共同内核或保留部分　　珊瑚红：替换、增加或组合的位置

(a) 内核：先验 × 似然 → 后验 → 按损失函数给出估计

先验 π(θ) × 样本似然 L(θ;t) → $\pi(\theta|t) \propto L(\theta;t)\pi(\theta)$ → 平方损失 → 后验均值

改变先验或允许的参数域，会改变统计模型；Gibbs、MH与Laplace主要用于计算既定后验。

(b) 改计算：在同一后验结构中改更新器

更新形状β → 更新尺度η → 更新位置γ

Green → 本地Teimouri版本：
位置更新由拒绝抽样改为MH。

其位置先验域也有改变，需另行标记。
本地预印本的提议支持域问题仍保留，
不把有限链图当作已正确覆盖整个后验。

(c) 改目标：Hall–Wang连接罚似然

$$p(\gamma) = \frac{t_{(1)} - \gamma}{t_{(2)} - \gamma}$$

经验因子 × 剖面似然 → 最大化

这里输出修正目标的最大值位置；
与按整个后验求均值的估计规则不同。
共同思想可以连接，最终判据要保留。

Laplace近似与Gibbs抽样：计算后验量的两种途径；不能只凭算法名称将它们当作独立统计原理。

依据：182-144 / 129、182-006 / 128、182-143。后验可积性、均值存在性与计算支持域均须按模型核验。