

Тестовые задания к экзамену

Дополнительные главы математического анализа
(по материалам объединённых лекций и практик)

Подготовил решение: Решетников Сергей P3208 @ReshNF

Поставить звёздочку

Функции нескольких переменных: основные понятия

1. Что называется ε -окрестностью точки $P_0 \in \mathbb{R}^n$
Ответ: $\{P : \rho(P, P_0) < \varepsilon\}$ (A)
2. Точка P_0 называется точкой сгущения множества M , если:
Ответ: в любой окрестности P_0 есть точки M , отличные от P_0 (C)
3. Множество называется связным, если
Ответ: любые две точки можно соединить непрерывной кривой, лежащей в множестве (C)
4. Верно ли: любое открытое множество состоит только из внутренних точек?
Ответ: Да (A)
5. Верно ли: всякое замкнутое множество в \mathbb{R}^n является ограниченным?
Ответ: Нет (B)

Предел функции нескольких переменных. Повторные и двойной пределы

6. Запись $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = A$ означает:
Ответ: $f(P)$ стремится к A при $P \rightarrow P_0$ по любому пути (A)
7. Какое утверждение корректно?
Ответ: Двойной предел существует \Rightarrow любой повторный существует и равен ему (D)
8. Условие непрерывности f в точке P_0 :
Ответ: $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = f(P_0)$ (B)
9. Если при подходе к P_0 по двум различным кривым пределы различны, то:
Ответ: двойного предела не существует (B)
10. Если двойной предел существует и равен A , то предел по любой кривой, стремящейся к P_0 , равен:
Ответ: A (B)

Частные производные: определение и смысл

11. Частная производная $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ - это
Ответ: $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$ (B)
12. Геометрический смысл $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ для поверхности $z = f(x, y)$
Ответ: наклон касательной к сечению плоскостью $y = y_0$ (A)

13. Что верно?

Ответ: Дифференцируемость гарантирует существование частных производных (В)

14. Если в точке существуют частные производные, но функция не непрерывна, то функция:

Ответ: может быть дифференцируема или нет (нужно проверять определение) (С)

15. Верно ли: если частные производные непрерывны в окрестности точки, то функция дифференцируема в этой точке?

Ответ: Да (А)

Дифференцируемость и полный дифференциал

16. Дифференцируемость $f(x, y)$ в точке эквивалентна представлению:

Ответ: $\Delta f = f_x \Delta x + f_y \Delta y + o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})$ (В)

17. Полный дифференциал df функции $f(x, y)$ равен:

Ответ: $df = f_x dx + f_y dy$ (С)

18. Что верно?

Ответ: df линейно по (dx, dy) (В)

19. Если f дифференцируема, то при малых приращениях:

Ответ: Δf лучше аппроксимируется df (А)

20. Верно ли: непрерывность частных производных в окрестности точки является достаточным условием дифференцируемости?

Ответ: Да (А)

Касательная плоскость и нормаль к поверхности

21. Для поверхности $F(x, y, z) = 0$ уравнение касательной плоскости в точке P_0 имеет вид:

Ответ: $F_{x(P_0)}(x - x_0) + F_{y(P_0)}(y - y_0) + F_{z(P_0)}(z - z_0) = 0$ (В)

22. Нормальный вектор к поверхности $F(x, y, z) = 0$ в точке P_0 :

Ответ: $(F_x, F_y, F_z)|_{\{P_0\}}$ (В)

23. Что описывает нормаль к поверхности в точке P_0 ?

Ответ: прямую, проходящую через P_0 и параллельную градиенту F (В)

24. Для сферы $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ нормаль в точке $P_0(x_0, y_0, z_0)$ параллельна:

Ответ: (x_0, y_0, z_0) (D)

25. Верно ли: если $\nabla F(P_0) = 0$, то касательная плоскость по стандартной формуле не определяется?

Ответ: Да (А)

Экстремум функции двух переменных: стационарные точки

26. Стационарная точка $f(x, y)$ - это точка, где:

Ответ: $f_x = f_y = 0$ (В)

27. В достаточных условиях экстремума используется величина:
Ответ: $D = AC - B^2$ (В)
28. Если в стационарной точке $D < 0$, то:
Ответ: седло (экстремума нет) (С)
29. Если функция дифференцируема в замкнутой области, то глобальные экстремумы достигаются:
Ответ: в стационарных точках и/или на границе (С)
30. Верно ли: из существования стационарной точки следует существование локального экстремума?
Ответ: Нет (В)

Наибольшее и наименьшее значения на замкнутой области

31. Для непрерывной функции на ограниченной замкнутой области верно:
Ответ: имеет и максимум, и минимум (С)
32. Где нужно искать глобальные экстремумы дифференцируемой функции в замкнутой области?
Ответ: в критических точках и на границе (С)
33. Что означает проверка значений функции на границе области?
Ответ: сведение к задаче одной переменной (В)
34. Верно ли: если на границе нет критических точек (как у функции одной переменной), то достаточно значений на концах параметрического отрезка?
Ответ: Да (А)
35. Верно ли: глобальный экстремум в замкнутой области не может достигаться в точке, где функция не определена?
Ответ: Да (А)

Мера Жордана. Площадь области

36. Мера Жордана области (в плоском случае) связана с:
Ответ: площадью области (В)
37. Область (в контексте кратных интегралов) — это:
Ответ: открытое связное множество (В)
38. Для существования двойного интеграла в смысле Римана–Жордана требуется:
Ответ: область имеет меру Жордана и функция ограничена (В)
39. Если $f(x, y) = 1$, то $\iint_D 1 \cdot dx dy$ равен:
Ответ: площади D (В)
40. Верно ли: если область D не является жордановой, то классическое определение двойного интеграла может быть неприменимо?
Ответ: Да (А)

Двойной интеграл и сведение к повторному

41. Двойной интеграл определяется как:

Ответ: предел интегральных сумм при измельчении разбиения (В)

42. Формула сведения к повторному интегралу для области типа I (по x):

Ответ: $\int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$ (А)

43. Теорема о среднем значении для двойного интеграла утверждает:

Ответ: $\int \int_D f \cdot dxdy = f(x^* *, y^* *) \cdot S_D$ (В)

44. Изменение порядка интегрирования применяется, когда:

Ответ: область удобнее описать другим способом (А)

45. Верно ли: при корректной перестройке области значение двойного интеграла не меняется?

Ответ: Да (А)

Криволинейные координаты. Якобиан

46. Якобиан перехода $(u, v) \rightarrow (x, y)$ равен:

Ответ: $\det \begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix}$ (В)

47. Условие взаимно-однозначного соответствия внутри области:

Ответ: $J \neq 0$ (В)

48. Что происходит с ориентацией обхода контура при $J < 0$?

Ответ: меняется на противоположную (В)

49. При переходе к полярным координатам элемент площади равен:

Ответ: $rdrd\varphi$ (В)

50. Верно ли: если якобиан обращается в нуль в точках области, стандартная формула замены требует отдельной проверки?

Ответ: Да (А)

Площадь в криволинейных координатах

51. Идея вывода формулы площади через (u, v) состоит в том, что:

Ответ: разбивают образ прямоугольной сеткой и переносят элемент площади через якобиан (В)

52. Какой множитель появляется при переходе к криволинейным координатам в двойном интеграле?

Ответ: $|J|$ (В)

53. Сферические координаты (r, φ, θ) имеют якобиан вида:

Ответ: $r^2 \sin \theta$ (В)

54. При переходе к цилиндрическим координатам (ρ, φ, z) элемент объёма равен:

Ответ: $\rho d\rho d\varphi dz$ (В)

55. Верно ли: при вычислении площади или объёма всегда используется модуль якобиана?

Ответ: Да (А)

Тройной интеграл и сведение к повторному

56. Тройной интеграл определяется как:

Ответ: предел интегральных сумм по разбиению объёма (В)

57. Сведение тройного интеграла к повторному записывается как:

Ответ: $\int dx \int dy \int dz \cdot f(x, y, z)$ (А)

58. При переходе к цилиндрическим координатам в \mathbb{R}^3 верно:

Ответ: $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$, $z = z$ (А)

59. При вычислении тройного интеграла в цилиндрических координатах появляется множитель:

Ответ: ρ (А)

60. Верно ли: пределы интегрирования по ρ , φ , z определяются проекцией тела и ограничивающими поверхностями?

Ответ: Да (А)

Криволинейные интегралы первого рода: длина кривой

61. Длина кривой AB определяется как:

Ответ: точная верхняя грань периметров вписанных ломаных (В)

62. Кривая называется спрямляемой, если:

Ответ: её длина конечна (С)

63. Аддитивность длины утверждает:

Ответ: $L(AB) = L(AC) + L(CB)$ при C между A и B (В)

64. Формула длины при параметрическом задании $x = x(t)$, $y = y(t)$:

Ответ: $\int_{t_1}^{t_2} \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$ (А)

65. Формула длины для $y = y(x)$ на $[a, b]$:

Ответ: $\int_a^b \sqrt{1 + (y'_x)^2} dx$ (А)

Криволинейный интеграл 1 рода: определение и вычисление

66. Криволинейный интеграл 1 рода $\int_L f dS$ определяется как:

Ответ: предел сумм $\sum f(\xi_i, \eta_i) \Delta S_i$ (А)

67. При параметрическом задании кривой интеграл 1 рода равен:

Ответ: $\int f(x(t), y(t)) \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$ (В)

68. При задании $y = y(x)$ формула имеет вид:

Ответ: $\int_a^b f(x, y) \sqrt{1 + (y'_x)^2} dx$ (В)

69. Верно ли: криволинейный интеграл 1 рода зависит от ориентации кривой?

Ответ: Нет (В)

70. При полярном задании $\rho = \rho(\varphi)$ дифференциал дуги содержит:

Ответ: $\sqrt{(\rho'_\varphi)^2 + \rho^2} d\varphi$ (А)

Сведение криволинейного интеграла 1 рода к определённому

71. Связь $\int_L f dS$ с определённым интегралом основана на:
Ответ: разбиении кривой на дуги и пределе интегральных сумм (В)
72. Если кривая задана параметром t , то $dS =$
Ответ: $\sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$ (В)
73. При выборе параметра как длины дуги ℓ справедливо:
Ответ: $dS = d\ell$ (А)
74. Верно ли: формулы интеграла 1 рода зависят от способа задания кривой?
Ответ: Да (А)
75. Если $f \equiv 1$, то $\int_L 1 dS$ равен:
Ответ: длине кривой L (В)

Поверхности. Двусторонние поверхности. Элемент площади

76. Поверхность называется двусторонней, если:
Ответ: при обходе замкнутого контура нормаль возвращается к исходному направлению (В)
77. Классический пример односторонней поверхности:
Ответ: лист Мёбиуса (С)
78. При параметризации поверхности направляющие косинусы нормали выражаются через:
Ответ: определители из производных по u и v (В)
79. Верно ли: поверхностный интеграл 1 рода — предел сумм $\sum f(M_i) \Delta S_i$?
Ответ: Да (А)
80. Верно ли: поверхностный интеграл 1 рода не зависит от ориентации нормали?
Ответ: Да (А)

Векторные операторы: grad, div, rot и тождества

81. Оператор $\operatorname{div} \vec{A}$ по смыслу соответствует:
Ответ: мере источниковости поля (В)
82. Оператор $\operatorname{rot} \vec{A}$ по смыслу соответствует:
Ответ: локальной вихревости поля (А)
83. Какое тождество верно?
Ответ: $\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - (\nabla \cdot \nabla) \vec{A}$ (А)
84. Формула $\operatorname{div}(\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot \operatorname{rot} \vec{A} - \vec{A} \cdot \operatorname{rot} \vec{B}$ относится к:
Ответ: тождествам векторного анализа (В)
85. Верно ли: для потенциального поля $\vec{A} = \nabla \varphi$ выполняется $\operatorname{rot} \vec{A} = \operatorname{vec} 0$?
Ответ: Да (А)