

# Appunti geometria

Nicola Ferru

25 gennaio 2023



# Indice

0.1	Premesse...	7
0.2	Simboli	8
<b>1</b>	<b>Vettori</b>	<b>9</b>
1.1	Spazio Vettoriale	9
<b>2</b>	<b>Numeri Complessi</b>	<b>11</b>
2.1	Operazioni con Numeri complessi	11
<b>3</b>	<b>Il determinante</b>	<b>13</b>
3.1	Richiami sulle permutazioni	13
3.2	La definizione di determinante	14
3.3	La formula di Laplace	16
3.4	Proprietà del determionante	18



# Elenco delle tabelle



# Elenco delle figure

## 0.1 Premesse...

In questo repository sono disponibili pure le dimostrazioni grafiche realizzate con *Geogebra* consiglio a tutti di dargli un'occhiata e di stare attenti perché possono essere presenti delle modifiche per migliorare il contenuto degli stessi appunti, comunque solitamente vengono fatte revisioni tre/quattro volte alla settimana perché sono in piena fase di sviluppo. Ricordo a tutti che questo è un progetto volontario e che per questo motivo ci potrebbero essere dei rallentamenti per cause di ordine superiore e quindi potrebbero esserci meno modifiche del solito oppure potrebbero esserci degli errori, chiedo la cortesia a voi lettori di contattarmi per apportare una modifica. Tengo a precisare che tutto il progetto è puramente open source e infatti sono disponibili i sorgenti dei file allegati insieme ai PDF.

Cordiali saluti

## 0.2 Simboli

$\in$ Appartiene	$\Rightarrow$ Implica	$\beta$ beta
$\notin$ Non appartiene	$\iff$ Se e solo se	$\gamma$ gamma
$\exists$ Esiste	$\neq$ Diverso	$\Gamma$ Gamma
$\exists!$ Esiste unico	$\forall$ Per ogni	$\delta, \Delta$ delta
$\subset$ Contenuto strettamente	$\ni$ : Tale che	$\epsilon$ epsilon
$\subseteq$ Contenuto	$\leq$ Minore o uguale	$\sigma, \Sigma$ sigma
$\supset$ Contenuto strettamente	$\geq$ Maggiore o uguale	$\rho$ rho
$\supseteq$ Contiene	$\alpha$ alfa	



# Capitolo 1

## Vettori

### 1.1 Spazio Vettoriale

**Spazio Vettoriale 1.** *Uno spazio vettoriale reale ( $R$ -spazio vettoriale) è un insieme  $V$  in cui sono definite un'operazione di **SOMMA** tra elementi di  $V$  e un'operazione di **Prodotto tra un reale e un elemento di  $V$**  che soddisfano 8 proprietà:*

1. La somma è associativa quando  $\forall v_1, v_2, v_3 \in V \quad (v_1 + v_2) + v_3 = v_1 + (v_2 + v_3)$ ;
2. La somma è commutativa quando  $\forall v_1, v_2 \in V \quad v_1 + v_2 = v_2 + v_1$
3. Esistenza elemento neutro  $0$  se e solo se  $\forall v \in V \quad v + 0 = 0 + v = v$
4. Esistenza opposto  $-v$  se e solo se  $\forall v \in V \quad v + (-v) = (-v) + v = 0$
5. Il prodotto per uno scalare è assoluto quando  $\forall c_1, c_2 \in R, \forall v \in V \quad c_1(c_2v) = (c_1c_2)v$
6. Il prodotto per uno scalare è distributiva quando  $\forall c_1, c_2 \in R, \forall v \in V \quad (c_1 + c_2)v = c_1v + c_2v$
7. Il prodotto per uno scalare è distributiva quando  $\forall c \in R, \forall v_1, v_2 \in V \quad c(v_1 + v_2) = cv_1 + cv_2$
8. Esistenza elemento neutro  $1$  quando  $\forall v \in V \quad 1v = v$

**ES:**  $V_0^2 \quad V_0^3$

**ES:**  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad x^2, \quad g(x) = e^x, \quad f(x) + g(x) = x^2 + e^x \quad 3f(x) = 3x^2$

**ES:**  $\mathbb{R}^n$  n-uple di numeri reali

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{bmatrix} \quad C \in \mathbb{R} \quad c \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cx_1 \\ cx_2 \\ \vdots \\ cx_n \end{bmatrix}$$

**ES:**  $\mathbb{R}_n[x]$  polinomi di grado  $\leq n$  nella variabile  $x$  a coefficiente reale

- $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$
- $q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots + b_nx^n$

**ES:**  $\mathbb{R}[x]$  polinomio di grado qualsiasi

$$\begin{aligned} p(x) + q(x) &= a_0 + b_0 + (a_1 + b_1)x + \dots + (a_n + b_n)x^n \\ c \in \mathbb{R}, \quad cp(x) &= ca_0 + ca_1x + ca_2x^2 + \dots + ca_nx^n \end{aligned}$$



## Capitolo 2

# Numeri Complessi

**Numeri reali 1.** *Un numero complesso è definito come un numero della forma  $x + iy$ , con  $x$  e  $y$  numeri reali e  $i$  una soluzione dell'equazione  $x^2 = -1$  detta unità immaginaria. i numeri reali sono*

### 2.1 Operazioni con Numeri complessi

1. Modulo e distanza

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} \tag{2.1}$$

Il valore assoluto (modulo) ha proprietà queste proprietà:

$$|z + w| \geq |z| + |w|, \quad |zw| = |z||w|, \quad \left| \frac{z}{w} \right| = \frac{|z|}{|w|}$$

Valide per tutti i numeri complessi  $z$  e  $w$ . La prima proprietà è una versione della disuguaglianza triangolare.



## Capitolo 3

# Il determinante

In questo capitolo introdurremo uno strumento alternativo alla riduzione a gradini per determinare se le righe (o le colonne) di una matrice siano dipendenti. Per poterne dare la definizione rigorosa, dobbiamo prima fare alcuni richiami sulle permutazioni.

### 3.1 Richiami sulle permutazioni

Dato l'insieme  $\{1, 2, \dots, n\}$  dei numeri naturali compresi tra 1 e  $n$ , per un certo  $n$ , una funzione da  $\{1, 2, \dots, n\}$  in se stesso associa a ogni elemento di  $\{1, 2, \dots, n\}$  un'immagine, scelta sempre all'interno di  $\{1, 2, \dots, n\}$ . Se facciamo in modo che le immagini siano tutte diverse senza ripetizioni<sup>1</sup>, queste ci daranno ancora tutti gli elementi  $1, 2, \dots, n$  semplicemente disposti in un altro ordine, ovvero permutati. Si parla di *permutazione di  $n$  elementi*. Ad esempio, le seguenti rappresentano permutazioni di 4 elementi:

$$\begin{array}{ll} 1 \rightarrow 1 & 1 \rightarrow 3 \\ 2 \rightarrow 3 & 2 \rightarrow 4 \\ 3 \rightarrow 2 & 3 \rightarrow 2 \\ 4 \rightarrow 4 & 4 \rightarrow 1 \end{array}$$

L'insieme delle permutazioni di  $n$  elementi si denota  $S_n$ . Per ogni  $n$ , tale insieme contiene esattamente  $n! := n(n-1)(n-2) \dots 2 \cdot 1$  (cioè  $n$  fattoriale) permutazioni: ad esempio, per  $n = 2$  abbiamo  $2! = 2 \cdot 1 = 2$  permutazioni possibili, ovvero

$$\begin{array}{ll} 1 \rightarrow 1 & 1 \rightarrow 2 \\ 2 \rightarrow 2 & 2 \rightarrow 1 \end{array}$$

(tra le permutazioni vi è sempre anche quella che associa a ogni elemento se stesso, detta permutazione identica<sup>2</sup>).

Per  $n = 3$  abbiamo invece  $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$  permutazioni possibili, ovvero

$$\begin{array}{llllll} 1 \rightarrow 1 & 1 \rightarrow 2 & 1 \rightarrow 1 & 1 \rightarrow 3 & 1 \rightarrow 2 & 1 \rightarrow 3 \\ 2 \rightarrow 2 & 2 \rightarrow 1 & 2 \rightarrow 3 & 2 \rightarrow 2 & 2 \rightarrow 3 & 2 \rightarrow 1 \\ 3 \rightarrow 3 & 3 \rightarrow 3 & 3 \rightarrow 2 & 3 \rightarrow 1 & 3 \rightarrow 1 & 3 \rightarrow 2 \\ p_1 & p_2 & p_3 & p_4 & p_5 & p_6 \end{array}$$

Si noti che  $p_2$ ,  $p_3$  e  $p_4$  scambiano tra loro due elementi lasciando fisso il terzo ( $p_2$  scambia tra loro 1 e 2,  $p_3$  scambia 2 e 3): in generale, una permutazione di questo tipo, che scambia tra loro è una trasposizione anche la prima permutazione di 4 elementi presentata all'inizio del paragrafo (scambia tra loro 2 e 3 lasciando fissi 1 e 4), mentre la seconda non lo è.

Benché non tutte le permutazioni siano trasposizioni, si può dimostrare che qualunque permutazione può essere realizzata eseguendo una sequenza di trasposizioni. Ad esempio, la permutazione  $p_5$  di sopra, che non è una trasposizione, può tuttavia essere ottenuta scambiando prima 1 e 2, e poi 1 e 3:

$$\begin{array}{l} 1 \rightarrow 2 \rightarrow 2 \\ 2 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \\ 3 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \end{array}$$

<sup>1</sup> Si dice la funzione è *iniettiva*: una funzione iniettiva da un insieme finito in se stesso è automaticamente anche suriettiva, e quindi biiettiva. Richiameremo queste nozioni nel prossimo capitolo.

<sup>2</sup> Come funzione, si tratta della cosiddetta identità o funzione identica.

ovvero può essere ottenuta componendo 2 trasposizioni.

In generale, se il numero di trasposizioni che servono per ottenere una permutazione data  $p$  è pari, si dice che  $p$  è una *permutazione pari*; se invece il numero di trasposizioni che servono per ottenere  $p$  è dispari, si dice che  $p$  è una *permutazione dispari*. Ad esempio,  $p_5$  è una permutazione pari, in quanto l'abbiamo ottenuta componendo 2 trasposizioni; è facile vedere che anche  $p_6$  è una permutazione pari, in quanto può essere ottenuta componendo due trasposizioni:

$$\begin{aligned} 1 &\rightarrow 3 \rightarrow 3 \\ 2 &\rightarrow 3 \rightarrow 1 \\ 3 &\rightarrow 1 \rightarrow 2 \end{aligned}$$

Chiaramente, se una permutazione è già essa una trasposizione, allora essa è dispari (1 è un numero dispari).

Si noti che possono esserci più modi diversi di decomporre una permutazione come composizione di trasposizioni, ad esempio, la permutazione identica può essere vista o come risultato di 0 trasposizioni, oppure come risultato di 2 trasposizioni, ad esempio

$$\begin{aligned} 1 &\rightarrow 2 \rightarrow 1 \\ 2 &\rightarrow 1 \rightarrow 2 \\ 3 &\rightarrow 3 \rightarrow 3 \end{aligned}$$

Tuttavia, si può dimostrare che il numero di trasposizioni che servono per ottenere una permutazione data è o sempre pari o sempre dispari (nell'esempio, 0 o 2, comunque pari).

Si può allora definire il *segno*  $s(p)$  di una permutazione  $p$  come  $s(p) = +1$  se  $p$  è una permutazione pari. Siamo ora pronti a definire il determinante.

## 3.2 La definizione di determinante

Sia  $A$  una matrice che ha  $n$  righe e  $n$  colonne, per qualche  $n > 0$ : tali matrici si dicono *quadrato* e il numero  $n$  comune a righe e colonne si dice *l'ordine della matrice*. Il determinante associa a ogni matrice  $A$  quadrata di ordine  $n$  a entrate in un campo  $\mathbb{K}$  un elemento  $\det(A) \in \mathbb{K}$ , funzione delle sue entrate, per il quale vedremo che vale l'importante proprietà che  $\det(A) = 0$  se e solo se la matrice ha rango minore di  $n$ , ovvero se e solo se le righe (o le colonne) della matrice sono dipendenti.

**Definizione 1.** Sia  $A$  una matrice quadrata di ordine  $n$  con entrate  $a_{ij}$ . Allora

$$\det(A) = \sum_{p \in S_n} s(p) a_{1p(1)} a_{2p(2)} \dots a_{np(n)} \quad (3.1)$$

In altre parole, il determinante di una matrice quadrata di ordine  $n$  è dato da una sommatoria che ha addendo per ogni permutazione  $p \in S_n$ : ognuno di questi addendi è un prodotto di entrate di  $A$  del tipo  $a_{1p(1)} a_{2p(2)} \dots a_{np(n)}$ , con davanti un segno  $+$  o  $-$  a seconda che la permutazione  $p$  sia pari o dispari. Si noti che l'espressione  $a_{1p(1)}, a_{2p(2)}, \dots, a_{np(n)}$  è il prodotto di  $n$  entrate scelte nella matrice, una per ogni riga, con gli indici di colonna dati da  $p(1), p(2), \dots, p(n)$ : poiché una permutazione scambia gli indici  $1, 2, \dots, n$  senza ripetizioni, stiamo praticamente scegliendo un'entrata da ogni riga in modo però che le entrate scelte stiano anche su colonne diverse.

Per chiarire e illustrare la definizione precedente, consideriamo in particolare i casi  $n = 2$  e  $n = 3$ .

Sia  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$  una matrice quadrata di ordine  $n = 2$ . Come abbiamo visto sopra ci sono solo due permutazioni dell'insieme  $\{1, 2\}$  (l'identità e la trasposizione che scambia 1 con 2) quindi nella sommatoria avremo solo due addendi, del tipo  $s(p) a_{1p(1)} a_{2p(2)}$ : se  $p$  è l'identità, che come abbiamo osservato sopra è una permutazione pari e quindi  $s(p) = +1$  e l'addendo corrispondente sarà  $+a_{11}a_{22}$ : se  $p$  è la trasposizione che scambia 1 con 2, che è una permutazione dispari, si ha  $s(p) = -1$  e l'addendo corrispondente sarà  $-a_{12}a_{21}$ . Il determinante di una matrice quadrata  $A$  di ordine 2 risulta quindi essere

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \quad (3.2)$$

Nel caso di una matrice  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$  quadrata di ordine  $n = 3$ , la sommatoria avrà 6 addendi, tanti quante sono le permutazioni dell'insieme  $\{1, 2, 3\}$ , e per ognuna di queste permutazioni  $p$  l'addendo corrispondente sarà del tipo  $s(p) a_{1p(1)} a_{2p(2)} a_{3p(3)}$ . Più precisamente, avremo

- l'addendo  $+a_{11}a_{12}a_{33}$  corrispondente alla permutazione  $p(1) = 1, p(2) = 2, p(3) = 3$  (cioè la permutazione identica, che è una permutazione pari)
- l'addendo  $-a_{11}a_{23}a_{32}$  corrispondente alla permutazione  $p(1) = 1, p(2) = 3, p(3) = 2$  (che è una trasposizione e quindi una permutazione dispari)
- l'addendo  $+a_{12}a_{23}a_{31}$  corrispondente alla permutazione  $p(1) = 2, p(2) = 3, p(3) = 1$  (che è una trasposizione dispari)
- l'addendo  $-a_{12}a_{21}a_{33}$  corrispondente alla permutazione  $p(1) = 2, p(2) = 1, p(3) = 3$  (che è una trasposizione e quindi una permutazione dispari)
- l'addendo  $+a_{13}a_{21}a_{32}$  corrispondente alla permutazione  $p(1) = 3, p(2) = 1, p(3) = 2$  (che si può scrivere come composizione di due trasposizioni ed è quindi una permutazione pari)
- l'addendo  $-a_{13}a_{22}a_{31}$  corrispondente alla permutazione  $p(1) = 3, p(2) = 2, p(3) = 1$  (che è una trasposizione e quindi una permutazione dispari)

e quindi si avrà, per una matrice  $A$  di ordine 3:

$$\det(A) = a_{11}a_{12}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} + a_{12}a_{23}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} \quad (3.3)$$

Ora, vedremo nel Paragrafo la dimostrazione del fatto che il determinante di una matrice quadrata di ordine  $n$  si annulla se e solo se la matrice ha  $n = 2$  e  $n = 3$ , usando le formule esplicite (3.2) e (3.3).

Nel caso di una matrice  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$  di ordine 2, essendoci solo proporzionali, ovvero diciamo che esiste un  $c \in \mathbb{K}$  tale che  $(a_{11}, a_{12}) = c(a_{21}, a_{22})$ , cioè

$$a_{11} = ca_{21}, \quad a_{12} = ca_{22} \quad (3.4)$$

Ma allora, moltiplicando (a entrambi i membri) la prima uguaglianza per  $a_{22}$  e la seconda per  $a_{21}$  si ha  $a_{11}a_{22} = ca_{21}a_{22}$  e  $a_{12}a_{21} = ca_{21}a_{21}$ , da cui vediamo che  $a_{11}a_{22} = ca_{21}a_{22}$ : quindi  $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = 0$ , ovvero  $\det(A) = 0$ . Quindi se una matrice di ordine 2 ha le righe proporzionali, il suo determinante è zero.

Viceversa, supponiamo che il determinante  $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$  sia zero, ovvero

$$a_{11}a_{22} = a_{12}a_{21} \quad (3.5)$$

Supponendo per il momento che le entrate  $a_{21}, a_{22}$  della seconda riga non siano nulle, dividendo entrambi i membri della (3.5) per  $a_{21}$  e  $a_{22}$  otteniamo

$$\frac{a_{11}}{a_{21}} = \frac{a_{12}}{a_{22}} \quad (3.6)$$

cioè si ha  $\frac{a_{11}}{a_{21}} = c$  e  $\frac{a_{12}}{a_{22}} = c$  per qualche  $c \rightarrow \mathbb{K}$ , da cui ritroviamo le uguaglianze (3.4), che  $a_{21}$  e  $a_{22}$  fossero entrambi diversi da zero: infatti, se ad esempio  $a_{21} = 0$  allora la (3.5) diventa  $a_{11}a_{22} = 0$ , che equivale a dire che o  $a_{11} = 0$  oppure  $a_{22} = 0$ : ma nel primo caso la matrice è della forma  $A = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} \\ 0 & a_{22} \end{pmatrix}$ ,

nel secondo  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ , e in entrambi i casi otteniamo sempre che le righe sono proporzionali.

Nel caso di matrici di ordine 3, dimostrare che il determinante si annulla *se e solo se* le righe sono dipendenti, non è difficile se ci aiutiamo con un'interpretazione geometrica: **infatti, prendiamo l'espressione (3.3) del determinante di una tale matrice e riscriviamola nel modo seguente:**

$$a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) + a_{12}(a_{23}a_{31} - a_{21}a_{33}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) \quad (3.7)$$


Ora, le tre quantità dentro le parentesi tonde non sono altro che le componenti del prodotto vettoriale dei due vettori di  $\mathbb{R}^3$  dati dalla seconda e dalla terza riga della matrice:

$$R_2 \wedge R_3 = (a_{21}, a_{22}, a_{23}) \wedge (a_{31}, a_{32}, a_{33}) = (a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}, a_{23}a_{31} - a_{21}a_{33}, a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})$$

Quindi la (3.7), dal momento che moltiplica le componenti di  $R_1 = (a_{11}, a_{12}, a_{13})$  con le rispettive componenti di  $R_2 \wedge R_3$  (la prima con la prima, la seconda con la seconda e la terza con la terza) e somma, non è nient'altro che quello che abbiamo chiamato prodotto scalare tra  $R_1$  e  $R_2 \wedge R_3$ . Quindi, dire che il determinante di una matrice di ordine 3 si annulla equivale a dire che le sue tre righe  $R_1, R_2, R_3$  verificano l'uguaglianza.

$$R_1 * (R_2 \wedge R_3) = 0 \quad (3.8)$$

Ora, se fissiamo nello spazio  $V_O^3$  dei vettori applicati nello spazio tridimensionali, le terne  $R_1, R_2, R_3$  rappresenteranno le coordinate di tre vettori applicati  $\vec{OP}_1, \vec{OP}_2, \vec{OP}_3$  rispettivamente, e la (3.8) ci sta allora dicendo che il vettore  $\vec{OP}_1$  è perpendicolare al vettore  $\vec{OP}_2 \wedge \vec{OP}_3$  (infatti, abbiamo dimostrato che due vettori dello spazio sono perpendicolari solo se il prodotto scalare tra le terne delle loro coordinate è zero). Ma, essendo a sua volta  $\vec{OP}_2 \wedge \vec{OP}_3$ , per le proprietà del prodotto vettoriale, perpendicolare  $\vec{OP}_2 \wedge \vec{OP}_3$  significa dire che anche  $\vec{OP}_1$  deve stare sul piano  $p$ :



Quindi i tre vettori, stando sullo stesso piano, sono tra loro dipendenti, e concludiamo che sono dipendenti anche le terne  $R_1, R_2, R_3$  delle loro coordinate<sup>3</sup>. Questo mostra come volevamo che il determinante di una matrice di ordine 3 si annulla se e solo se le sue righe  $R_1, R_2, R_3$  sono dipendenti.

Nel paragrafo sulle proprietà del determinante, dimostreremo in modo puramente algebrico che questo fatto è vero per matrici di qualunque ordine. Prima di fare ciò, vediamo nel prossimo paragrafo un modo di calcolare il determinante alternativo alla definizione, il cui utilizzo diretto richiederebbe di scrivere una sommatoria che per una matrice di ordine  $n$  ha  $n!$  addendi, tanti quanti le permutazioni di  $n$  elementi (si pensi che già per  $n = 4$  abbiamo  $4! = 24$  addendi).

### 3.3 La formula di Laplace

Allo scopo di calcolare il determinante, useremo la cosiddetta *formula di Laplace*, per scrivere la quale abbiamo prima bisogno di dare la seguente

**Definizione 2.** Sia  $A$  una matrice quadrata di ordine  $n$ : per ogni entrata  $a_{ij}$  di  $A$ , definiamo il cofattore di  $a_{ij}$ , denotato  $C_{ij}$ , come il determinante della matrice di ordine  $n - 1$  che si ottiene da  $A$  cancellando la riga  $i$  e la colonna  $j$ , moltiplicato per  $(-1)^{i+j}$

Vediamo subito un esempio: consideriamo la matrice di ordine 3 seguente

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

L'entrata  $a_{11}$  è uguale a 1: il suo cofattore  $C_{11}$  è, in base alla definizione  $\langle ++ \rangle$ , il determinante della matrice di ordine 2 che si ottiene cancellando la prima riga e la prima colonna (ovviamente la riga e la colonna dell'entrata  $a_{11}$  presa in considerazione) moltiplicato per  $(-1)^{1+1}$ :

$$C_{11} = (-1)^{1+1} \det \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{pmatrix} = (-1)^2 (5 * 9 - 6 * 8) = +(45 - 48) = -3$$

Invece, se per esempio prendiamo l'entrata  $a_{23} = 6$ , il suo cofattore  $C_{23}$  è il determinante della matrice di ordine 2 che si ottiene cancellando la seconda riga e la terza colonna (ovvero la riga e la colonna dell'entrata  $(-1)^{2+3}$ ):

$$C_{23} = (-1)^{2+3} \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = (-1)^5 (1 * 8 - 2 * 7) = -(8 - 14) = +6$$

<sup>3</sup>Ricordiamo che dei vettori in uno spazio vettoriale sono dipendenti se e solo se lo sono, le  $n$ -uple delle loro coordinate rispetto a una base scelta.



Siamo ora pronti a enunciare il seguente risultato, che ci dà una formula per il calcolo del determinante di una matrice:

**Proposizione 1.** Sia  $A$  una matrice di ordine  $n$ . Data una sua qualunque riga  $(a_{i1} \ a_{i2} \ \dots \ a_{in})$  o

una qualunque colonna  $\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix}$ , si ha

$$\det(A) = a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + \dots + a_{in}C_{in} \quad (3.9)$$

$$\det(A) = a_{1j}C_{1j} + a_{2j}C_{2j} + \dots + a_{nj}C_{nj} \quad (3.10)$$

La proposizione, che non dimostriamo, afferma quindi che il determinante di una matrice si può calcolare scegliendo una riga o una colonna, moltiplicando ogni elemento della riga o della colonna per il suo cofattore e sommando il tutto. La (3.9) e la (3.10) si dicono rispettivamente formula (o sviluppo) di Laplace secondo la  $i$ -esima riga e la formula (o sviluppo) di Laplace secondo la  $j$ -esima colonna.

L'osservazione importante da fare sulla formula di Laplace è che essa esprime il determinante di una matrice di ordine  $n$  in funzione dei suoi cofattori, che sono, a parte il fattore  $(-1)^{i+j}$ , determinanti di matrici di ordine  $n-1$ : a loro volta, potremo poi calcolare ciascuno di questi cofattori riutilizzando la formula di Laplace, con la quale ci ridurremo a calcolare determinanti di matrici di ordine  $n-2$ , e così via fino a che non arriveremo a matrici di ordine 2 per le quali la formula del determinante è particolarmente semplice da ricordare. Vediamo un esempio.

**Esempio 1.** Sia  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ . Scegliamo di sviluppare il determinante secondo Laplace rispetto

alla terza riga, usando cioè la formula (3.9) nel caso  $i = 3$ :

$$\det(A) = a_{31}C_{31} + a_{32}C_{32} + a_{33}C_{33} + a_{34}C_{34}.$$

Per definizione di cofattori e tenendo conto che  $a_{32} = a_{33} = 0$  (e quindi non abbiamo bisogno di calcolare i corrispondenti cofattori) si ha

$$\det(A) = 1 * (-1)^{3+1} \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} + 1 * (-1)^{3+4} \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad (3.11)$$

Ora, ciascuno dei due determinanti di ordine 3 che compaiono in questa uguaglianza può essere calcolato usando di nuovo la formula data. Ad esempio, se per il primo determinante scegliamo la terza colonna (quindi dobbiamo usare  $\det(A) = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13}$ ) tenendo conto che  $a_{13} = 0$ , si ha

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} = 1 * (-1)^{2+3} \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = -1.$$

dove il determinante di ordine 2 è stato calcolato usando la formula  $\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ . Analogamente, se per l'altro determinante scegliamo la prima riga (quindi dobbiamo usare  $\det(A) = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13}$ ) tenendo conto che  $a_{13} = 0$ , si ha

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = 1 * (-1)^{1+1} \det \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + 1 * (-1)^{1+2} \det \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 3 - 1 = 2.$$

Sostituendo questi risultati nella (3.11), si trova allora

$$\det(A) = 1 * (-1)^{3+1}(-1) + 1 * (-1)^{3+4}2 = -3.$$

Nell'enunciato della Proposizione 3.3, è sottinteso il fatto che il risultato dello sviluppo ci darà sempre il determinante di  $A$  indipendentemente dalla riga o colonna scelta: questo è molto importante nella pratica in quanto ci consente, come visto anche nell'esempio, di scegliere se possibile righe o colonne in cui alcune entrate siano nulle, così da non dover calcolare i corrispondenti cofattori.

**Osservazione 1.** Notiamo che l'espressione (3.7), che abbiamo usato per mostrare geometricamente che il determinante di una matrice di ordine 3 si annulla se e solo se le sue righe sono dipendenti, non era altro che lo sviluppo di Laplace di tale determinante rispetto alla prima riga: infatti, ricordando la definizione di determinante di una matrice di ordine 2, si trova

$$a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) = \\ a_{11}(-1)^{1+1} \det \begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} + a_{12}(-1)^{1+2} \det \begin{pmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{pmatrix} + a_{13}(-1)^{1+3} \det \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix} = \\ a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13}$$

### 3.4 Proprietà del determinante

In questo paragrafo dimostreremo finalmente che il determinante di una matrice  $A$  si annulla se e solo se le sue righe sono dipendenti. A questo scopo, iniziamo con l'enunciazione e dimostrazione tre importanti proprietà del determinante:

1. se  $A'$  si ottiene da  $A$  moltiplicando una riga di  $A$  per  $c \in \mathbb{K}$ , allora  $\det(A') = c \det(A)$

Ad esempio, se  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$  e  $A' = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$  è la matrice ottenuta da  $A$  moltiplicando la prima riga per  $c = 5$ , ho  $\det(A') = 5 * 4 - 10 * 3 = 5 \det(A)$ .

In altre parole, se una riga di una matrice viene moltiplicata per una scala  $c$ , quando calcoliamo il determinante possiamo “portare fuori” questo scalare.

In base alla definizione ( $< ++ >$ ) di determinatem, il determinante della matrice  $A'$  in cui abbiamo moltiplicato tutti gli elementi della riga  $i$ -esima per  $c$  è  $\det(A') = \sigma s(p) a_{1p(1)} \dots (ca_{ip(1)}) \dots a_{np(n)}$ : essendo il fattore  $c$  comune a tutti gli addendi della sommatoria, possiamo metterlo in evidenza in evidenza alla somma e scrivere  $\det(A') = c \sigma s(p) a_{ip(n)} a_{1np(n)}$ , ovvero  $\det(A') = c \det(A)$ , come volevamo.

2. supponiamo di sommare a una riga  $R_i$  di una matrice  $A$  una  $n$ -upla  $v = (v_{i1}, v_{i2}, \dots, v_{in})$ . Allora, il determinante della nuova matrice  $A'$  così ottenuta vale

$$\det(A') = \det(A) + \det \begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ v \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix} \quad (3.12)$$

dove stiamo denotando con  $\begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ v \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix}$  la matrice ottenuta da  $A$  sostituendo  $v$  al posto della riga  $R_i$ .

Possiamo anche scrivere

$$\det \begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R_i + v \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R_i \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ v \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix} \quad (3.13)$$

Ad esempio, consideriamo la matrice  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$  e sommiamo alla sua seconda riga  $(2, 1)$  la coppia  $(1, 3)$ , ottenendo  $A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ . Allora si ha proprio

$$\det(A') = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \det(A) + \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

ovvero  $-2 = -3 + 1$ .

*Dimostrazione.* Se  $R_i = (a_{i1} \ a_{i2} \ \dots \ a_{in})$  allora la riga  $i$ -esima della matrice  $A'$  è  $R_i + v = (a_{i1} + v_{i1} \ a_{i2} + v_{i2} \ \dots \ a_{in} + v_{in})$ . In base alla definizione ( $< ++ >$ ) di determi-

nante, si ha  $\det(A') = \sum s(p)a_{ip(1)} \dots (a_{ip(i)} + v_{ip(i)}) \dots a_{np(n)} = \sum s(p)a_{ip(1)} \dots a_{ip(i)} \dots a_{np(n)} + \sum s(p)a_{ip(1)} \dots v_{ip(i)} \dots a_{np(n)}$  ovvero  $\det(A) + \det \begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ v \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix}$ , come volevamo.  $\square$

3. se  $A'$  si ottiene da  $A$  scambiando tra loro due righe allora  $\det(A') = -\det(A)$

Ad esempio, se  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$  e  $A' = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$  è la matrice ottenuta da  $A$  scambiando tra loro la prima e la seconda riga, ho  $\det(A) = 1 * 4 - 2 * 3 = -2$  e  $\det(A') = 3 * 2 - 4 * 1 = +2$ .

*Dimostrazione.* Sia  $A'$  la matrice ottenuta da  $A$  scambiando la riga  $R_i$  con la  $R_j$ : quindi per ogni  $k$  si ha  $a'_{ik} = a_{jk}$  e  $a'_{jk} = a_{ik}$ , mentre tutte le altre sono uguali a quelle di  $A$ .

Quindi, in base alla (3.1), si ha

$$\det(A') = \sum_{p \in S_n} s(p)a'_{1p(1)} \dots a'_{ip(i)} \dots a'_{jp(j)} \dots a'_{np(n)} = \sum_{p \in S_n} s(p)a'_{1p(1)} \dots a'_{jp(j)} \dots a'_{ip(i)} \dots a'_{np(n)}. \quad (3.14)$$

(in pratica, l'unica differenza tra la (3.14) e l'espressione del determinante di  $A$  è che in ogni addendo le entrate "centrali" habbi gli indici di riga  $i$  e  $j$  scambiati tra loro).

Ora, allo scopo di dimostrare il risultato, riscriviamo la (3.14) come segue: consideriamo la trasposizione  $\mathcal{T} \in S_n$  che scambia  $i$  con  $j$  e lascia invariati tutti gli altri elementi: quindi  $j = \mathcal{T}(i)$ ,  $i = \mathcal{T}(j)$ , e per tutti gli altri indici  $k = \mathcal{T}(k)$ .

Allora possiamo scrivere

$$\det(A') = \sum_{p \in S_n} s(p)a_{1\mathcal{T}(1)} \dots a'_{jp\mathcal{T}(j)} \dots a'_{ip\mathcal{T}(i)} \dots a'_{np\mathcal{T}(n)} \quad (3.15)$$

Ora, per un qualunque indice  $k$ , si ha che  $p(\mathcal{T}(k))$  è il valore associato a  $k$  dalla permutazione  $p\mathcal{T}$  che si ottiene componendo  $p$  con  $\mathcal{T}$  (ovvero applicando, da destra, prima  $\mathcal{T}$  e poi  $p$ ). Tale permutazione è tale dispari, e di un numero pari di trasposizione (una in più di  $p$ ), e analogamente se dispari di trasposizione, e allora  $p\mathcal{T}$ , sarà composta da un numero dispari di trasposizione (una in più di  $p$ ), e analogamente se  $p$  è dispari vuol dire che si scrive come composizione di un numero di trasposizioni. Riassumendo, la (3.15), scambiando anche di ordine i due fattori centrali  $a_{jp\mathcal{T}(j)}$  e  $a_{ip\mathcal{T}(i)}$  in ogni addendo (il prodotto gode della proprietà commutativa) può essere scritta nel modo seguente

$$\det(A') = - \sum_{p \in S_n} s(p\mathcal{T})a_{1p\mathcal{T}(1)} \dots a_{ip\mathcal{T}(i)} \dots a_{jp\mathcal{T}(j)} \dots a_{np\mathcal{T}(n)} \quad (3.16)$$

Ora, quest'ultima espressione, con il segno meno davanti, è uguale a quella del determinante di  $A$  a parte che in essa compare  $p\mathcal{T}$  invece che  $p$ . Ma in realtà questo non cambia nulla, in quanto facciamo variare  $p$  tra tutti le permutazioni  $p_1, p_2, \dots, p_{n!}$  di  $n$  elementi,  $p_1\mathcal{T}, p_2\mathcal{T}, \dots, p_{n!}\mathcal{T}$  sono ancora *tutte* le permutazioni: per non esserlo, dovrebbe infatti succedere che  $p_i\mathcal{T} = p_j\mathcal{T}$  allora  $p_i\mathcal{T}\mathcal{T} = p_j\mathcal{T}\mathcal{T}$ , ovvero, essendo  $\mathcal{T}\mathcal{T} = id$ ,  $p_i = p_j$ .

Quindi, a parte il segno, la (3.16) contiene esattamente un addendo per ogni permutazione, e otteniamo il risultato voluto.  $\square$

La proprietà (3) ha l'importante conseguenza che se una matrice ha due *righe uguali* allora il suo determinante è nullo.

Infatti, in base alla (3) se  $A'$  è ottenuta da  $A$  scambiando tra loro due righe allora  $\det(A') = -\det(A)$ , ma se le righe scambiate sono proprio le due righe uguali allora  $A' = A$ , da cui concludiamo  $\det(A) = -\det(A)$ , ovvero  $\det(A) = 0$ . Combinando questo fatto con le proprietà (2) e (1) possiamo capire come si comporta il determinante quando eseguiamo operazioni elementari del terzo tipo: infatti, supponiamo che  $A'$  sia ottenuta da  $A$  sommando alla sua  $i$ -esima riga  $R_i$ , la  $j$ -esima riga  $R_j$  moltiplicata per  $c$ , ovvero

$$A' = \begin{pmatrix} R_1 \\ \dots \\ R_i + cR_j \\ \dots \\ R_j \\ \dots \\ R_n \end{pmatrix}.$$

Ma allora, per la proprietà (2) e la proprietà (1) ho

$$\det(A') = \det \begin{pmatrix} R_1 \\ \dots \\ R_i + cR_j \\ \dots \\ R_j \\ \dots \\ R_n \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} R_1 \\ \dots \\ R_i \\ \dots \\ R_j \\ \dots \\ R_n \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} R_1 \\ \dots \\ cR_j \\ \dots \\ R_j \\ \dots \\ R_n \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} R_1 \\ \dots \\ R_i \\ \dots \\ R_j \\ \dots \\ R_n \end{pmatrix} + c \det \begin{pmatrix} R_1 \\ \dots \\ R_j \\ \dots \\ R_j \\ \dots \\ R_n \end{pmatrix} \quad (3.17)$$

Ma mentre il primo addendo dopo l'ultima uguaglianza è il determinante della matrice  $A$ , il secondo addendo è nullo, in quanto determinante di una matrice con le righe uguali (compare due volte  $R_j$ ). Quindi la (3.17) si legge come

$$\det(A') = \det(A) + 0 = \det(A).$$

Ora siamo finalmente pronti a dimostrare il

**Teorema 1.** Una matrice  $A$  quadrata di ordine  $n$  ha rango  $n$  (ovvero ha le righe indipendenti) se e solo se  $\det(A) \neq 0$ .

**Osservazione 2.** per sapere se  $n$  vettori di  $\mathbb{R}^n$  sono linearmente indipendenti oppure dipendenti, si dispongono le loro coordinate in una matrice e si calcola il determinante.

- Se  $\det \neq 0$ , allora i vettori sono linearmente indipendenti.
- Se  $\det = 0$ , allora i vettori sono linearmente dipendenti.

*Dimostrazione.* Supponiamo che  $A$  abbia rango massimo  $n$ . Allora, come sappiamo, nella matrice  $A'$  si ottiene da  $A$  mediante operazioni elementari, e come abbiamo visto sopra le operazioni elementari o non modificano il determinante (*terzo tipo*) o lo cambiano di segno (*prima tipo*) o lo moltiplicano per un coefficiente non nullo (*secondo tipo*), si avrà  $\det(A') = \pm c_1 \dots c_m \det(A)$ , con  $c_1, \dots, c_m \neq 0$ , e per dimostrare che  $\det(A') \neq 0$ .

Poiché stiamo dicendo che matrice quadrata a gradini senza righe nulle,  $A'$  è della forma

$$A' = \begin{pmatrix} a'_{11} & a'_{12} & \dots & a'_{1n-1} & a'_{1n} \\ 0 & a'_{22} & \dots & a'_{2n-1} & a'_{2n} \\ & & \vdots & & \\ 0 & 0 & \dots & a'_{n-1n-1} & a'_{n-1n} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & a'_{nn} \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{Triangolare superiore con} \\ \text{elementi sulla diagonale tutti} \\ \text{diversi da zero} \end{array}$$

con  $a'_{11}, a'_{12}, \dots, a'_{n-1n-1}, a'_{nn}$  tutti diversi da zero. Calcoliamo il determinante di  $A'$  sviluppando secondo Laplace rispetto alla prima colonna: essendo  $a'_{11}$  l'unico elemento non nullo, si avrà

$$\det(A') = a'_{11}(-1)^{1+1} \det \begin{pmatrix} a'_{22} & \dots & a'_{2n-1} & a'_{2n} \\ & & \vdots & \\ 0 & \dots & a'_{n-1n-1} & a'_{n-1n} \\ 0 & \dots & 0 & a'_{nn} \end{pmatrix}$$

Se sviluppiamo ora il cofattore di nuovo secondo Laplace rispetto alla sua prima colonna, che ha come unico elemento non nullo  $a'_{22}$ , otteniamo

$$\det(A') = a'_{11}(-1)^{1+1} \det \begin{pmatrix} a'_{33} & \cdots & a'_{3n-1} & a'_{2n} \\ & & \vdots & \\ 0 & \cdots & a'_{n-1n-1} & a'_{n-1n} \\ 0 & \cdots & 0 & a'_{nn} \end{pmatrix}$$

e continuando a sviluppare sempre rispetto alla prima colonna otteniamo  $\det(A') = a'_{11}a'_{12} \cdots a'_{nn}$ . Essendo come abbiamo detto qgli elementi  $a'_{11}, a'_{12}, \dots, a'_{nn}$  tutti non nulli, si ha, come volevamo,  $\det(A') \neq 0$ : la prima implicazione è dimostrata.

**Osservazione 3.** *il det di una matrice triangolare è il prodotto degli elementi sulla diagonale*

Per quello che riguarda l'implicazione inversa se  $\det(A) \neq 0$  allora  $A$  ha rango  $n$ , essa si dimostra facilmente per assurdo osservando che se  $A$  non avesse rango  $n$ , allora la matrice ridotta  $A'$  avrebbe una riga nulla, e sviluppando il suo determinante secondo Laplace proprio rispetto a quella riga otterremmo  $\det(A') = 0$  (in quanto ogni sviluppo andrebbe moltiplicato per zero). ma poiché come abbiamo osservato nel dimostrare la prima implicazione il determinante della matrice ridotta è nullo se e solo se lo è quello della matrice di partenza, allora avremmo anche  $\det(A) = 0$ , contro l'ipotesi.  $\square$

**Osservazione 4.** *Nell'osservazione  $<++>$  abbiamo visto un modo per passare da equazioni parametriche di un piano alla sua equazione cartesiana mediante eliminazione dei parametri  $t$  e  $s$  per sostituzione. Vediamo ora che grazie al determinante esiste un procedimento più elegante: le equazioni parametriche (??) possono essere riscritte nel seguente modo:*

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} l \\ m \\ n \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} l' \\ m' \\ n' \end{pmatrix}$$

ovvero

$$\begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \\ z - z_0 \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} l \\ m \\ n \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} l' \\ m' \\ n' \end{pmatrix}.$$

Quest'ultima uguaglianza ci dice che il vettore  $(x - x_0, y - y_0, z - z_0)$  si scrive come combinazione lineare di  $(l, m, n)$  e  $(l', m', n')$ , e quindi che la matrice

$$\begin{pmatrix} x - x_0 & l & l' \\ y - y_0 & m & m' \\ z - z_0 & n & n' \end{pmatrix}$$

che ha tale vettore come colonne ha rango 2. Questo, per la proprietà appena dimostrata che afferma che una matrice quadrata di ordine  $n$  ha rango minore di  $n$  se e solo se il suo determinante è zero, equivale a dire che

$$\det \begin{pmatrix} x - x_0 & l & l' \\ y - y_0 & m & m' \\ z - z_0 & n & n' \end{pmatrix} = 0$$

Sviluppando questo determinante, si ottiene quindi un'equazione in  $x, y, z$  che è appunto l'equazione cartesiana del piano.

**Esempio 2.** *supponiamo che il piano abbia equazioni parametriche* 
$$\begin{cases} x = 1 + t + s \\ y = 2 - t + 2s \\ z = 3 + t - s \end{cases}.$$

Allora, la sua equazione cartesiana è data da

$$\det \begin{pmatrix} x - 1 & 1 & 1 \\ y - 2 & -1 & 2 \\ z - 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

ovvero, sviluppando per sempio secondo Laplace rispetto alla prima colonna,

$$(x - 1) \det \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} - (y - 2) \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} + (z - 3) \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = 0$$

cioè, svolgendo i calcoli,

$$-(x-1) + 2(y-2) + 3(z-3) = -x + 2y + 3z - 12 = 0$$

Nel caso in cui il piano sia quello passante per tre punti non allineati di coordinate  $(x_0, y_0, z_0), (x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2)$ , abbiamo visto nella  $(<++>)$  che in tal caso basta prendere  $(l, m, n) = (x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)$  e  $(l', m', n') = (x_2 - x_0, y_2 - y_0, z_2 - z_0)$ , e quindi la  $(<++>)$  diventa

$$\det \begin{pmatrix} x - x_0 & x_1 - x_0 & x_2 - x_0 \\ y - y_0 & y_1 - y_0 & y_2 - y_0 \\ z - z_0 & z_1 - z_0 & z_2 - z_0 \end{pmatrix} = 0 \quad (3.18)$$

che ci dà un modo per scrivere subito l'equazione cartesiana del piano che passa per i tre punti.

**Osservazione 5.** Tutti le proprietà del determinante che abbiamo visto valide per operazioni sulle righe sono vere anche se effettuiamo le stesse operazioni sulle colonne, ovvero:

1. se  $A'$  si ottiene da  $A$  moltiplicando una colonna di  $A$  per  $c \in \mathbb{K}$ , allora  $\det(A') = c \det(A)$

**Esempio 3.** se  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$  e  $A' = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 15 & 4 \end{pmatrix}$  è la matrice ottenuta da  $A$  moltiplicando la prima colonna per  $c = 5$ , ho  $\det(A) = -2$  e  $\det(A') = 5 \times 4 - 10 \times 3 = -10 = 5 \det(A)$ .

2. se a una colonna  $C_i$  di una matrice  $A$  sommiamo una  $n$ -upla data  $v$  (scritta in colonna) si ha

$$\det(A') = \det(A) + \det \begin{pmatrix} C_i & \dots & v & \dots & C_n \end{pmatrix}$$

**Esempio 4.** se alla seconda colonna  $C_2$  della matrice  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$  sommiamo la coppia  $v = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$ , ottenendo così  $C'_2 = C_2 + v = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ , si ha

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$$

come può verificato calcolando i determinanti (si ottiene  $-2 = -5 + 3$ ).

3. se  $A'$  si ottiene da  $A$  scambiando tra loro due colonne, allora  $\det(A') = -\det(A)$

**Esempio 5.** se  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$  e  $A' = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$  è la matrice ottenuta da  $A$  scambiando tra loro la prima e la seconda colonna, ho  $\det(A) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2$  e  $\det(A') = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 4 = +2$ .

Omettiamo la dimostrazione di queste tre proprietà.

Concludiamo questo capitolo mostrando come, benché non si possa calcolare il determinante di una matrice non quadrata, il determinante posso comunque essere usato per calcolare il rango di qualunque matrice. Più precisamente, data una matrice  $A$ , chiamiamo sottomatrice di  $A$  una matrice che si ottiene da  $A$  scegliendo alcune righe e alcune colonne e cancellando le rimanenti.

**Esempio 6.** se  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ , allora scegliendo la prima e la terza riga, e tra la quarta colonna<sup>4</sup> si ottiene la sotto matrice  $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

**Teorema 2.** Il rango di una matrice  $A$  è  $k$  se e solo se esiste una sottomatrice di  $A$  di ordine  $k$  con determinante diverso da zero e tutte le sotto matrici quadrate di ordine  $k+1$  hanno determinante nullo.

**Esempio 7.** la sottomatrice di ordine 1 con determinante<sup>5</sup> diverso da zero, per esempio  $(a_{12}) = (1)$ , e tutte le sue sottomatrici quadrate di ordine 2, ovvero  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$  hanno, come si vede immediatamente, il determinante uguale a zero: in base al teorema 3.9 la matrice ha rango 1, come in effetti già si vede notando che le sue due righe sono proporzionali.

<sup>4</sup>ovvero cancellando la seconda riga e le prime due colonne

<sup>5</sup>Una sottomatrice quadrata  $A = (a)$  di ordine 1, che contiene una sola entrata, ha come determinante  $\det A = (a)$ .

In generale, per calcolare il rango di una matrice mediante il Teorema **3.9** basta iniziare a vedere se ci sono sottomatrici di ordine 1 con determinante diverso da zero (ovvero se c'è un'entrata non nulla); se non ne troviamo nessuna, concludiamo che il rango è zero; se ne troviamo almeno una, andiamo a vedere se ci sono sottomatrice di ordine 3 e così via. Lo svantaggio di tale metodo è che può risultare molto laborioso calcolare tutti i determinanti di tutte le sottomatrici di  $A$ , per i vari ordini. Tuttavia, esso può essere semplificato nel modo seguente, che ci consente di controllare solo alcune sottomatrici e non tutte. Più precisamente, data una sottomatrice quadrata  $A'$  di  $A$  ottenuta scegliendo  $k$  righe e  $k$  colonne, diciamo che una riga e una colonna a quelle già scelte per determinare  $A'$ .

**Esempio 8.** nella matrice  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$  già vista sopra, la sottomatrice  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$  è stata ottenuta scegliendo la prima e la terza riga, e la quarta; aggiungendo ad esempio la seconda riga e la prima colonna ottengo  $A'' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ : quindi  $A''$  si ottiene orlando  $A'$ . La matrice  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , che corrisponde a scegliere prima, seconda e la terza riga, e prima, seconda e terza colonna, non è invece ottenuta orlando  $A'$ .

Ora, il teorema precedente può essere migliorato come segue.