

Monitoramento de mamíferos terrestres de médio e grande porte em Unidades de Conservação Federais da Caatinga

Fabrizio Pinheiro da Cunha¹ (fabriciopc@gmail.com), Ronaldo Gonçalves Morato² (ronaldo.morato@icmbio.gov.br), Beatriz de Mello Beisiegel² (beatriz.beisiegel@icmbio.gov.br)

1) Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – Bolsista PROBIOII, 2) Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – CENAP

O estudo e a conservação da diversidade biológica da Caatinga estão entre os maiores desafios da ciência brasileira. Este bioma é proporcionalmente o menos estudado, com grande parte dos esforços científicos concentrados próximos às grandes cidades. As áreas da Caatinga são as menos abrangidas por Unidades de Conservação, que em sua totalidade cobrem menos de 2% do seu território (LEAL *et al.*, 2003). Associado a isto, o mau uso e ocupação destas áreas têm provocado uma acentuada alteração ambiental, o que está levando a uma rápida perda de habitats e extinção de espécies, muitas vezes endêmicas e/ou ameaçadas de extinção, culminando com a eliminação de processos ecológicos, muitas vezes ainda desconhecidos. O presente projeto, inserido no Projeto Nacional de Ações Integradas Público-Privadas para a Biodiversidade (PROBIOII), iniciou o monitoramento da mastofauna terrestre de médio e grande porte em três Unidades de Conservação Federal da Caatinga, sendo elas: PARNA Serra da Capivara (PI), ESEC Raso da Catarina (BA) e FLONA Contendas do Sincorá (BA), com dois objetivos prioritários: avaliar a efetividade das UCs na conservação da biodiversidade e gerar subsídios para ações de conservação e uso sustentável de espécies. Para tanto, são utilizados dois métodos distintos e complementares em transectos lineares, o armadilhamento fotográfico e o censo visual (observação direta e indireta). Os transectos lineares, 5 de 5 km, foram definidos aleatoriamente a partir de ferramentas de geoprocessamento, obedecendo a premissas que representem a maior variedade possível de ambientes. As armadilhas fotográficas são instaladas ao longo dos transectos, a uma distância de 1 km entre si, totalizando 30 armadilhas, em um período de 75 dias, com esforço amostral de 2250 dias-armadilha. Para a atividade de censo, as trilhas são percorridas por duplas, em um total mínimo de oito repetições, divididas entre o período do amanhecer e do anoitecer totalizando um esforço amostral de 200 km por campanha/UC. De forma complementar, para observação dos rastros são instaladas armadilhas de pegadas de areia a cada 500 metros, totalizando 10 plots por trilha. Os dados são avaliados e espacializados. As espécies são identificadas e, quando possível, os indivíduos amostrados a fim de se obter parâmetros populacionais de abundância e densidade. Até o momento foi realizada a primeira campanha de campo, na FLONA Contendas do Sincorá. Os resultados preliminares incluem o registro de 13 espécies, sendo que duas delas não constam no Plano de Manejo da UC, *Leopardus pardalis* e *Procyon cancrivorus*, e o registro de duas espécies ameaçadas de extinção no Brasil, *Puma concolor* e *Leopardus pardalis*, dados estes que corroboram a importância da implementação de um programa de monitoramento em longo prazo para a UC.

Referência bibliográfica:

Leal, I. R.; Tabarelli, M.; Silva, J.M.C. 2003. Ecologia e conservação da caatinga. Ed.: Universitária da UFPE, Recife-PE.