

# Avifauna da FLONA Contendas do Sincorá, Bahia, Brasil

ISSN 1981-8874



**Marco Antonio de Freitas<sup>1</sup>,  
Osmar Barreto Borges<sup>2</sup>**

## **Introdução**

O bioma Caatinga é considerado o único bioma exclusivamente brasileiro, ocupando aproximadamente 11% do território nacional. Este bioma é marcadamente caracterizado pela sazonalidade climática, existindo um período seco que

pode chegar em determinadas regiões a 10 meses sem chuvas, mas sendo mais comum períodos de estiagens que variem de 6 a 8 meses (Ab 'Saber, 1975 & 1977).

O bioma é marcado por uma grande poligonal de áreas semi-áridas que ocupam parcialmente ou quase totalmente 8 estados nordestinos: Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, além do Norte do Estado de Minas Gerais já na região Sudeste, havendo den-



*Nystalus maculatus* por Marco Freitas



*Milvago chimachima* por Marco Freitas

tro desta poligonal diversos enclaves de vegetação mais úmida como o Cerrado e a Floresta Estacional e seus ecossistemas associados como campos e campos rupestres (Ab 'Saber, 1975 & 1977).

O clima semi-árido é ocasionado entre outros fatores pela presença das áreas de depressões interplanálticas propiciadas pelas serras, chapadas e planaltos que interrompem ou diminuem a circulação de nuvens baixas, sendo responsáveis pelas chuvas orográficas nesta região. O período seco no Nordeste geralmente vai de abril ou maio até outubro ou novembro quando se iniciam as chuvas torrenciais.

Este clima notadamente sazonal propicia uma variação na atividade faunística, havendo a diminuição de atividades de forma brusca nos anfíbios e répteis, e ocorrendo migrações de pequenos ou longos percursos como no caso das aves e mamíferos. Por estas características climáticas o bioma Caaatinga é o menos diversificado em número de espécies de vertebrados e considerado o que possui o menor número de endemismos.

A Floresta Nacional Contendas do Sincorá foi criada por decreto presidencial de 21 de setembro de 1999. Trata-se de uma unidade de conservação de uso sustentável que é gerida

pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e possui 11.034 hectares e está localizada numa depressão interplanáltica entre a porção norte do Planalto sul-baiano (Planalto de Maracás) e a porção centro-sul da Chapada Diamantina no município homônimo.

### Objetivo

Apresentar a listagem da avifauna dessa unidade de conservação de uso sustentável como forma de contribuir com o conhecimento da fauna local.

### Materiais e métodos

#### Procura-ativa

A primeira campanha foi realizada entre os dias 02 e 12 de setembro de 2005 numa fase preliminar. Foram percorridas diversas trilhas a partir da sede da FLONA tais como: trilha da Lagoa, da Aroeira no período diurno e noturno. As aves foram observadas com o auxílio de binóculos Bushnell 12X50. Estas trilhas eram percorridas no crepúsculo matutino entre 04:30 h até aproximadamente 08:00 h, e depois no período vespertino entre 16:00 e 19:00 h na primeira fase no ano de 2005. Na segunda fase entre 2008 e 2010 foi efetuada





*Carcara plancus* por Marco Freitas



*Paroaria dominicana* por Marco Freitas



*Nyctibius griseus* por Marco Freitas



*Celeus flavescens* por Marco Freitas



*Formicivora melanogaster* por Osmar Borges



*Formicivora melanogaster* por Marco Freitas





*Cariamia criatata* por Marco Freitas



*Crypturellus tataupa* por Marco Freitas




*Aratinga cactorum* por Osmar Borges



*Megaxenops parnaguae* por Osmar Borges



*Amazona aestiva*



*Lepidocolaptes angustirostris* por Marco Freitas



nas diversas oportunidades de saídas de campo do segundo autor.

### Pontos de Observação

O método de ponto fixo consistiu em um observador que permaneceu parado por um período de tempo, anotando todas as aves registradas por observação ou vocalização. O observador permaneceu em silêncio e vestido com roupas camufladas, como verde escuro, o que proporcionou a identificação de espécies pouco conspicuas ou ariscas com mais facilidade. O tempo de amostragem em cada ponto foi de 10 minutos onde se tentaram localizar a distância, sempre os locais mais propícios para observar este grupo, como árvores floridas e com frutos, além das margens de lagoas ou áreas alagadas.

### Entrevistas

Foram efetuadas diversas entrevistas informais e não estruturadas para a constatação e confirmação de algumas espécies cinegéticas. Para confirmação da identidade específica da ave relatada pelo entrevistado foi levado em consideração a segurança do entrevistado, principalmente nas espécies cinegéticas e através de confirmação de gravuras ou fotos de livros.

### Pesquisas Bibliográficas

As consultas bibliográficas especializadas antes, durante e após as atividades de campo, auxiliaram no conhecimento da avifauna da região, principalmente as aves da Chapada Diamantina e do Planalto Sul-Baiano (Funch 1997, Souza 1998).

### Resultados e discussões

Registramos um total de 185 espécies de aves pertencente a 47 famílias para a FLONA Contendas do Sincorá (Tabela 1). Funch (1997) registrou, com o apoio de diversos ornitólogos, uma riqueza de 340 espécies para a região central da Chapada Diamantina (Lençóis, Andaraí, Palmeiras, Mucugê e Ibicoara) sendo este último município bem próximo da FLONA, no entanto, a avifauna da Chapada Diamantina conta com diversos ambientes e ecossistemas propiciados pelas diversas faixas altitudinais e consequentemente climáticas como florestas, campos rupestres, carrascos e cerrados, o que não ocorre na FLONA.

Segundo Fiuza (1999) no domínio das caatingas do estado da Bahia, existem 283 espécies de aves, e se forem incluídas as aves dependentes de ambientes aquáticos próximos, as aves dos enclaves úmidos (ou brejos de altitude) e as migratórias, esse número se elevaria para 394 espécies (Fiuza 1999).

O domínio morfo-climático do semi-árido brasileiro e seus enclaves úmidos apresenta-se com nove espécies de aves exclusivas desse bioma, sendo duas delas extremamente raras como a arara-azul-de-lear, *Anodorhynchus leari*, que vive na região de Canudos/Ba e também uma população no município de Campo Formoso com pouco mais que 1200 indivíduos como população total na natureza; e recentemente a extinção na natureza do último exemplar de ararinha azul, *Cyanopsitta spixii*, que contava no ano 2000 com cerca de 80 indivíduos em cativeiro (Nemésio 2000).

A avifauna foi relativamente bem inventariada por Freitas & Barros (2002) para o município de Curaçá/Ba, onde foram

encontrados 133 espécies, e o primeiro autor encontrou para as caatingas de Canudos/Ba (Toca Velha) 90 espécies; nas caatingas de Itaberaba/Ba na Fazenda Santo Antônio 110 espécies. O registro de 185 espécies para a área da FLONA é um número bem representativo para uma área de Caatinga baiana.

Entre as espécies ameaçadas de extinção, vulneráveis no Nordeste por causa da caça e tráfico, ou endêmicas do bioma Caatinga (IBAMA, 2003, CBRO, 2011) se destacam: uruburei, *Sarcoramphus papa*, papagaio-verdadeiro, *Amazona aestiva*, periquito-vaqueiro, *Aratinga cactorum*, zabelê, *Crypturelus noctivagus zabelê*, codorna, *Nothura boraquira*, jacupemba, *Penelope supercilialis*, jacucaca, *Penelope jacucaca*, coleirinha, *Sporophila albogularis*, choca-do-nordeste, *Sakesphorus cristatus*, chorozinho-da-caatinga, *Herpsilochmus sellowi*, choca-bate-cauda, *Thamnophilus pelzeni*, bico-virado, *Megaxenops paraguayae*, vite-vite, *Hylophilus amaurocephalus* e canã, *Cyanocorax cyanopogon*.

Na região do entorno da FLONA algumas espécies de aves são bastante caçadas tais como a seriema, *Cariama cristata*, além das pombas avoante, asa-branca, verdadeira e juriti, *Zenaida auriculata*, *Patagioenas picazuro*, *Patagioenas cayennensis*, *Leptotila verreauxi*.

As espécies mais comumente observadas e ouvidas em bordas de caatinga e ambientes abertos na área de estudo foram: rolinha-caldo-de-feijão, *Columbina talpacoti*, rolinha-branca, *Columbina picui*, fogo-pagou, *Columbina squamata*, juriti, *Leptotila verreauxi*, siriri, *Tyrannus melancholicus*, lavadeira, *Fluvicola nengeta*, caboclinho, *Sporophila bouvreuil*, papa-capim, *Sporophila nigricollis* e coleirinha, *Sporophila albogularis*.

### Referências Bibliográficas

- Ab'Saber, A. N. (1975) O domínio morfoclimático semi-árido das caatingas brasileiras. *Geomorfologia*, São Paulo. 43: 1-37.
- Ab'Saber, A. N. (1977) Os domínios morfoclimáticos na América do Sul. Primeira aproximação. *Geomorfologia*, São Paulo. 52: 1-22.
- Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2011) *Listas das aves do Brasil. 10ª Edição*. Disponível em <<http://www.cbro.org.br>>. Acesso em: 24 de julho de 2011.
- Freitas, M. A. & Y. M. Barros. (2002) Ornitofauna de Curaçá/Ba. Resumos do X Encontro da Sociedade Brasileira de Ornitologia. Fortaleza/CE.
- Fiuza, A. C. (1999) A avifauna da caatinga do Estado da Bahia. ANOR-publicações avulsas Vol 1, Feira de Santana/Ba. 100 p.
- Funch, R. (1997) Um guia para a Chapada Diamantina, o circuito do diamante. Ed EGBA, Salvador/Ba. 207 p.
- IBAMA. (2003) Lista oficial da fauna brasileira ameaçada de extinção. Brasília/DF.
- Nemésio, A. (2000) A extinção da ararinha-azul (*Cyanopsitta spixii*) na natureza. *Aves* 1(3): 20-24.
- Sick, H. (1997) *Ornitologia brasileira, uma introdução*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 862 p.
- Souza, D. (1998) *Todas as aves do Brasil, guia de campo para identificação*. Feira de Santana: Ed DALL. 350 p.

**1 – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio – RESEX Chico Mendes.**

**Rua Maria da Anunciação 208, Eldorado, Brasília – Acre – CEP 69-932-000.**

**E-mail: [philodryas@hotmail.com](mailto:philodryas@hotmail.com)**

**2 - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio – PARNA Boa Nova, Boa Nova – Bahia – CEP 40-000-000**

**Tabela 1.** Lista das aves encontradas na Floresta Nacional de Contendas do Sincorá, Bahia. C = campo; R/L = Rio e lagos; M = mata; L = lago; To = todos; F = foto; Obs = observação; Voc = vocalização; Bib = Bibliografias; Ent = entrevistas.

Esta listagem segue o padrão do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO) versão 10/2011 os nomes científicos. Os vulgares foram usados os mais conhecidos pelos autores na Bahia.

| Família       | Nome científico                       | Nome vulgar           | Ambiente | Registro |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| Tinamidae     | <i>Rhynchotus rufescens</i>           | perdiz                | C        | Obs      |
|               | <i>Nothura boraquira</i>              | codorna pimpão        | C        | Obs      |
|               | <i>Crypturellus tataupa</i>           | nambu                 | C        | Obs      |
|               | <i>Crypturellus parvirostris</i>      | nambu                 | C        | Obs      |
|               | <i>Crypturellus noctivagus zabele</i> | zabelê                | M        | Voc      |
| Anatidae      | <i>Amazonetta brasiliensis</i>        | marreca               | R/L      | Obs      |
|               | <i>Cairina moschata</i>               | pato-verdadeiro       | L        | Obs      |
|               | <i>Amazonetta brasiliensis</i>        | pé-vermelho           | L        | Obs      |
| Cracidae      | <i>Penelope superciliaris</i>         | jacu                  | M        | Obs      |
|               | <i>Penelope jacucaca</i>              | jacu-açu              | M        | Ent      |
| Podicipedidae | <i>Podilymbus podiceps</i>            | mergulhão             | R/L      | Obs      |
|               | <i>Tachybaptus dominicus</i>          | mergulhão             | R/L      | F        |
| Ardeidae      | <i>Ardea alba</i>                     | garça-branca          | R/L      | Obs      |
|               | <i>Butorides striata</i>              | socozinho             | R/L      | Obs      |
|               | <i>Tigrisoma lineatum</i>             | socó-boi              | R/L      | Obs      |
|               | <i>Pilherodius pileatus</i>           | garça-real            | R/L      | Obs      |
|               | <i>Nycticorax nycticorax</i>          | socó                  | R/L      | Obs      |
|               | <i>Bubulcus ibis</i>                  | garça-vaqueira        | C        | F        |
| Cathartidae   | <i>Coragyps atratus</i>               | urubu-comum           | C        | Obs      |
|               | <i>Cathartes aura</i>                 | urubu-caçador         | C        | Obs      |
|               | <i>Cathartes burrovianus</i>          | urubu-caçador         | C        | Obs      |
|               | <i>Sarcoramphus papa</i>              | urubu-rei             | To       | Ent      |
| Accipitridae  | <i>Elanus leucurus</i>                | gavião-peneira        | C        | Obs      |
|               | <i>Rupornis magnirostris</i>          | gavião-carijó         | C        | Obs      |
|               | <i>Heterospizias meridionalis</i>     | gavião-caboclo        | C        | Obs      |
|               | <i>Geranoospiza caerulescens</i>      | gavião-pernilongo     | To       | Obs      |
|               | <i>Geranoaetus albicaudatus</i>       | gavião-de-rabo-branco | C        | Obs      |
| Falconidae    | <i>Herpetotheres cachinnans</i>       | acauã                 | M/C      | Obs      |
|               | <i>Milvago chimachima</i>             | carrapateiro          | To       | Obs      |
|               | <i>Caracara plancus</i>               | carcará               | To       | Obs      |
|               | <i>Falco femoralis</i>                | falcão                | C        | Obs      |
|               | <i>Falco sparverius</i>               | quiri-quiri           | C        | Obs      |

| Família         | Nome científico                 | Nome vulgar            | Ambiente | Registro |
|-----------------|---------------------------------|------------------------|----------|----------|
| Rallidae        | <i>Gallinula galeata</i>        | frango dagua           | R/L      | Obs      |
|                 | <i>Porphyrrio martinica</i>     | frango dagua           | R/L      | Obs      |
|                 | <i>Aramides cajanea</i>         | saracura               | R/L      | Obs      |
| Cariamidae      | <i>Cariama cristata</i>         | seriema                | C        | Voc      |
| Charadriidae    | <i>Vanellus chilensis</i>       | quero-quero            | C        | Obs      |
|                 | <i>Vanellus cayanus</i>         | batuíra-de-esporão     | C        | Obs      |
| Recuvirostridae | <i>Himantopus mexicanus</i>     | pernilongo             | R/L      | Obs      |
| Scolopacidae    | <i>Tringa solitaria</i>         | maçarico               | R/L      | Obs      |
| Jacanidae       | <i>Jacana jacana</i>            | jaçanã                 | R/L      | Obs      |
| Columbidae      | <i>Patagioenas cayennensis</i>  | pomba-do-mato          | M        | Obs      |
|                 | <i>Patagioenas picazuro</i>     | asa-branca             | To       | Obs      |
|                 | <i>Columbina talpacoti</i>      | rolinha                | C        | Obs      |
|                 | <i>Columbina minuta</i>         | rolinha                | C        | Obs      |
|                 | <i>Columbina squammata</i>      | fogo-pagou             | C        | Obs      |
|                 | <i>Zenaida auriculata</i>       | pomba-de-bando         | C        | Obs      |
|                 | <i>Columbina picui</i>          | rolinha-clara          | C        | Obs      |
|                 | <i>Leptotila verreauxi</i>      | juriti                 | M        | F        |
| Psittacidae     | <i>Amazona aestiva</i>          | papagaio               | M        | Ent      |
|                 | <i>Aratinga cactorum</i>        | periquito-vaqueiro     | C        | Obs      |
|                 | <i>Forpus xanthopterygius</i>   | cuiubinha              | C        | Obs      |
| Cuculidae       | <i>Crotophaga ani</i>           | anum-preto             | C        | F        |
|                 | <i>Piaya cayana</i>             | alma-de-gato           | M        | Obs      |
|                 | <i>Coccyzus melacoryphus</i>    | papa-lagarta           | M        | Obs      |
|                 | <i>Dromococcyx phasianellus</i> | peixe-frito-verdadeiro | M        | Obs      |
|                 | <i>Guira guira</i>              | anum-branco            | C        | Obs      |
|                 | <i>Tapera naevia</i>            | saci                   | M        | Voc      |
| Tytonidae       | <i>Tyto alba</i>                | coruja-branca          | C        | Obs      |
| Strigidae       | <i>Megascops choliba</i>        | corujinha              | M        | Obs      |
|                 | <i>Glaucidium brasilianum</i>   | caburé                 | M        | Obs      |
|                 | <i>Athene cunicularia</i>       | coruja-buraqueira      | C        | Obs      |
| Nyctibidae      | <i>Nyctibius griseus</i>        | vó-da-lua              | M        | Obs      |
| Caprimulgidae   | <i>Hydropsalis albicollis</i>   | curiango               | M        | Obs      |
|                 | <i>Hydropsalis parvula</i>      | curiango               | M        | Obs      |
|                 | <i>Antrostomus rufus</i>        | João-corta-pau         | M        | Obs      |
|                 | <i>Hydropsalis torquata</i>     | bacuaru-tesoura        | C        | Obs      |
|                 | <i>Chordeiles pusillus</i>      | bacurau                | C        | Obs      |

| Família          | Nome científico                        | Nome vulgar             | Ambiente | Registro |
|------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------|----------|
| Apodidae         | <i>Streptoprogne biscutata</i>         | andorinhão              | C        | Obs      |
| Trochiliidae     | <i>Colibri serrirostris</i>            | beija-flor-verde        | M        | Obs      |
|                  | <i>Clorostilbon lucidus</i>            | beija-flor-de-bico-verm | To       | Obs      |
|                  | <i>Anopetia gounellei</i>              | beija-flor              | M        | Obs      |
|                  | <i>Anthracothorax nigricollis</i>      | beija-flor              | M        | Obs      |
|                  | <i>Phaethornis pretrei</i>             | beija-flor              | M        | Obs      |
|                  | <i>Eupetomena macroura</i>             | beija-flor              | C        | Obs      |
|                  | <i>Heliomaster squamosus</i>           | Beija-flor              | M        | Obs      |
|                  | <i>Chrysolampis mosquitus</i>          | beija-flor              | C        | Obs      |
|                  | <i>Amazilia fimbriata</i>              | beija-flor              | M        | Obs      |
| Alcedinidae      | <i>Chloroceryle amazona</i>            | martim-pescador         | R        | Obs      |
| Galbulidae       | <i>Galbula ruficauda</i>               | ariramba                | M        | Obs      |
| Bucconidae       | <i>Nystalus maculatus</i>              | joão-bôbo               | M        | Obs      |
| Picidae          | <i>Colaptes campestris</i>             | pica-pau                | C        | Obs      |
|                  | <i>Colaptes melanochloros</i>          | pica-pau                | M        | Obs      |
|                  | <i>Celeus flavescens</i>               | pica-pau                | M        | Obs      |
|                  | <i>Veniliornis passerinus</i>          | pica-pau                | M        | Obs      |
|                  | <i>Picumnus pygmaeus</i>               | pica-pau                | M        | Obs      |
|                  | <i>Dryocopus lineatus</i>              | pica-pau                | M        | Obs      |
| Thamnophilidae   | <i>Thamnophilus pelzeni</i>            | choca-bate-cauda        | M        | Obs      |
|                  | <i>Thamnophilus capistratus</i>        | choca                   | M        | Obs      |
|                  | <i>Myrmorchilus strigilatus</i>        | piu-piu                 | M        | Obs      |
|                  | <i>Taraba major</i>                    | choca                   | M        | Obs      |
|                  | <i>Herpsilochmus sellowi</i>           | chororozinho            | M        | Obs      |
|                  | <i>Sakesphorus cristatus</i>           | choca                   | M        | Obs      |
|                  | <i>Formicivora melanogaster</i>        | formigueiro             | M        | Obs      |
| Dendrocolaptidae | <i>Lepidocolaptes angustirostris</i>   | arapaçu                 | M        | Obs      |
|                  | <i>Sittasomus griseicapillus</i>       | arapaçu                 | M        | Obs      |
|                  | <i>Campylorhamphus trochilirostris</i> | arapaçu                 | M        | Obs      |
| Furnariidae      | <i>Furnarius rufus</i>                 | joão-de-barro           | C        | Obs      |
|                  | <i>Furnarius figulus</i>               | ribanceiro              | C        | Obs      |
|                  | <i>Furnarius leucopus</i>              | joão-de-barro           | C        | Obs      |
|                  | <i>Xenops rutilans</i>                 | bico-virado             | M        | Obs      |
|                  | <i>Gyalophylax hellmayri</i>           | joão-xique-xique        | M        | Obs      |
|                  | <i>Synallaxis frontalis</i>            | petrim                  | M        | Obs      |
|                  | <i>Synallaxis albescens</i>            | uí-pi                   | M        | Obs      |
|                  | <i>Synallaxis scutata</i>              | estrelinha-preta        | M        | Obs      |
|                  | <i>Megaxenops parnaguae</i>            | bico-virado             | M        | Obs      |
|                  | <i>Certhiaxis cinnamomeus</i>          | curutié                 | R/L      | Obs      |
|                  | <i>Phacellodomus rufifrons</i>         | graveteiro              | C        | Obs      |
|                  | <i>Pseudoseisura cristata</i>          | gibão-de-couro          | C        | Obs      |



| Família       | Nome científico                       | Nome vulgar          | Ambiente | Registro |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|----------|----------|
| Tyriridae     | <i>Pachyramphus polychopterus</i>     | caneleiro            | M        | Obs      |
|               | <i>Pachyramphus validus</i>           | caneleiro            | M        | Obs      |
| Tyrannidae    | <i>Hemitriccus margaritaceiventer</i> | olho-claro           | M        | Obs      |
|               | <i>Hemitriccus striaticollis</i>      | sebinho-rajado       | M        | Obs      |
|               | <i>Casiornis fusca</i>                | caneleiro            | M        | Obs      |
|               | <i>Xolmis irupero</i>                 | noivinha             | C        | Obs      |
|               | <i>Campostoma obsoletum</i>           | risadinha            | M        | Obs      |
|               | <i>Cnemotriccus fuscatus</i>          | guaracavuçu          | M        | Obs      |
|               | <i>Serpophaga subcristata</i>         | alegrinho            | M        | Obs      |
|               | <i>Phaeomyias murina</i>              | bagageiro            | M        | Obs      |
|               | <i>Tolmomyias flaviventris</i>        | bico-chato-amarelo   | M        | Obs      |
|               | <i>Elaenia flavogaster</i>            | cucurutado           | M        | Obs      |
|               | <i>Todirostrum cinereum</i>           | cebinho-relógio      | M        | Obs      |
|               | <i>Fluvicola nengeta</i>              | lavadeira            | C        | Obs      |
|               | <i>Fluvicola albiventer</i>           | lavadeira            | C        | Obs      |
|               | <i>Machetornis rixosa</i>             | bente-vi-rasteiro    | C        | Obs      |
|               | <i>Myiarchus ferox</i>                | maria-cavaleira      | M        | Obs      |
|               | <i>Myiodynastes maculatus</i>         | bem-te-vi-rajado     | M        | Obs      |
|               | <i>Megarynchus pitangua</i>           | bem-te-vi-bico-chato | M        | Obs      |
|               | <i>Empidonomus varius</i>             | peitica              | C        | Obs      |
|               | <i>Pitangus sulphuratus</i>           | bem-te-vi            | C        | Obs      |
|               | <i>Myiozetetes similis</i>            | mosqueteiro          | R/L      | Obs      |
|               | <i>Tyrannus melancholicus</i>         | siriri               | C        | Obs      |
|               | <i>Hirundinea ferruginea</i>          | espião               | C        | Obs      |
|               | <i>Casiornis fuscus</i>               | caneleiro            | M        | Obs      |
|               | <i>Arundinicola leucocephala</i>      | viuvinha             | R/L      | Obs      |
| Vireonidae    | <i>Cyclarhis gujanensis</i>           | gente-de-fora-vem    | M        | Obs      |
|               | <i>Hylophilus amaurocephalus</i>      | vite-vite            | M        | Obs      |
| Corvidae      | <i>Cyanocorax cyanopogon</i>          | cancã                | M        | Obs      |
| Hirundinidae  | <i>Tachycineta albiventer</i>         | andorinha            | R/L      | Obs      |
|               | <i>Progne tapera</i>                  | andorinha            | C        | Obs      |
|               | <i>Progne chalybea</i>                | andorinha            | C        | Obs      |
|               | <i>Pygochelidon cyanoleuca</i>        | andorinha            | C        | Obs      |
|               | <i>Stelgidopteryx ruficollis</i>      | andorinha            | C        | Obs      |
| Troglodytidae | <i>Troglodytes musculus</i>           | garrincha            | C        | Obs      |
|               | <i>Cantorchilus longirostris</i>      | garrinchão           | M        | Obs      |

| Família      | Nome científico                  | Nome vulgar         | Ambiente | Registro |
|--------------|----------------------------------|---------------------|----------|----------|
| Poliophtidae | <i>Poliophtila plumbea</i>       | balança-rabo        | M        | Obs      |
| Turdidae     | <i>Turdus rufiventris</i>        | sabiá-laranjeira    | M        | Obs      |
|              | <i>Turdus leucomelas</i>         | sabiá-clara         | M        | Obs      |
|              | <i>Turdus amaurochalinus</i>     | sabiá-bico-de-osso  | M        | Obs      |
| Mimidae      | <i>Mimus saturninus</i>          | sabiá-do-campo      | C        | Obs      |
| Coerebidae   | <i>Coereba flaveola</i>          | sebinho             | M        | Obs      |
| Thraupidae   | <i>Tachyphonus rufus</i>         | tiê-preto           | M        | Obs      |
|              | <i>Tangara sayaca</i>            | sanhaço             | M        | Obs      |
|              | <i>Compsothraupis loricata</i>   | tiê-caburé          | M        | Obs      |
|              | <i>Nemosia pileata</i>           | saíra               | M        | Obs      |
|              | <i>Lanio pileatus</i>            | tico-tico-rei-cinza | M        | Obs      |
|              | <i>Paroaria dominicana</i>       | cardeal             | C        | Obs      |
|              | <i>Hemithraupis guira</i>        | saíra-de-papo-preto | M        | Obs      |
|              | <i>Conirostrum speciosum</i>     | figuinha            | M        | Obs      |
|              | <i>Saltator maximus</i>          | estevão             | M        | Obs      |
|              | <i>Tangara palmarum</i>          | sanhaço             | M        | Obs      |
|              | <i>Tangara cayana</i>            | saíra-comum         | M        | Obs      |
| Emberizidae  | <i>Zonotrichia capensis</i>      | tico-tico           | C        | Obs      |
|              | <i>Sicalis flaveola</i>          | canário             | C        | Obs      |
|              | <i>Volatinia jacarina</i>        | tiziu               | C        | Obs      |
|              | <i>Sporophila nigricollis</i>    | papa-capim          | C        | Obs      |
|              | <i>Sporophila lineola</i>        | bigodinho           | C        | Obs      |
|              | <i>Sporophila bouvreuil</i>      | caboclinho          | C        | Obs      |
|              | <i>Sporophila albogularis</i>    | coleira             | C        | Obs      |
|              | <i>Sporophila leucoptera</i>     | chorão              | C        | Obs      |
|              | <i>Coriphospingus pileatus</i>   | tico-tico-rei       | M        | Obs      |
|              | <i>Ammodramus humeralis</i>      | tico-tico           | C        | Obs      |
| Cardinalidae | <i>Cyanoloxia brissonii</i>      | azulão              | M        | Obs      |
| Parulidae    | <i>Parula pitiayumi</i>          | mariquita           | M        | Obs      |
|              | <i>Basileuterus flaveolus</i>    | canário-do-mato     | M        | Obs      |
| Icteridae    | <i>Chrysomus ruficapillus</i>    | doremi              | C        | Obs      |
|              | <i>Sturnella supercilialis</i>   | polícia-inglesa     | C        | Obs      |
|              | <i>Gnorimopsar chopi</i>         | pássaro-preto       | C        | Obs      |
|              | <i>Molothrus bonariensis</i>     | papa-arroz          | C        | Obs      |
|              | <i>Agelaioides fringillarius</i> | asa-de-telha        | C        | Obs      |
|              | <i>Icterus jamacaii</i>          | sofrê               | M        | Obs      |
|              | <i>Icterus pyrrhopterus</i>      | pega                | M        | Obs      |
| Fringillidae | <i>Euphonia chlorotica</i>       | vi-vi               | M        | Obs      |
| Estrildidae  | <i>Estrilda astrild</i>          | bico-de-lacre       | C        | Obs      |