

Diversidade de borboletas frugívoras no Parque Estadual da Serra dos Pireneus, GO

Glória Ramos Soares^{1,2,3} (biogloria@yahoo.com.br), Onildo João Marini-Filho^{1,2} (o.marini@gmail.com), Neuza Aparecida Pereira Silva^{2,4} (neuzaaps@gmail.com) & Camila de Fátima Coelho Gavião^{1,2} (camilagaviao@yahoo.com.br)

1) Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade do Cerrado e Caatinga– CECAT/ICMBio, 2) Rede Nacional de Pesquisa e Conservação de Lepidópteros – RedeLep/CNPq, 3) Pequi – Pesquisa e Conservação do Cerrado, 4) Departamento de Ecologia, Universidade de Brasília – UnB

As borboletas frugívoras (Lepidoptera, Rhopalocera) são caracterizadas por seu tipo de alimentação, sendo atraídas pelo forte odor exalado de frutos fermentados. Esta guilda, restrita à família Nymphalidae, possui forte correlação com a riqueza total de borboletas de uma determinada área, podendo ser utilizadas como estimadoras da riqueza total (Brown & Freitas, 2000), além de ser facilmente amostrada por armadilhas contendo frutos fermentados em caldo de cana. O objetivo deste estudo foi verificar a riqueza de borboletas frugívoras no Parque Estadual da Serra dos Pireneus (PESP), Pirenópolis/GO, aplicando o protocolo de coleta para este grupo desenvolvido pela Rede Nacional de Pesquisa e Conservação de Lepidópteros – RedeLep (Uehara-Prado *et al.*, em prep.). A vegetação do PESP é caracterizada por diversas fisionomias do Cerrado, sendo cerrado *sensu stricto*, cerrado *sensu stricto* sobre afloramentos rochosos, campo rupestre e veredas. As armadilhas foram distribuídas pelo PESP proporcionalmente em cada tipo de vegetação, organizadas em unidades amostrais (UA) contendo quatro armadilhas cada. Estas permaneceram em campo durante seis dias consecutivos nos meses de março (16 UAs) e abril (10 UAs) de 2012, com um esforço amostral total de 493 armadilhas-dia. Nestas duas expedições registrou-se 1.048 indivíduos, distribuídos em cinco subfamílias. A subfamília Satyrinae foi a que se destacou, com 66,5% dos indivíduos, seguida por Biblidinae (12,8%), Charaxinae (7,7%), Nymphalinae (6,6%) e Morphinae (6,2%). Esta sequência de subfamílias é típica de ambientes de Cerrado, onde percebe-se a presença de espécies de campos e áreas abertas. Observou-se a presença de algumas espécies raras para o Cerrado como *Morpho catenarius*, típica do bioma Mata Atlântica e *Eunica orphise*, típica do bioma Amazônico. A fauna de borboletas nos habitats além de ser influenciada pela presença de recursos alimentares também é explicada por variáveis como sazonalidade, temperatura, perturbação e conectividade entre os fragmentos. Os resultados obtidos nestas duas expedições demonstraram que a fauna do PESP é típica de cerrado, apresentando espécies Amazônicas e Atlânticas características da zona de transição do Planalto Central. Nestas duas expedições, o protocolo de amostragem da RedeLep se mostrou robusto e capaz de caracterizar adequadamente a fauna de borboletas frugívoras de uma área com o tamanho e diversidade de habitats do PESP, todavia esta pesquisa ainda está em andamento e estão previstas outras duas expedições em setembro e outubro para aquisição de mais informações e confirmação da melhor época para amostragem de borboletas frugívoras no Cerrado. Ainda são necessárias pesquisas paralelas a esta a fim de elucidar questões ecológicas como a avaliação da viabilidade das populações de borboletas frugívoras no PESP. O monitoramento das espécies de borboletas se mostra uma ferramenta importante para o fornecimento de informações para que medidas acertadas de conservação sejam tomadas antes que os efeitos da perturbação sejam irreversíveis.

Diversidade de cactáceas na Floresta Nacional de Contendas do Sincorá – BA, implicações para o monitoramento

Victor V. F. de Lima¹ (victorvincius25@gmail.com), Marianna R. Santos² (mrodriguessantos@gmail.com), Suelma Ribeiro-Silva¹ (suelma.ribeirosilva@gmail.com)

1) Centro Nacional de Pesquisa e Conservação do Cerrado e Caatinga – CECAT, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 2) Universidade Federal de Viçosa

A família Cactaceae, com mais de 1300 espécies, tem sua distribuição quase que restrita às ecorregiões Americanas, cujos centros de biodiversidade são: o México e Sudoeste dos Estados Unidos; os Andes, em particular Peru e Bolívia; e o Leste do Brasil, conhecido também como Brasil

Oriental. No Brasil foi registrada a presença de 227 espécies, das quais 130 ocorrem na porção Oriental do País. Além do grande número de espécies, destacam-se o alto nível de endemismo para a região, 88 no total, sendo grande parte ocorrendo sobre os domínios de Caatingas. Apesar da considerável representatividade e do alto nível de endemismo, além das ameaças aos táxons, o Brasil é o país com maior proporção de espécies ameaçadas e a Caatinga um bioma bastante susceptível às pressões antrópicas, sendo que pouca atenção tem sido prestada às cactáceas, e não somente à fitogeografia, mas, principalmente, à significância ecológica da família para os ecossistemas. O objetivo deste trabalho foi realizar o inventário e o georreferenciamento de espécies da família Cactaceae distribuídas ao longo da Floresta Nacional (Flona) de Contendas do Sincorá (BA) e em áreas adjacentes, localizada na Mesorregião do Centro-Sul Baiano. Esta atividade é parte das metas propostas pelo Programa de Monitoramento da Biodiversidade do Bioma Caatinga, cuja finalidade é fortalecer a efetividade de conservação do patrimônio biológico e dos recursos naturais dentro das Unidades de Conservação Federais. Para reconhecimento da flora Cactaceae foram percorridas, em 2012, ao longo de oito dias, as principais vias de acesso da região com o propósito de mapear as espécies e coletar amostras botânicas para a confecção de material fixado em herbário. A identificação das espécies foi realizada no local de estudo e em laboratório. Os dados de georreferenciamento serviram também para a confecção de um mapa de distribuição para a região de Contendas do Sincorá e Tanhaçu – BA. Ao todo foi registrada a presença de 14 espécies pertencendo aos gêneros: *Arrojadoa*; *Brasilicereus*; *Cereus*; *Melocactus*; *Pereskia*; *Pilosocereus* e *Tacinga*. De todas, o gênero *Melocactus* foi o menos frequente, sendo encontrado apenas numa pequena porção da Flona. Apesar da maioria das espécies constar como fora de perigo (IUCN), isto não significa que devam ser negligenciadas. A maioria dos táxons se encontra sobre Caatinga arbóreo-arbustiva de terra baixa, que historicamente são ecossistemas bastante susceptíveis às pressões antrópicas. Desta forma, a proteção de seus ecossistemas e o monitoramento dos aspectos ecológicos determinantes de diversidade e de padrões demográficos são medidas essenciais para garantir a persistência das populações de Cactaceae na região. No Brasil, áreas que suportam uma riqueza maior que 10 espécies são extremamente raras. Portanto, a alta diversidade de espécies Cactaceae na Flona e áreas adjacentes é uma relevante informação para os argumentos de conservação e manutenção dos remanescentes de Caatinga na região. Além disso, espécies de Cactaceae desempenham um papel importante nos processos de manutenção da fauna, sendo o principal recurso alimentício especialmente durante a estação seca. A relevância destas informações pode também ser um argumento favorável na tomada de decisões políticas capazes de maximizar os esforços de proteção dessas espécies e de seus habitats. Uma dessas medidas seria a recategorização da Flona em Unidades de Conservação de Uso Restrito como, por exemplo, Estação Ecológica ou Reserva Biológica.

Diversidade, similaridade e composição de espécies de Sphingidae em quatro áreas de Cerrado

Simone Jung Matos^{1,2,3} (sisijm@gmail.com), Amábilio Camargo³ (amabilio@cpac.embrapa.br), Willian Rogers de Camargo³ (willianrogers@cpac.embrapa.br), Onildo J. Marini¹ (onildo.marini-filho@dicmbio.gov.br), Danilo do Carmo Vieira Corrêa¹ (danilo.correa@dicmbio.gov.br)

1) Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade do Cerrado e Caatinga – CECAT/ICMBio, 2) Rede Nacional de Pesquisa e Conservação de Lepidoptera – RedeLep/CNPq, 3) Embrapa Cerrados

Sphingidae é uma família de mariposas polinizadoras (Lepidoptera) amplamente distribuídas, ocorrendo em todos os continentes exceto na Antártida. Atualmente são conhecidas cerca de 1400 espécies no mundo e 302 na América do Sul. O número com ocorrência conhecida para Brasil equivale a mais de 60% das espécies neotropicais, com pelo menos 186 já registradas. Este é um dos grupos de insetos mais significativos na polinização de plantas tropicais, prestando inestimáveis serviços ambientais, oferecendo subsídios importantíssimos para diagnósticos ecológicos. O objetivo deste trabalho foi determinar o índice de diversidade ecológica, composição de espécies e similaridade entre as áreas estudadas dessa família de insetos. O trabalho foi realizado em quatro áreas