

Санкт-Петербургский Государственный Университет

Факультет математики и механики

Теория вероятностей

Лектор: Зайцев А. Ю.

5 семестр

Содержание

1	Лекция 02.09.25	2
2	Лекция 09.09.25	3

1 Лекция 02.09.25

В средние века довольно популярной была игра в кости. На гранях кубика изображены числа из множества $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Если предположить, что кубик идеален (т.е. симметричен и однороден), и подбрасывается в идеальных условиях без посторонних воздействий, то у нас нет объективных причин считать одну грань более предпочтительной, чем другую. Такие элементарные исходы являются равновероятными.

В таком случае, вероятность выпадения любой конкретной грани, например, шестёрки, определяется как отношение числа благоприятствующих исходов к общему числу всех возможных равновероятных исходов: $\mathbb{P}(\text{“выпала шестёрка”}) = \frac{1}{6}$.

Аналогично, вероятность события “выпало чётное число” (исходы: 2, 4, 6) будет равна: $\mathbb{P}(\text{“чётное число”}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Это классическое определение вероятности, которое эффективно, когда пространство исходов конечно и исходы равновероятны. Однако для более сложных задач (бесконечные пространства, неравновероятные исходы) потребуется более общий аксиоматический подход.

Напоминание. Комбинаторика предоставляет инструменты для подсчёта числа исходов, что часто помогает в вычислении вероятностей по классическому определению:

- Число перестановок из n различных элементов:

$$n!$$

- Размещения: Число способов выбрать k элементов из n (порядок важен):

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

- Сочетания: Число способов выбрать k элементов из n (порядок не важен):

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

Определение 1.1 (Колмогоровская модель). Вероятностное пространство – тройка $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, где

- Ω – множество элементарных исходов;
- \mathcal{F} – σ -алгебра подмножеств Ω (σ -алгебра событий);
- \mathbb{P} – вероятностная мера на \mathcal{F} , то есть функция $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ такая, что
 1. $\mathbb{P}(A) \geq 0$ (неотрицательность);
 2. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ (нормированность);
 3. A_1, \dots, A_n, \dots и $A_i \cap A_j = \emptyset$, тогда $\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i)$ (счетная аддитивность).

Замечание. Дискретная модель вкладывается в колмогоровскую, если взять в качестве σ -алгебры все подмножества Ω .

Определение 1.2. Событие единичной вероятности называется *достоверным*.

Определение 1.3. Событие нулевой вероятности называется *невозможным*.

Определение 1.4. *Геометрическая вероятность* — модель, где вероятностное пространство Ω является измеримым подмножеством \mathbb{R}^n с мерой Лебега mes , причём $0 < \text{mes}(\Omega) < \infty$. Вероятность определяется как нормированная мера Лебега:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{mes } A}{\text{mes } \Omega}, \quad A \subset \Omega, A \in \mathcal{B}.$$

В этом случае часто рассматривают борелевскую σ -алгебру \mathcal{B} (наименьшую σ -алгебру, которая содержит все открытые множества Ω).

Пример 1.1. На плоскости задан прямоугольник со сторонами $a, b > 0$. С какой вероятностью случайно выбранная в нем точка будет ближе к центру прямоугольника, чем к любому из его углов?

Решение: Множество искомых точек в общем случае образует неправильный шестиугольник (см. Рис. 1).




Рис. 1: Множество искомых точек

Определение 1.5. Пусть $A, B \in \mathcal{F}$, тогда A, B называют *совместными*, если $A \cap B \neq \emptyset$.

Пример 1.2. При подбрасывании игрального кубика:

- Событие A : “выпало четное число” $\{2, 4, 6\}$;
- Событие B : “выпало число, меньшее 3” $\{1, 2\}$;

Они совместные, так как $A \cap B = \{2\}$ (исход “2” благоприятствует обоим событиям).

Определение 1.6. *Условная вероятность* события A при условии наступления события B определяется формулой:

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}, \quad \text{если } \mathbb{P}(B) \neq 0.$$

2 Лекция 09.09.25

hello