

第 3 章 函数逼近与计算

姚遥

南京大学智能科学与技术学院

本章目录

- 引言与预备知识
- 最佳一致逼近多项式
- 最佳平方逼近
- 正交多项式
- 函数按正交多项式展开
- 曲线拟合的最小二乘法

函数逼近 | 引言

对于求已知函数 $f(x)$ 函数值的问题，我们希望求出便于计算且计算量省的公式来近似 $f(x)$

- 例如，Taylor展开式的部分和

$$P_n(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$


就是一种近似公式，在 x_0 附近的误差较小

- 例如， $f(x) = e^x$ 在 $[-1, 1]$ 上近似为

$$P_4(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{24}x^4$$

函数逼近 | 引言

- 误差： $R_4(x) = e^x - P_4(x) = \frac{1}{120}x^5e^\varepsilon, \quad \varepsilon \in (-1,1)$
- 误差限： $|R_4(x)| \leq \frac{e}{120}|x^5| \quad \max_{-1 \leq x \leq 1} |R_4(x)| \leq \frac{e}{120} \approx 0.0226$
- 误差分布如下图所示，它在整个区间上误差较大



如精度要求较高，
则需取很多项，这
样既费时又多占存
储单元

函数插值：给定插值节点 $x_0 < x_1 < \cdots < x_n$ 及条件，找穿过节点的函数

函数逼近：给定已知函数 $f(x)$ ，求计算次数少的近似公式

定义 对于函数类 A 中给定的函数 $f(x)$ ，要求在另一类较简单且便于计算的函数类 B 中，求函数 $P(x) \in B \subseteq A$ ，使 $P(x)$ 与 $f(x)$ 之差在某种度量意义下最小

- 函数类 A 通常是区间 $[a, b]$ 上的连续函数，记作 $C[a, b]$
- 函数类 B 通常为代数多项式、分式有理函数或三角多项式等

函数逼近 | 度量标准

- 一致逼近或均匀逼近

$$\|f(x) - P(x)\|_{\infty} = \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - P(x)|$$

- 均方逼近或平方逼近

$$\|f(x) - P(x)\|_2 = \sqrt{\int_a^b [f(x) - P(x)]^2 dx}$$

- 本章主要研究在这两种度量标准下用代数多项式 $P_n(x)$ 逼近 $f(x) \in C[a, b]$
 - 最佳一致逼近多项式
 - 最佳平方逼近多项式

函数逼近 | 一致逼近的存在性

对于 $f(x) \in C[a, b]$, 是否存在多项式 $P_n(x)$ 一致收敛于 $f(x)$?

- 用插值法或Taylor展开求 $f(x) \in C[a, b]$ 的逼近多项式 , 在某些点上可能没有误差 , 但在整个区间 $[a, b]$ 上误差可能很大 , 例如Runge现象

定理3.1(Weierstrass定理) 设 $f(x) \in C[a, b]$, 则对于任何 $\varepsilon > 0$, 总存在一个代数多项式 $P(x)$, 使

$$\|f(x) - P(x)\|_{\infty} < \varepsilon$$

在 $[a, b]$ 上一致成立

Bernstein给出一种构造性证明，他根据函数整体逼近的特性造出Bernstein多项式

$$\begin{cases} B_n(f, x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) P_k(x) \\ P_k(x) = \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \end{cases} \quad (3.1.4)$$

- 证明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} B_n(f, x) = f(x)$ 在 $[0,1]$ 上一致成立
- 若 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上 m 阶导数连续，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} B_n^{(m)}(f, x) = f^{(m)}(x)$$

- 证明过程见[链接](#)

函数逼近 | 一致逼近的存在性

- 对于 $B_n(f, x)$, 可以证明

$$\sum_{k=0}^n P_k(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = 1$$

只需要根据二项式展开 , 令 $y = 1 - x$ 就可得到

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

- 当 $x \in [0,1]$ 时还有 $P_k(x) \geq 0$, 于是

$$\sum_{k=0}^n |P_k(x)| = \sum_{k=0}^n P_k(x) = 1$$

是有界的

函数逼近 | 一致逼近的存在性

- 因而只要 $|f(x)| \leq \delta$ 对于任意 $x \in [0,1]$ 成立，则

$$|B_n(f, x)| \leq \max_{0 \leq x \leq 1} |f(x)| \sum_{k=0}^n |P_k(x)| \leq \delta$$

有界，故 $B_n(f, x)$ 是稳定的，有良好的逼近性质

- 作为对比，Lagrange插值多项式

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) l_k(x), \quad \sum_{k=0}^n l_k(x) = 1, \quad \text{但} \sum_{k=0}^n |l_k(x)| \text{ 无界}$$

故 $L_n(x)$ 不能保证高阶插值的稳定与收敛

- 但 $B_n(f, x)$ 收敛太慢，比三次样条逼近效果差得多，实际中很少使用

函数逼近 | 范数

区间 $[a, b]$ 上的所有实连续函数组成一个空间，记作 $C[a, b]$ ，范数定义：

- $f \in C[a, b]$ 的 L_1 范数：
$$\|f(x)\|_1 = \int_a^b |f(x)| dx$$

- $f \in C[a, b]$ 的 L_2 范数：
$$\|f(x)\|_2 = \sqrt{\int_a^b f(x)^2 dx}$$

- $f \in C[a, b]$ 的 L_∞ 范数：
$$\|f\|_\infty = \max_{a \leq x \leq b} |f(x)|$$

- 范数 $\|\cdot\|$ 满足条件：

- $\|f\| \geq 0$ ，当且仅当 $f \equiv 0$ 时才有 $\|f\| = 0$ ；

- 对于任意 $f \in C[a, b]$ 和 $a \in \mathbb{R}$ ， $\|af\| = |a|\|f\|$ ；

- 三角不等式：对于任意 $f, g \in C[a, b]$ ，有 $\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|$ (3.1.7)

函数逼近 | 函数距离

空间 $C[a, b]$ 可与向量空间类比，函数 $f \in C[a, b]$ 可看成向量

- 当 $f, g \in C[a, b]$ 时，定义 f 与 g 的距离：

$$D(f, g) = \|f - g\|_{\infty} \quad (3.1.8)$$

- 同时，由式(3.1.7)可得

$$D(f, g) \leq D(f, h) + D(h, g) \quad (3.1.9)$$

$$|\|f\|_{\infty} - \|g\|_{\infty}| \leq \|f - g\|_{\infty} \quad (3.1.10)$$

本章目录

- 引言与预备知识
- 最佳一致逼近多项式
- 最佳平方逼近
- 正交多项式
- 函数按正交多项式展开
- 曲线拟合的最小二乘法

研究动机

- 定理3.1中的存在性并没有约束 n 的值
- n 太大的话，函数复杂，难以计算
- 我们希望：**固定 n** ，寻求最优的逼近

多项式集合定义

- 记次数不大于 n 的多项式集合为 H_n , $H_n \subseteq C[a, b]$
- 记 $H_n = \text{span}\{1, x, \dots, x^n\}$, 其中 $1, x, \dots, x^n$ 是 $[a, b]$ 上一组线性无关的函数组，是 H_n 中的一组基
- H_n 中的元素 $P_n(x)$ 可表示为 $P_n(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$, 其中 a_0, a_1, \dots, a_n 为任意实数

最佳一致逼近或Chebyshev逼近问题

- 在 H_n 中求 $P_n^*(x)$ 逼近 $f(x) \in C[a, b]$, 使其误差为

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x) - P_n^*(x)| = \min_{P_n \in H_n} \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - P_n(x)|$$

即

$$\|f(x) - P_n^*(x)\|_\infty = \min_{P_n \in H_n} \|f(x) - P_n(x)\|_\infty$$

定义3.1 $P_n(x) \in H_n$, $f(x) \in C[a, b]$, 称 $\Delta(f, P_n)$ 为 $f(x)$ 与 $P_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上的**偏差 (距离)**

$$\Delta(f, P_n) = D(f, P_n) = \|f - P_n\|_\infty = \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - P_n(x)|$$

- $\Delta(f, P_n) \geq 0$, $\Delta(f, P_n)$ 的全体组成一个集合 , 记作 $\{\Delta(f, P_n)\}$, 它有下列下界0

函数逼近 | 最佳一致逼近

- **最小偏差**即为集合 $\{\Delta(f, P_n)\}$ 的下确界

$$E_n = \inf_{P_n \in H_n} \{\Delta(f, P_n)\} = \inf_{P_n \in H_n} \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - P_n(x)| \quad (3.2.2)$$

定义3.2 假定 $f(x) \in C[a, b]$, 若存在

$$P_n^*(x) \in H_n, \quad \Delta(f, P_n^*) = E_n$$

则称 $P_n^*(x)$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的**最佳一致逼近多项式**、**最小偏差逼近多项式**、**最佳逼近多项式**

定理3.2 若 $f(x) \in C[a, b]$, 总存在 $P_n^*(x) \in H_n$, 使 $\|f(x) - P_n^*(x)\|_\infty = E_n$

函数逼近 | 最佳一致逼近：偏差点

定义3.3 设 $f(x) \in C[a, b]$, $P(x) \in H_n$, 若在 $x = x_0$ 上有

$$|P(x_0) - f(x_0)| = \max_{a \leq x \leq b} |P(x) - f(x)| = \mu$$

则称 x_0 是 $P(x)$ 的**偏差点**

- 若 $P(x_0) - f(x_0) = \mu$, 则称 x_0 为 “**正**” **偏差点**
- 若 $P(x_0) - f(x_0) = -\mu$, 则称 x_0 为 “**负**” **偏差点**
- 函数 $P(x) - f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续 , 因此至少存在一个点 $x_0 \in [a, b]$, 使得

$$|P(x_0) - f(x_0)| = \mu$$

函数逼近 | 最佳逼近多项式：偏差点性质

定理3.3 若 $P(x) \in H_n$ 是 $f(x) \in C[a, b]$ 的最佳逼近多项式，则 $P(x)$

同时存在正、负偏差点

用反证法来证明：假定只有正偏差点，没有负偏差点（反之亦然）

- 对所有 $x \in [a, b]$ 都有：

$$P(x) - f(x) > -E_n$$

- 因 $P(x) - f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，用 $-E_n + 2h$ 表示最小值（ $h > 0$ ）

因此：

$$-E_n + 2h \leq P(x) - f(x) \leq E_n$$

因此：

$$|[P(x) - h] - f(x)| \leq E_n - h$$


- 它表示多项式 $P(x) - h$ 与 $f(x)$ 的偏差小于 E_n ，与 E_n 是最小偏差的假定矛盾

函数逼近 | 最佳逼近多项式：偏差点性质

几何意义：曲线 $y = P(x)$ 位于下面两条曲线间的带状区域

$$y = f(x) + E_n, \quad y = f(x) - E_n$$

- $P(x)$ 的图形应当与这两条曲线至少各接触一次
- 否则，可把曲线 $y = P(x)$ 稍微移动，得到更好的近似



函数逼近 | 最佳逼近多项式：Chebyshev定理

定理3.4 $P(x) \in H_n$ 是 $f(x) \in C[a, b]$ 的最佳逼近多项式的充要条件是 $P(x)$ 在 $[a, b]$ 上至少有 $n + 2$ 个轮流为“正”、“负”的偏差点，即有 $n + 2$ 个点 $a \leq x_1 < x_2 < \cdots < x_{n+2} \leq b$ ，使

$$P(x_k) - f(x_k) = (-1)^k \sigma \|P(x) - f(x)\|_{\infty} \quad (3.2.4)$$

$$\sigma = \pm 1, \quad k = 1, 2, \dots, n + 2$$

这样的点组称为Chebyshev交错点组

- **只证充分性**：假定在 $[a, b]$ 上有 $n + 2$ 个点使式(3.2.4)成立，要证明 $P(x)$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最佳逼近多项式，用反证法求证

函数逼近 | 最佳逼近多项式：Chebyshev定理

- 若存在 $Q(x) \in H_n$, $Q(x) \neq P(x)$ 使

$$\|f(x) - Q(x)\|_{\infty} \leq \|f(x) - P(x)\|_{\infty}$$

- 可以推断 (画图)

$$P(x) - Q(x) = [P(x) - f(x)] - [Q(x) - f(x)]$$

在点 x_1, x_2, \dots, x_{n+2} 上的符号与 $P(x_k) - f(x_k) (k = 1, \dots, n+2)$ 一致

➤ 因为 $Q(x) - f(x)$ 的值小，不足以影响符号

- 因此，故 $P(x) - Q(x)$ 也在 $n+2$ 个点上轮流取符号 “+” 、 “-”
- 由连续函数性质， $P(x) - Q(x)$ 在 (a, b) 内有 $n+1$ 个零点
- 与 $P(x) - Q(x) \neq 0$ 是不超过 n 次的多项式相悖，故充分性得证

函数逼近 | 最佳逼近多项式: Chebyshev定理推论

推论1 若 $f(x) \in C[a, b]$, 则在 H_n 中存在**唯一**的最佳逼近多项式

- 若 H_n 中有两个最佳逼近多项式 $P(x)$ 与 $Q(x)$, 则对于所有 $x \in [a, b]$, 都有

$$-E_n \leq P(x) - f(x) \leq E_n \quad -E_n \leq Q(x) - f(x) \leq E_n$$

- 于是

$$-E_n \leq \frac{P(x) + Q(x)}{2} - f(x) \leq E_n$$

故 $R(x) = \frac{P(x) + Q(x)}{2}$ 也是 H_n 中的最佳逼近多项式

- 因此 , $R(x) - f(x)$ 的 $n + 2$ 个交错点组 $\{x_k\}$ 满足

$$R(x_k) - f(x_k) = (-1)^k \sigma E_n (k = 1, \dots, n + 2)$$

函数逼近 | 最佳逼近多项式：Chebyshev定理推论

- 同时

$$E_n = |R(x_k) - f(x_k)| = \left| \frac{P(x_k) - f(x_k)}{2} + \frac{Q(x_k) - f(x_k)}{2} \right|$$

- 又由于 $|P(x_k) - f(x_k)| \leq E_n$, $|Q(x_k) - f(x_k)| \leq E_n$, 故当且仅当

$$\frac{P(x_k) - f(x_k)}{2} = \frac{Q(x_k) - f(x_k)}{2} = \pm \frac{E_n}{2}$$

时, 式(3.2.5)才能成立

- 于是 $P(x_k) = Q(x_k) (k = 1, \dots, n + 2)$ 从而表明 $P(x) - Q(x)$ 有 $n + 2$ 个根, 这个矛盾说明 $Q(x) \equiv P(x)$, 故唯一性得证

函数逼近 | 最佳逼近多项式: Chebyshev定理推论

推论2 若 $f(x) \in C[a, b]$, 则其最佳逼近多项式 $P_n^*(x) \in H_n$ 就是 $f(x)$ 的一个Lagrange插值多项式

- 由定理3.4可知, $P_n^*(x) - f(x)$ 在 $[a, b]$ 上要么恒为零, 要么有 $n + 2$ 个轮流取“正”、“负”的偏差点
- 于是存在 $n + 1$ 个点 $x_k \leq \bar{x}_k \leq x_{k+1} (k = 1, 2, \dots, n + 1)$ 使 $P_n^*(\bar{x}_k) - f(\bar{x}_k) = 0$, 所以 $P_n^*(x)$ 是以 \bar{x}_k 为插值节点的Lagrange插值多项式
 - 插值多项式的唯一性

函数逼近 | 最佳逼近多项式：一次多项式

定理3.4 给出了最佳逼近多项式 $P(x)$ 的特性，但要求出 $P(x)$ 却相当困难

简单起见，考虑 $n = 1$ 的情形：假定 $f(x) \in C^2[a, b]$ ，且 $f''(x)$ 在 (a, b) 内不变号，要求最佳一次逼近多项式 $P_1(x) = a_0 + a_1x$

- 根据定理3.4可知，至少有 **3 个点** $a \leq x_1 < x_2 < x_3 \leq b$ ，使

$$P_1(x_k) - f(x_k) = (-1)^k \sigma \max_{a \leq x \leq b} |P_1(x) - f(x)| \quad (\sigma = \pm 1, k = 1, 2, 3)$$

- 根据函数连续性， $P_1(x) - f(x)$ 在 (a, b) 内**至少有 2 个零点**
- 根据Rolle定理， $P_1'(x) - f'(x) = a_1 - f'(x)$ 在 (a, b) 内**至少有 1 个零点**
- 由于 $f''(x)$ 在 (a, b) 不变号，故 $f'(x)$ **单调**， $a_1 - f'(x)$ 在 (a, b) **只有 1 个零点**

函数逼近 | 最佳逼近多项式：一次多项式

- 因此， $P_1'(x) - f'(x)$ 的变化趋势为 “+ 0 -” 或者 “- 0 +”，必然导致

➤ x_2 处梯度为 0：

$$P_1'(x_2) - f'(x_2) = a_1 - f'(x_2) = 0 \Rightarrow f'(x_2) = a_1$$

➤ x_1 和 x_3 位于区间端点 $x_1 = a, x_3 = b$

$$\Rightarrow P_1(a) - f(a) = P_1(b) - f(b) = -[P_1(x_2) - f(x_2)]$$

➤ 由此得到
$$\begin{cases} a_0 + a_1 a - f(a) = a_0 + a_1 b - f(b) \\ a_0 + a_1 a - f(a) = f(x_2) - (a_0 + a_1 x_2) \end{cases}$$


$$\text{解得 } a_1 = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad a_0 = \frac{f(a) + f(x_2)}{2} - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \frac{a + x_2}{2}$$

函数逼近 | 最佳逼近多项式：一次多项式

- 这就得到最佳一次逼近多项式 $P_1(x)$ ，其方程为

$$P_1(x) = \frac{1}{2}[f(a) + f(x_2)] + a_1 \left(x - \frac{a + x_2}{2} \right)$$

几何意义：直线 $y = P_1(x)$ 与弦 MN 平行，且通过 MQ 的中点 D



函数逼近 | 最佳逼近多项式：一次多项式

例3.1 求 $f(x) = \sqrt{1+x^2}$ 在 $[0,1]$ 上的最佳一次逼近多项式

- 由 $a_1 = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 可算出

$$a_1 = \sqrt{2} - 1 \approx 0.414$$

- 由于 $f'(x_2) = a_1$, 可得

$$\frac{x_2}{\sqrt{1+x_2^2}} = \sqrt{2} - 1$$

- 解得

$$x_2 = \sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2}} \approx 0.4554 \quad f(x_2) = \sqrt{1+x_2^2} \approx 1.0986$$

函数逼近 | 最佳逼近多项式：一次多项式

例3.1 求 $f(x) = \sqrt{1+x^2}$ 在 $[0,1]$ 上的最佳一次逼近多项式

- 由 $a_1 = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 可得： $a_1 = \sqrt{2}-1 \approx 0.414$

- 由于 $f'(x_2) = a_1$, 可得 $\frac{x_2}{\sqrt{1+x_2^2}} = \sqrt{2}-1$

$$\Rightarrow x_2 = \sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2}} \approx 0.4554, \quad f(x_2) = \sqrt{1+x_2^2} \approx 1.0986$$

- 由式(3.2.8)得 $a_0 = \frac{1 + \sqrt{1+x_2^2}}{2} - a_1 \frac{x_2}{2} \approx 0.955$

函数逼近 | 最佳逼近多项式：一次多项式

- 得 $f(x) = \sqrt{1+x^2}$ 的最佳一次逼近多项式为

$$P_1(x) = 0.955 + 0.414x$$

- 故

$$\sqrt{1+x^2} \approx 0.955 + 0.414x, \quad 0 \leq x \leq 1$$

- 误差限为

$$\max_{0 \leq x \leq 1} \left| \sqrt{1+x^2} - P_1(x) \right| \leq f(0) - 0.955 = 0.045$$

- 在式(3.2.9)中若令 $x = \frac{a}{b} \leq 1$, 得到近似求根公式

$$\sqrt{a^2 + b^2} \approx 0.955a + 0.414b$$

本章目录

- 引言与预备知识
- 最佳一致逼近多项式
- 最佳平方逼近
- 正交多项式
- 函数按正交多项式展开
- 曲线拟合的最小二乘法

函数逼近 | 最佳平方逼近

若存在 $P_n^*(x) \in H_n$, 使

$$\|f - P_n^*\|_2 = \sqrt{\int_a^b [f(x) - P_n^*(x)]^2 dx} = \inf_{P \in H_n} \|f - P\|_2$$

则 $P_n^*(x)$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最佳平方逼近多项式

- 先介绍内积空间的预备知识

函数逼近 | 内积空间：权函数


定义3.4 设在区间 (a, b) 内，非负函数 $\rho(x)$ 满足以下条件，就称 $\rho(x)$ 为区间 (a, b) 内的权函数：

- $\int_a^b |x|^n \rho(x) dx$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) 存在
- 对于非负的连续函数 $g(x)$ ，若

$$\int_a^b g(x) \rho(x) dx = 0 \quad (3.3.2)$$

则在 (a, b) 内 $g(x) \equiv 0$

$\rho(x)$ 对 (a, b) 内的点赋予权重 $\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$



定义3.5 设 $f(x), g(x) \in C[a, b]$, $\rho(x)$ 是 $[a, b]$ 上的权函数 , 积分

$$(f, g) = \int_a^b \rho(x) f(x) g(x) dx \quad (3.3.3)$$

称为函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上的内积

可以验证这样定义的内积满足下列四条公理

- $(f, g) = (g, f)$
- $(cf, g) = c(f, g)$, c 为常数
- $(f_1 + f_2, g) = (f_1, g) + (f_2, g)$
- $(f, f) \geq 0$, 当且仅当 $f = 0$ 时 $(f, f) = 0$

类比欧式空间 \mathbb{R}^n 中的内积和范数

- 设 $\mathbf{f} = (f_1, f_2, \dots, f_n)^T \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{g} = (g_1, g_2, \dots, g_n)^T \in \mathbb{R}^n$, 其内积定义为

$$(\mathbf{f}, \mathbf{g}) = \sum_{k=1}^n f_k g_k$$

- $\mathbf{f} \in \mathbb{R}^n$ 的模 (范数) 定义为

$$\|\mathbf{f}\|_2 = \sqrt{(\mathbf{f}, \mathbf{f})} = \left(\sum_{k=1}^n f_k^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

- **区别1** : 向量空间 -> 函数空间
- **区别2** : 引入权函数

定义3.6 $f(x) \in C[a, b]$, 称

$$\|f\|_2 = \sqrt{(f, f)} = \sqrt{\int_a^b \rho(x) f^2(x) dx} \quad (3.3.4)$$

为 $f(x)$ 的**Euclid范数** (满足范数的三条性质)

定理3.5 对于任何 $f(x), g(x) \in C[a, b]$, 下列结论成立 :

- $|(f, g)| \leq \|f\|_2 \|g\|_2$ (Cauchy-Schwarz不等式)
- $\|f + g\|_2 \leq \|f\|_2 + \|g\|_2$ (三角不等式)
- $\|f + g\|_2^2 + \|f - g\|_2^2 = 2(\|f\|_2^2 + \|g\|_2^2)$ (平行四边形定律)

函数逼近 | 内积空间：正交函数

定义3.7 若 $f(x), g(x) \in C[a, b]$ 满足

$$(f, g) = \int_a^b \rho(x) f(x) g(x) dx = 0 \quad (3.3.7)$$

则称 f 与 g 在 $[a, b]$ 上带权 $\rho(x)$ **正交**

若函数族 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x), \dots$ 满足关系

$$(\varphi_j, \varphi_k) = \int_a^b \rho(x) \varphi_j(x) \varphi_k(x) dx = \begin{cases} 0, & j \neq k \\ A_k > 0, & j = k \end{cases} \quad (3.3.8)$$

则称 $\{\varphi_k\}$ 是 $[a, b]$ 上带权 $\rho(x)$ 的**正交函数族**；若 $A_k \equiv 1$ ，则称 $\{\varphi_k\}$ 为**标准正交函数族**

函数逼近 | 内积空间：正交函数

- 例如三角函数族

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots$$

就是区间 $[-\pi, \pi]$ 上的正交函数族 (权 $\rho(x) \equiv 1$) :

$$(1, 1) = 2\pi$$

$$(\sin nx, \sin mx) = \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \sin mx \, dx = \begin{cases} \pi, & m = n \\ 0, & m \neq n \end{cases} \quad (n, m = 1, 2, \dots)$$

$$(\cos nx, \cos mx) = \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos mx \, dx = \begin{cases} \pi, & m = n \\ 0, & m \neq n \end{cases} \quad (n, m = 1, 2, \dots)$$

$$(\cos nx, \sin mx) = \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \sin mx \, dx = 0 \quad (n, m = 1, 2, \dots)$$

函数逼近 | 内积空间：线性无关函数

定义3.8 设 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_{n-1}(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，如果

$$a_0\varphi_0(x) + a_1\varphi_1(x) + \dots + a_{n-1}\varphi_{n-1}(x) = 0$$

当且仅当 $a_0 = a_1 = \dots = a_{n-1} = 0$ 时成立，称 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_{n-1}(x)$ 在 $[a, b]$ 上是线性无关的

若函数族 $\{\varphi_k\} (k = 0, 1, \dots)$ 中的任何有限个 φ_k 线性无关，则称 $\{\varphi_k\}$ 为线性无关函数族

- $1, x, x^2, \dots, x^n, \dots$ 就是 $[a, b]$ 上的线性无关函数族

函数逼近 | 内积空间：线性无关函数

- 若 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_{n-1}(x)$ 是 $[a, b]$ 上的线性无关函数，且 a_0, a_1, \dots, a_{n-1} 是任意实数，则

$$S(x) = a_0\varphi_0(x) + a_1\varphi_1(x) + \dots + a_{n-1}\varphi_{n-1}(x)$$

的全体是 $C[a, b]$ 中的一个子集，记作

$$\Phi = \text{span}\{\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_{n-1}\}$$

定理3.6 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_{n-1}(x)$ 在 $[a, b]$ 上线性无关的充要条件是它的Cramer行列式 $G_{n-1} \neq 0$

$$G_{n-1} = G(\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_{n-1}) = \begin{vmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & (\varphi_0, \varphi_1) & \dots & (\varphi_0, \varphi_{n-1}) \\ (\varphi_1, \varphi_0) & (\varphi_1, \varphi_1) & \dots & (\varphi_1, \varphi_{n-1}) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (\varphi_{n-1}, \varphi_0) & (\varphi_{n-1}, \varphi_1) & \dots & (\varphi_{n-1}, \varphi_{n-1}) \end{vmatrix}$$

函数逼近 | 最佳平方逼近

对 $f(x) \in C[a, b]$, 及 $C[a, b]$ 中的一个子集 $\Phi = \text{span}\{\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_n\}$,
若存在 $S^*(x) \in \Phi$, 使

$$\|f - S^*\|_2^2 = \inf_{S \in \Phi} \|f - S\|_2^2 = \inf_{S \in \Phi} \int_a^b \rho(x) [f(x) - S(x)]^2 dx \quad (3.3.11)$$

则称 $S^*(x)$ 是 $f(x)$ 在 Φ 中的最佳平方逼近函数

- 求 $S^*(x)$ 等价于求以下多元函数的最小值

$$I(a_0, a_1, \dots, a_n) = \int_a^b \rho(x) \left[\sum_{j=0}^n a_j \varphi_j(x) - f(x) \right]^2 dx$$

函数逼近 | 最佳平方逼近

- 由于 $I(a_0, a_1, \dots, a_n)$ 是关于 a_0, a_1, \dots, a_n 的二次函数，利用多元函数极值的必要条件

$$\frac{\partial I}{\partial a_k} = 0 (k = 0, 1, \dots, n)$$

$$\frac{\partial I}{\partial a_k} = 2 \int_a^b \rho(x) \left[\sum_{j=0}^n a_j \varphi_j(x) - f(x) \right] \varphi_k(x) dx = 0 (k = 0, 1, \dots, n)$$

- 于是有
$$\sum_{j=0}^n (\varphi_k, \varphi_j) a_j = (f, \varphi_k) (k = 0, 1, \dots, n)$$

➤ 是关于 a_0, a_1, \dots, a_n 的线性方程组，称为**法方程**

➤ 即 $H\mathbf{a} = \mathbf{d}$ ， H 表示Cramer行列式 G_n 对应的矩阵

函数逼近 | 最佳平方逼近

- 由于 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ 线性无关, 故系数行列式 $G(\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_n) \neq 0$, 于是方程组(3.3.13)有唯一解 $a_k = a_k^* (k = 0, 1, \dots, n)$, 从而得到

$$S^*(x) = a_0^* \varphi_0(x) + a_1^* \varphi_1(x) + \dots + a_n^* \varphi_n(x)$$

- 下面验证 $S^*(x)$ 满足式(3.3.11)

$$\|f - S^*\|_2^2 = \inf_{S \in \Phi} \|f - S\|_2^2 = \inf_{S \in \Phi} \int_a^b \rho(x) [f(x) - S(x)]^2 dx \quad (3.3.11)$$

即对任何 $S \in \Phi$

$$\int_a^b \rho(x) [f(x) - S^*(x)]^2 dx \leq \int_a^b \rho(x) [f(x) - S(x)]^2 dx \quad (3.3.14)$$

函数逼近 | 最佳平方逼近

- 为此只要考虑下式大于等于 0

$$\begin{aligned} D &= \int_a^b \rho(x)[f(x) - S(x)]^2 dx - \int_a^b \rho(x)[f(x) - S^*(x)]^2 dx \\ &= \int_a^b \rho(x)[S(x) - S^*(x)]^2 dx + 2 \int_a^b \rho(x)[S(x) - S^*(x)][f(x) - S^*(x)] dx \end{aligned}$$

- 由于 $S^*(x)$ 的系数 a_k^* 满足

$$\frac{\partial I}{\partial a_k} = 2 \int_a^b \rho(x) \left[\sum_{j=0}^n a_j \varphi_j(x) - f(x) \right] \varphi_k(x) dx = 0 \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$

- 因此

$$\int_a^b \rho(x)[f(x) - S^*(x)]\varphi_k(x) dx = 0 \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n)$$


函数逼近 | 最佳平方逼近

- 为此只要考虑下式大于等于 0

$$\begin{aligned} D &= \int_a^b \rho(x)[f(x) - S(x)]^2 dx - \int_a^b \rho(x)[f(x) - S^*(x)]^2 dx \\ &= \int_a^b \rho(x)[S(x) - S^*(x)]^2 dx + 2 \int_a^b \rho(x)[S(x) - S^*(x)][f(x) - S^*(x)] dx \end{aligned}$$

$$\int_a^b \rho(x)[S(x) - S^*(x)][f(x) - S^*(x)] dx = 0$$

- 因此



$S(x) - S^*(x)$ 可以写成
 $\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ 的线性组合

$$\int_a^b \rho(x)[f(x) - S^*(x)]\varphi_k(x) dx = 0 (k = 0, 1, 2, \dots, n)$$

函数逼近 | 最佳平方逼近

- 因此

$$\begin{aligned} D &= \int_a^b \rho(x)[S(x) - S^*(x)]^2 dx + 2 \int_a^b \rho(x)[S(x) - S^*(x)][f(x) - S^*(x)] dx \\ &= \int_a^b \rho(x)[S(x) - S^*(x)]^2 dx \geq 0 \end{aligned}$$

- 成功验证了 $S^*(x)$ 是 $f(x)$ 在 Φ 中的最佳平方逼近函数

函数逼近 | 最佳平方逼近：平方误差

分析平方误差

- 若令 $\delta = f(x) - S^*(x)$, 则平方误差为

$$\begin{aligned}\|\delta\|_2^2 &= (f - S^*, f - S^*) \\ &= (f, f - S^*) - (S^*, f - S^*)\end{aligned}$$

- 由于

$$\int_a^b \rho(x)[f(x) - S^*(x)]\varphi_k(x) dx = 0 (k = 0, 1, 2, \dots, n)$$

- 可得 $(S, f - S^*) = 0$, 因此

$$\|\delta\|_2^2 = (f, f) - (f, S^*) = \|f\|_2^2 - \sum_{k=0}^n a_k^*(\varphi_k, f) \quad (3.3.15)$$

函数逼近 | 最佳平方逼近：平方误差

分析平方误差

- 若令 $\delta = f(x) - S^*(x)$, 则平方误差为

$$\begin{aligned}\|\delta\|_2^2 &= (f - S^*, f - S^*) \\ &= (f, f - S^*) - (S^*, f - S^*)\end{aligned}$$

- 由于

$$\int_a^b \rho(x)[f(x) - S^*(x)]\varphi_k(x) dx = 0 (k = 0, 1, 2, \dots, n)$$

- 可得 $(S, f - S^*) = 0$, 因此

$$\|\delta\|_2^2 = (f, f) - (f, S^*) = \|f\|_2^2 - \sum_{k=0}^n a_k^*(\varphi_k, f) \quad (3.3.15)$$

函数逼近 | 最佳平方逼近多项式

取 $\varphi_k(x) = x^k$, $\rho(x) \equiv 1$, $f(x) \in C[0,1]$, 即要在 H_n 中求 n 次最佳平方逼近多项式

- 回顾法方程

$$\sum_{j=0}^n (\varphi_k, \varphi_j) a_j = (f, \varphi_k) \quad (k = 0, 1, \dots, n) \quad (3.3.13)$$

- 计算可得

$$(\varphi_j, \varphi_k) = \int_0^1 x^{k+j} dx = \frac{1}{k+j+1}$$

$$(f, \varphi_k) = \int_0^1 f(x) x^k dx \equiv d_k$$

函数逼近 | 最佳平方逼近多项式

- 构造方程组 $\mathbf{H}\mathbf{a} = \mathbf{d}$, 求解即可得到系数 a_k^*

➤ \mathbf{H} 表示行列式 $G_n = G(1, x, x^2, \dots, x^n)$ 对应的矩阵

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & \dots & 1/(n+1) \\ 1/2 & 1/3 & \dots & 1/(n+2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1/(n+1) & 1/(n+2) & \dots & 1/(2n+1) \end{bmatrix} \quad (3.3.16)$$

\mathbf{H} 称为Hilbert矩阵

➤ 此外

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T \quad \mathbf{d} = (d_1, d_2, \dots, d_n)^T \quad (3.3.17)$$

$$d_k = (f, x^k) (k = 0, 1, \dots, n)$$

例3.2 求 $f(x) = \sqrt{1+x^2}$ 在 $[0,1]$ 上的一次最佳平方逼近多项式

- 由式(3.3.17)可算出

$$d_0 = \int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \ln(1+\sqrt{2}) + \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 1.147$$

$$d_1 = \int_0^1 x\sqrt{1+x^2} dx = \frac{1}{3} (1+x^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{2\sqrt{2}-1}{3} \approx 0.609$$

- 构造方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.147 \\ 0.609 \end{pmatrix}$$

例3.2 求 $f(x) = \sqrt{1+x^2}$ 在 $[0,1]$ 上的一次最佳平方逼近多项式

- 求得 $a_0 = 0.934$, $a_1 = 0.426$, 故

$$S_1^* = 0.934 + 0.426x$$

- 平方误差

$$\begin{aligned}\|\delta\|_2^2 &= (f, f) - (f, S_1^*) = \|f\|_2^2 - \sum_{k=0}^1 a_k^*(\varphi_k, f) \\ &= \int_0^1 (1+x^2) dx - 0.426d_1 - 0.934d_0 = 0.0026\end{aligned}$$

- 最大误差

$$\|\delta\|_\infty = \max_{0 \leq x \leq 1} \left| \sqrt{1+x^2} - S_1^*(x) \right| = 0.066$$

函数逼近 | 最佳平方逼近多项式

存在问题： $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ 作基求最佳平方逼近多项式，当 n 较大时，系数矩阵式(3.3.16)是高度病态的，求解法方程舍入误差很大

$$Ha = d$$

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & \dots & 1/(n+1) \\ 1/2 & 1/3 & \dots & 1/(n+2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1/(n+1) & 1/(n+2) & \dots & 1/(2n+1) \end{bmatrix} \quad (3.3.16)$$

解决方案： 由无关正交多项式作基