

2010 级《微积分 A》第一学期期末试题

参考答案及评分标准 (A 卷)

2011 年 1 月 20 日

一、 填空 (每小题 2 分 , 共 10 分)

1. $\frac{\pi}{3}$;

2. $\frac{dy}{dx} = \frac{2x - y^2 f'(x) - f(y)}{2yf(x) + xf'(y)}$;

3. $f(x) = e^{2x} + C$;

4. $y = \frac{-\cos x + \pi - 1}{x}$;

5. $-\frac{1}{3}$.

二、(9 分)瑕点为 : $x = 1$ 1 分

令 $\sqrt{1-x} = t, x = 1 - t^2, \cdots dx = -2tdt$ 3 分

$$\int_0^1 \frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{1-\varepsilon} \frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}} \quad \text{.....5 分}$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\sqrt{\varepsilon}}^1 \frac{2dt}{1+t^2} \quad \text{.....7 分}$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \arctan t \Big|_{\sqrt{\varepsilon}}^1$$

$$= \frac{\pi}{2} \quad \text{.....9 分}$$

三 (9 分)

(1) 定义域 $D: x \neq 1$ 1 分





(2) $y' = \frac{x^2(x-3)}{2(x-1)^3},$ 2 分

$$y'' = \frac{3x}{(x-1)^4} \quad \text{.....3 分}$$

(3) 令 $y' = 0$, 得驻点: $x_1 = 0, x_2 = 3$.

令 $y'' = 0$, 得可能拐点横坐标: $x = 0$.

(4) 列表如下:

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, 3)$	3	$(3, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	+	不	-	0	+
$f''(x)$	-	0	+	存	+		+
$f(x)$		拐点		在		极小值	

$f(x)$ 的单增区间: $(-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$, $f(x)$ 的单减区间: $(1, 3)$,

$f(x)$ 的凹区间: $(0, 1) \cup (1, +\infty)$, $f(x)$ 的凸区间: $(-\infty, 0)$,

极小值: $f(3) = \frac{27}{8}$,

拐点: $(0, 0)$ 7 分

(5) 渐近线: $\because \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty, \therefore x = 1$ 为其垂直渐近线,

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \frac{1}{2}, \quad b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - \frac{1}{2}x) = 1$$

所以有斜渐近线: $y = \frac{1}{2}x + 1$9 分

四 (9 分) 证明: 做定积分换元, 令 $x^2 = u$, $du = 2xdx$

$$\begin{aligned} \int_0^a x^3 f(x^2) dx &= \int_0^{a^2} \frac{u}{2} f(u) du \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{a^2} xf(x) dx \end{aligned} \quad \text{.....4 分}$$

$$\int_0^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}} x^3 \sin(x^2) dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x dx \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$= \frac{1}{2} [-x \cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx$$

$$= \frac{1}{2}. \quad \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$$

五、(9 分) 特征方程： $r^2 - 2r - 3 = 0$

特征根： $r_1 = -1, r_2 = 3$ 2 分

对应齐次方程通解为： $Y(x) = C_1 e^{-x} + C_2 e^{3x}$ 3 分

设非齐次方程 $y'' - 2y' - 3y = e^{-x}$ (1) 的特解为： $y_1^* = A x e^{-x}$

代入方程(1)，得 $A = -\frac{1}{4}, y_1^* = -\frac{1}{4} x e^{-x}$ 5 分

设非齐次方程 $y'' - 2y' - 3y = x$ (2) 的特解为： $y_2^* = ax + b$

代入方程(2)，得 $a = -\frac{1}{3}, b = \frac{2}{9} y_2^* = -\frac{1}{3} x + \frac{2}{9}$ 7 分

由解的叠加原理知原非齐次方程的通解为：

$$y(x) = C_1 e^{-x} + C_2 e^{3x} - \frac{1}{4} x e^{-x} - \frac{1}{3} x + \frac{2}{9}. \quad \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$$

六、(9 分) 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} (1 - \sin 2t)^t dt}{x^2}$ 2 分

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x(1 - \sin 2x^2)^{\frac{1}{x^2}}}{2x} \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} (1 - \sin 2x^2)^{\frac{1}{\sin 2x^2} \cdot \frac{-\sin 2x^2}{x^2}} \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin 2x^2}{x^2}} = e^{-2}. \quad \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$$

七、(9分) (1) $S = \int_0^1 \sqrt{4-x^2} dx$ 令 $x = \sin t, dx = \cos t dt$

$$= 4 \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos^2 t dt \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{6}} (1 + \cos 2t) dt = \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

(2) $V_x = \int_0^1 \pi(4-x^2) dx \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$

$$= \frac{11\pi}{3}. \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$V_y = \int_0^1 2\pi x \sqrt{4-x^2} dx \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$= -\frac{2\pi}{3} (4-x^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{2\pi(8-3\sqrt{3})}{3}. \quad \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$$

八、(9分) $\frac{dy}{dx} = -4t^2 e^{-t}, \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = (4t-8)e^{-2t}. \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$

当 $t=0$ 时。有 $\frac{dy}{dx} = 0, \frac{d^2 y}{dx^2} = -8$

曲率半径 $R = \frac{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}{|y''|} = \frac{1}{8}. \quad \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$

九 (9分) (1) 连续性

$$f(0) = \frac{1}{2}, \quad f(0+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2},$$

$$f(0-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)} = \frac{1}{2},$$

$f(0+) = f(0-) = f(0)$, 所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续;.....3 分

(2) 可导性

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1 - \cos x}{x^2} - \frac{1}{2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 - 2\cos x - x^2}{2x^3} = 0$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1}\right) - \frac{1}{2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2e^x - 2 - x - xe^x}{2x^2(e^x - 1)} = -\frac{1}{12},$$

$f'_-(0) \neq f'_+(0)$ ，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.7 分

$$f'(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x^2} + \frac{e^x}{(e^x - 1)^2} & x < 0 \\ \text{不存在} & x = 0 \\ \frac{x \sin x - 2 + 2\cos x}{x^3} & x > 0 \end{cases} \quad \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$$

十 (9 分) 证明：记运动员开伞时刻为 $t=0$, 且记此刻运动员的速度为 v_0 .

由牛顿第二定律知，运动员的速度满足下列微分方程初值问题：

$$\begin{cases} m \frac{dv}{dt} = mg - kv^2 \\ v(0) = v_0 \end{cases} \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

分离变量，得微分方程的解为：

$$\frac{v - \sqrt{\frac{mg}{k}}}{v + \sqrt{\frac{mg}{k}}} = \frac{v_0 - \sqrt{\frac{mg}{k}}}{v_0 + \sqrt{\frac{mg}{k}}} e^{\frac{2k}{m} \sqrt{\frac{mg}{k}} t} \quad \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

在上式中令 $t \rightarrow +\infty$, 得 $v \rightarrow \sqrt{\frac{mg}{k}}$. 结论得证.9 分

十一、(9 分) 构造辅助函数： $F(x) = xe^{1-x}f(x)$ ，2 分

又因为 $f(1) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} xe^{1-x}f(x)dx$ ，由积分中值定理知，存在 $\eta \in (0, \frac{1}{2})$ ，使得

$$f(1) = \eta e^{1-\eta}f(\eta), \text{ 即 } F(1) = F(\eta) \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$F(x)$ 在 $[\eta, 1]$ 上连续, 在 $(\eta, 1)$ 内可导, 且 $F(\eta) = F(1)$, 由罗尔定理, 有至少存在一点 $\xi \in (\eta, 1) \subset (0, 1)$, 使得 $F'(\xi) = 0$6 分

$$\text{又 } F'(x) = e^{1-x}[f(x) + xf'(x) - xf(x)]$$

$$\text{即 } F'(\xi) = e^{1-\xi}[f(\xi) + \xi f'(\xi) - \xi f(\xi)] = 0, \text{ 又 } e^{1-\xi} \neq 0$$

$$\text{所以 } f(\xi) + \xi f'(\xi) - \xi f(\xi) = 0$$

$$\text{即 } f'(\xi) = (1 - \xi^{-1})f(\xi). \quad \text{.....9 分}$$