

# 线性代数之二

吴民

南开大学 计控学院

September 18, 2017

# 行列式的性质（续）

利用前面已证明的性质，很容易证明下式：

## 行列式的性质（续）

利用前面已证明的性质，很容易证明下式：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} + \lambda a_{j1} & a_{i2} + \lambda a_{j2} & \cdots & a_{in} + \lambda a_{jn} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

## 行列式的性质（续）

根据行列式行列互换，行列式值不变，容易将行列式关于行的性质推广到列上：

## 行列式的性质（续）

根据行列式行列互换，行列式值不变，容易将行列式关于行的性质推广到列上：

- 若行列式的一列全为0，则行列式值为0；

## 行列式的性质（续）

根据行列式行列互换，行列式值不变，容易将行列式关于行的性质推广到列上：

- 若行列式的一列全为0，则行列式值为0；
- 互换行列式的两列，行列式反号；

## 行列式的性质（续）

根据行列式行列互换，行列式值不变，容易将行列式关于行的性质推广到列上：

- 若行列式的一列全为0，则行列式值为0；
- 互换行列式的两列，行列式反号；
- 若行列式的某一列元均分别表为两个数的和，则行列式可表为两个行列式的和；

## 行列式的性质（续）

根据行列式行列互换，行列式值不变，容易将行列式关于行的性质推广到列上：

- 若行列式的一列全为0，则行列式值为0；
- 互换行列式的两列，行列式反号；
- 若行列式的某一列元均分别表为两个数的和，则行列式可表为两个行列式的和；
- 若行列式的某一列元均乘以 $c$ ，则行列式值将被乘以 $c$ ；



# 行列式的性质（续）

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} + \lambda a_{1k} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} + \lambda a_{ik} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} + \lambda a_{nk} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

# 行列式的计算

采用**适当**的计算方法，行列式的计算会很容易。

# 行列式的计算

采用**适当**的计算方法，行列式的计算会很容易。不同的行列式，可能有完全不同的适当的计算方法。

# 行列式的计算

采用**适当**的计算方法，行列式的计算会很容易。不同的行列式，可能有完全不同的适当的计算方法。行列式的计算无统一方法可言，要靠尝试、摸索和积累经验。

# 行列式的计算

采用**适当**的计算方法，行列式的计算会很容易。不同的行列式，可能有完全不同的适当的计算方法。行列式的计算无统一方法可言，要靠尝试、摸索和积累经验。

- 将行列式化为上三角。

# 行列式的计算

采用**适当**的计算方法，行列式的计算会很容易。不同的行列式，可能有完全不同的适当的计算方法。行列式的计算无统一方法可言，要靠尝试、摸索和积累经验。

- 将行列式化为上三角。
- 让行列式中出现尽可能多的0。

# 行列式的计算

采用**适当**的计算方法，行列式的计算会很容易。不同的行列式，可能有完全不同的适当的计算方法。行列式的计算无统一方法可言，要靠尝试、摸索和积累经验。

- 将行列式化为上三角。
- 让行列式中出现尽可能多的0。

观察行列式的特点，决定如何去尝试。

# 行列式的算例一

$$\begin{vmatrix} a & b & b & \dots & b \\ b & a & b & \dots & b \\ b & b & a & \dots & b \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ b & b & b & \dots & a \end{vmatrix}$$



# 行列式的算例一

$$\begin{vmatrix} a & b & b & \dots & b \\ b & a & b & \dots & b \\ b & b & a & \dots & b \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ b & b & b & \dots & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a + (n-1)b & b & b & \dots & b \\ a + (n-1)b & a & b & \dots & b \\ a + (n-1)b & b & a & \dots & b \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a + (n-1)b & b & b & \dots & a \end{vmatrix}$$

# 行列式的算例一

$$\begin{vmatrix} a & b & b & \dots & b \\ b & a & b & \dots & b \\ b & b & a & \dots & b \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ b & b & b & \dots & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a+(n-1)b & b & b & \dots & b \\ a+(n-1)b & a & b & \dots & b \\ a+(n-1)b & b & a & \dots & b \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a+(n-1)b & b & b & \dots & a \end{vmatrix}$$

$$= [a+(n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & b & \dots & b \\ 1 & a & \dots & b \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & b & \dots & a \end{vmatrix}$$

# 行列式的算例一

$$= [a + (n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & a-b & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 0 & \dots & a-b & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & a-b \end{vmatrix}$$

# 行列式的算例一

$$= [a + (n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & a-b & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 0 & \dots & a-b & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & a-b \end{vmatrix} = [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}.$$

# 行列式的算例一

$$= [a + (n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & a-b & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 0 & \dots & a-b & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & a-b \end{vmatrix} = [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}.$$

$n$ 阶行列式，用定义展开的方法很难奏效。

## 行列式的算例二

证明:

$$\begin{vmatrix} 0 & x & y & z \\ x & 0 & z & y \\ y & z & 0 & x \\ z & y & x & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & z^2 & y^2 \\ 1 & z^2 & 0 & x^2 \\ 1 & y^2 & x^2 & 0 \end{vmatrix}$$

## 行列式的算例二

证明:

$$\begin{vmatrix} 0 & x & y & z \\ x & 0 & z & y \\ y & z & 0 & x \\ z & y & x & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & z^2 & y^2 \\ 1 & z^2 & 0 & x^2 \\ 1 & y^2 & x^2 & 0 \end{vmatrix}$$

- 左式第二行乘 $yz$ ，第三行乘 $xz$ ，第四行乘 $xy$ 。

## 行列式的算例二

证明:

$$\begin{vmatrix} 0 & x & y & z \\ x & 0 & z & y \\ y & z & 0 & x \\ z & y & x & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & z^2 & y^2 \\ 1 & z^2 & 0 & x^2 \\ 1 & y^2 & x^2 & 0 \end{vmatrix}$$

- 左式第二行乘 $yz$ , 第三行乘 $xz$ , 第四行乘 $xy$ 。
- 左式第一列乘 $\frac{1}{xyz}$ 。



## 行列式的算例二

证明:

$$\begin{vmatrix} 0 & x & y & z \\ x & 0 & z & y \\ y & z & 0 & x \\ z & y & x & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & z^2 & y^2 \\ 1 & z^2 & 0 & x^2 \\ 1 & y^2 & x^2 & 0 \end{vmatrix}$$

- 左式第二行乘 $yz$ , 第三行乘 $xz$ , 第四行乘 $xy$ 。
- 左式第一列乘 $\frac{1}{xyz}$ 。
- 左式第二列乘 $\frac{1}{x}$ , 第二列乘 $\frac{1}{y}$ , 第三列乘 $\frac{1}{z}$ 。

# 行列式的算例三

证明:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

# 行列式的思考算例一

$$d_n = \begin{vmatrix} x & a & a & \dots & a \\ -a & x & a & \dots & a \\ -a & -a & x & \dots & a \\ & \dots & & \dots & \\ -a & -a & -a & \dots & x \end{vmatrix}.$$

## 行列式的思考算例二

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ 2 & 3 & 4 & \dots & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \dots & 2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ n & 1 & 2 & \dots & n-1 \end{vmatrix}.$$

## 行列式的思考算例二

- 自最后一行向上，逐个用上一行减下一行，就会让第2行至第 $n$ 行中每行的所有数除一个外都为1。

## 行列式的思考算例二

- 自最后一行向上，逐个用上一行减下一行，就会让第2行至第 $n$ 行中每行的所有数除一个外都为1。
- 再把所有列都加到第1行上，提出公因子 $\frac{n(n+1)}{2}$ 。

## 行列式的思考算例二

- 自最后一行向上，逐个用上一行减下一行，就会让第2行至第 $n$ 行中每行的所有数除一个外都为1。
- 再把所有列都加到第1行上，提出公因子 $\frac{n(n+1)}{2}$ 。

$$D = \frac{(n+1)n}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & 1-n \\ 1 & 1 & \dots & 1-n & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1-n & \dots & 1 & 1 \\ 1-n & 1 & \dots & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

## 行列式的思考算例二

- 自最后一行向上，逐个用上一行减下一行，就会让第2行至第 $n$ 行中每行的所有数除一个外都为1。
- 再把所有列都加到第1行上，提出公因子 $\frac{n(n+1)}{2}$ 。

$$D = \frac{(n+1)n}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & 1-n \\ 1 & 1 & \dots & 1-n & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1-n & \dots & 1 & 1 \\ 1-n & 1 & \dots & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

上式中的行列式为 $n-1$ 阶。



# 行列式按某一行（列）展开

使用如下过程计算 $n$ 阶行列式：

- 先把某一行（如第 $i$ 行）逐行互换到第1行：

# 行列式按某一行（列）展开

使用如下过程计算 $n$ 阶行列式：

- 先把某一行（如第 $i$ 行）逐行互换到第1行：
  - 先第 $i$ 行和第 $i-1$ 行交换；

# 行列式按某一行（列）展开

使用如下过程计算 $n$ 阶行列式：

- 先把某一行（如第 $i$ 行）逐行互换到第1行：
  - 先第 $i$ 行和第 $i-1$ 行交换；
  - 再第 $i-1$ 行和第 $i-2$ 行交换；

# 行列式按某一行（列）展开

使用如下过程计算 $n$ 阶行列式：

- 先把某一行（如第 $i$ 行）逐行互换到第1行：
  - 先第 $i$ 行和第 $i-1$ 行交换；
  - 再第 $i-1$ 行和第 $i-2$ 行交换；
  - 直到第 $i$ 行成为第1行。

# 行列式按某一行（列）展开

使用如下过程计算 $n$ 阶行列式：

- 先把某一行（如第 $i$ 行）逐行互换到第1行：
  - 先第 $i$ 行和第 $i-1$ 行交换；
  - 再第 $i-1$ 行和第 $i-2$ 行交换；
  - 直到第 $i$ 行成为第1行。
- 用加法公式化为 $n$ 个第一行只有1个非0元的行列式之和；

# 行列式按某一行（列）展开

使用如下过程计算 $n$ 阶行列式：

- 先把某一行（如第 $i$ 行）逐行互换到第1行：
  - 先第 $i$ 行和第 $i-1$ 行交换；
  - 再第 $i-1$ 行和第 $i-2$ 行交换；
  - 直到第 $i$ 行成为第1行。
- 用加法公式化为 $n$ 个第一行只有1个非0元的行列式之和；
- 再用行列式性质把第一行的非0元素都移动到第一列。

# 行列式按某一行（列）展开

以下推导暂未考虑符号。

$$\begin{vmatrix} * & * & \dots & * \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ * & * & \dots & * \end{vmatrix}$$

# 行列式按某一行（列）展开

以下推导暂未考虑符号。

$$\begin{vmatrix} * & * & \dots & * \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ * & * & \dots & * \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ * & * & \dots & * \\ * & * & \dots & * \end{vmatrix}$$



# 行列式按某一行（列）展开

以下推导暂未考虑符号。

$$\begin{vmatrix} * & * & \dots & * \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ * & * & \dots & * \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ * & * & \dots & * \\ * & * & \dots & * \end{vmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{vmatrix} a_{i1} \\ * & * & \dots & * \\ * & * & \dots & * \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{i2} \\ * & * & \dots & * \\ * & * & \dots & * \end{vmatrix} + \dots + \begin{vmatrix} a_{in} \\ * & * & \dots & * \\ * & * & \dots & * \end{vmatrix}$$

# 行列式按某一行（列）展开

$$\rightarrow \begin{vmatrix} a_{i1} & & & \\ * & * & \dots & * \\ * & * & \dots & * \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{i2} & & & \\ * & * & \dots & * \\ * & * & \dots & * \end{vmatrix} + \dots + \begin{vmatrix} a_{in} & & & \\ * & * & \dots & * \\ * & * & \dots & * \end{vmatrix}$$

# 行列式按某一行（列）展开

$$\rightarrow \begin{vmatrix} a_{i1} & & & \\ * & * & \dots & * \\ * & * & \dots & * \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{i2} & & & \\ * & * & \dots & * \\ * & * & \dots & * \end{vmatrix} + \dots + \begin{vmatrix} a_{in} & & & \\ * & * & \dots & * \\ * & * & \dots & * \end{vmatrix}$$

$$\rightarrow a_{i1} \begin{vmatrix} * & * \\ * & * \end{vmatrix} + a_{i2} \begin{vmatrix} * & * \\ * & * \end{vmatrix} + \dots + a_{in} \begin{vmatrix} * & * \\ * & * \end{vmatrix}$$

# 行列式按某一行（列）展开

$a_{ij}$  所对应的  $\begin{vmatrix} * & * \\ * & * \end{vmatrix}$  称为  $a_{ij}$  的余子式，常记为  $M_{ij}$ ：

# 行列式按某一行（列）展开

$a_{ij}$  所对应的  $\begin{vmatrix} * & * \\ * & * \end{vmatrix}$  称为  $a_{ij}$  的余子式，常记为  $M_{ij}$ ：将原行列式的第  $i$  行第  $j$  列划去，所剩的  $n-1$  行、 $n-1$  列不改变相对位置，拼成一个  $n-1$  阶行列式。

# 行列式按某一行（列）展开

$a_{ij}$  所对应的  $\begin{vmatrix} * & * \\ * & * \end{vmatrix}$  称为  $a_{ij}$  的余子式，常记为  $M_{ij}$ ：将原行列式的第  $i$  行第  $j$  列划去，所剩的  $n-1$  行、 $n-1$  列不改变相对位置，拼成一个  $n-1$  阶行列式。

所对应的  $a_{ij}$   $\begin{vmatrix} * & * \\ * & * \end{vmatrix}$  前面的正负号：

# 行列式按某一行（列）展开

$a_{ij}$  所对应的  $\begin{vmatrix} * & * \\ * & * \end{vmatrix}$  称为  $a_{ij}$  的余子式，常记为  $M_{ij}$ ：将原行列式的第  $i$  行第  $j$  列划去，所剩的  $n-1$  行、 $n-1$  列不改变相对位置，拼成一个  $n-1$  阶行列式。

所对应的  $a_{ij}$   $\begin{vmatrix} * & * \\ * & * \end{vmatrix}$  前面的正负号：取决于将  $a_{ij}$  交换到第 1 行第 1 列的互换次数。

# 行列式按某一行（列）展开

$a_{ij}$  所对应的  $\begin{vmatrix} * & * \\ * & * \end{vmatrix}$  称为  $a_{ij}$  的余子式，常记为  $M_{ij}$ ：将原行列式的第  $i$  行第  $j$  列划去，所剩的  $n-1$  行、 $n-1$  列不改变相对位置，拼成一个  $n-1$  阶行列式。

所对应的  $a_{ij}$   $\begin{vmatrix} * & * \\ * & * \end{vmatrix}$  前面的正负号：取决于将  $a_{ij}$  交换到第 1 行第 1 列的互换次数。互换次数为



# 行列式按某一行（列）展开

$a_{ij}$  所对应的  $\begin{vmatrix} * & * \\ * & * \end{vmatrix}$  称为  $a_{ij}$  的余子式，常记为  $M_{ij}$ ：将原行列式的第  $i$  行第  $j$  列划去，所剩的  $n-1$  行、 $n-1$  列不改变相对位置，拼成一个  $n-1$  阶行列式。

所对应的  $a_{ij}$   $\begin{vmatrix} * & * \\ * & * \end{vmatrix}$  前面的正负号：取决于将  $a_{ij}$  交换到第 1 行第 1 列的互换次数。互换次数为  $i-1+j-1$ 。

# 行列式按某一行（列）展开

$a_{ij}$  所对应的  $\begin{vmatrix} * & * \\ * & * \end{vmatrix}$  称为  $a_{ij}$  的余子式，常记为  $M_{ij}$ ：将原行列式的第  $i$  行第  $j$  列划去，所剩的  $n-1$  行、 $n-1$  列不改变相对位置，拼成一个  $n-1$  阶行列式。

所对应的  $a_{ij}$   $\begin{vmatrix} * & * \\ * & * \end{vmatrix}$  前面的正负号：取决于将  $a_{ij}$  交换到第 1 行第 1 列的互换次数。互换次数为  $i-1+j-1$ 。

定义  $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij} = (-1)^{i-1+j-1} M_{ij}$ 。称  $A_{ij}$  为  $a_{ij}$  的代数余子式。

# 行列式按某一行（列）展开

于是

$$|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}.$$

# 行列式按某一行（列）展开

于是

$$|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}.$$

同样结果对于列也成立：

# 行列式按某一行（列）展开

于是

$$|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}.$$

同样结果对于列也成立:

$$|A| = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj}.$$

# 行列式按某一行（列）展开

于是

$$|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}.$$

同样结果对于列也成立:

$$|A| = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj}.$$

当 $i \neq j$ 时, 以下式子等于什么?

$$t_{ij} = a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn}.$$

# 行列式按某一行（列）展开

$$t_{ij} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

# 行列式按某一行（列）展开

$$t_{ij} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0.$$



# 行列式按某一行（列）展开

$$t_{ij} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0.$$

总结：书22页的**定理4**。

# 范德蒙行列式

$$V(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \dots & x_n^2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

# 范德蒙行列式

$$V(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \dots & x_n^2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

- 第 $n-1$ 行乘 $-x_1$ 加到第 $n$ 行，将第 $n$ 行第1列消为0。

# 范德蒙行列式

$$V(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \dots & x_n^2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

- 第 $n-1$ 行乘 $-x_1$ 加到第 $n$ 行, 将第 $n$ 行第1列消为0。
- 第 $n-2$ 行乘 $-x_1$ 加到第 $n-1$ 行, 将第 $n-1$ 行第1列消为0。

# 范德蒙行列式

$$V(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \dots & x_n^2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

- 第 $n-1$ 行乘 $-x_1$ 加到第 $n$ 行, 将第 $n$ 行第1列消为0。
- 第 $n-2$ 行乘 $-x_1$ 加到第 $n-1$ 行, 将第 $n-1$ 行第1列消为0。
- 如此重复。第1行乘 $-x_1$ 加到第2行, 将第2行第1列消为0。

# 范德蒙行列式

$$V(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & \dots & x_n - x_1 \\ 0 & x_2(x_2 - x_1) & \dots & x_n(x_n - x_1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & \dots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix}$$

# 范德蒙行列式

$$\begin{aligned} V(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & \dots & x_n - x_1 \\ 0 & x_2(x_2 - x_1) & \dots & x_n(x_n - x_1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & \dots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & \dots & x_n - x_1 \\ \dots & \dots & \dots \\ x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & \dots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix} \end{aligned}$$

# 范德蒙行列式

$$= (x_2 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix}$$



# 范德蒙行列式

$$= (x_2 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

得到 $n-1$ 阶范德蒙行列式。

# 范德蒙行列式

$$= (x_2 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

得到 $n-1$ 阶范德蒙行列式。如此重复下去，使用数学归纳法，便得到最终结果：

# 范德蒙行列式

$$= (x_2 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

得到 $n-1$ 阶范德蒙行列式。如此重复下去，使用数学归纳法，便得到最终结果：

$$V(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j).$$

# 行列式的思考算例三

$$D_n = \begin{vmatrix} a+b & ab & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & a+b & ab & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a+b & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a+b & ab \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & a+b \end{vmatrix} \quad (a \neq b)$$

# 行列式的思考算例三

$$D_n = \begin{vmatrix} a+b & ab & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & a+b & ab & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a+b & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a+b & ab \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & a+b \end{vmatrix} \quad (a \neq b)$$

按第一行展开, 得到:

# 行列式的思考算例三

$$D_n = (a+b)D_{n-1} - ab \begin{vmatrix} 1 & ab & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & a+b & ab & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a+b & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a+b & ab \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & a+b \end{vmatrix}$$

# 行列式的思考算例三

$$D_n = (a+b)D_{n-1} - ab \begin{vmatrix} 1 & ab & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & a+b & ab & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a+b & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a+b & ab \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & a+b \end{vmatrix}$$

$$= (a+b)D_{n-1} - abD_{n-2}.$$

# 行列式的思考算例三

$$D_n = (a+b)D_{n-1} - ab \begin{vmatrix} 1 & ab & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & a+b & ab & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a+b & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a+b & ab \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & a+b \end{vmatrix}$$

$$= (a+b)D_{n-1} - abD_{n-2}.$$

得到递推公式:  $D_n = (a+b)D_{n-1} - abD_{n-2}$ .



# 行列式的思考算例三

得到递推公式:  $D_n = (a+b)D_{n-1} - abD_{n-2}$ .

# 行列式的思考算例三

得到递推公式:  $D_n = (a+b)D_{n-1} - abD_{n-2}$ .

$$D_n - aD_{n-1} = b(D_{n-1} - aD_{n-2})$$

## 行列式的思考算例三

得到递推公式:  $D_n = (a+b)D_{n-1} - abD_{n-2}$ .

$$\begin{aligned} D_n - aD_{n-1} &= b(D_{n-1} - aD_{n-2}) \\ &= b^2(D_{n-2} - aD_{n-1}) \end{aligned}$$

# 行列式的思考算例三

得到递推公式:  $D_n = (a+b)D_{n-1} - abD_{n-2}$ .

$$\begin{aligned} D_n - aD_{n-1} &= b(D_{n-1} - aD_{n-2}) \\ &= b^2(D_{n-2} - aD_{n-3}) = \cdots \end{aligned}$$

# 行列式的思考算例三

得到递推公式:  $D_n = (a+b)D_{n-1} - abD_{n-2}$ .

$$\begin{aligned} D_n - aD_{n-1} &= b(D_{n-1} - aD_{n-2}) \\ &= b^2(D_{n-2} - aD_{n-3}) = \cdots = b^{n-2}(D_2 - aD_1) \end{aligned}$$

# 行列式的思考算例三

得到递推公式:  $D_n = (a+b)D_{n-1} - abD_{n-2}$ .

$$\begin{aligned} D_n - aD_{n-1} &= b(D_{n-1} - aD_{n-2}) \\ &= b^2(D_{n-2} - aD_{n-3}) = \cdots = b^{n-2}(D_2 - aD_1) = b^n. \end{aligned}$$

# 行列式的思考算例三

得到递推公式:  $D_n = (a+b)D_{n-1} - abD_{n-2}$ .

$$\begin{aligned} D_n - aD_{n-1} &= b(D_{n-1} - aD_{n-2}) \\ &= b^2(D_{n-2} - aD_{n-3}) = \cdots = b^{n-2}(D_2 - aD_1) = b^n. \end{aligned}$$

$$D_n = aD_{n-1} + b^n$$

# 行列式的思考算例三

得到递推公式:  $D_n = (a+b)D_{n-1} - abD_{n-2}$ .

$$\begin{aligned} D_n - aD_{n-1} &= b(D_{n-1} - aD_{n-2}) \\ &= b^2(D_{n-2} - aD_{n-3}) = \cdots = b^{n-2}(D_2 - aD_1) = b^n. \end{aligned}$$

$$D_n = aD_{n-1} + b^n = a(aD_{n-2} + b^{n-1}) + b^n$$



# 行列式的思考算例三

得到递推公式:  $D_n = (a+b)D_{n-1} - abD_{n-2}$ .

$$\begin{aligned} D_n - aD_{n-1} &= b(D_{n-1} - aD_{n-2}) \\ &= b^2(D_{n-2} - aD_{n-3}) = \cdots = b^{n-2}(D_2 - aD_1) = b^n. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_n &= aD_{n-1} + b^n = a(aD_{n-2} + b^{n-1}) + b^n \\ &= a^2(aD_{n-3} + b^{n-2}) + ab^{n-1} + b^n = \cdots \end{aligned}$$

### 行列式的思考算例三

得到递推公式:  $D_n = (a+b)D_{n-1} - abD_{n-2}$ .

$$\begin{aligned} D_n - aD_{n-1} &= b(D_{n-1} - aD_{n-2}) \\ &= b^2(D_{n-2} - aD_{n-3}) = \cdots = b^{n-2}(D_2 - aD_1) = b^n. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_n &= aD_{n-1} + b^n = a(aD_{n-2} + b^{n-1}) + b^n \\ &= a^2(aD_{n-3} + b^{n-2}) + ab^{n-1} + b^n = \cdots \end{aligned}$$

另一计算方法:  $D_n - bD_{n-1} = a(D_{n-1} - bD_{n-2}) = \cdots = a^n$ .

# 行列式的思考算例三

得到递推公式:  $D_n = (a+b)D_{n-1} - abD_{n-2}$ .

$$\begin{aligned} D_n - aD_{n-1} &= b(D_{n-1} - aD_{n-2}) \\ &= b^2(D_{n-2} - aD_{n-3}) = \cdots = b^{n-2}(D_2 - aD_1) = b^n. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_n &= aD_{n-1} + b^n = a(aD_{n-2} + b^{n-1}) + b^n \\ &= a^2(aD_{n-3} + b^{n-2}) + ab^{n-1} + b^n = \cdots \end{aligned}$$

另一计算方法:  $D_n - bD_{n-1} = a(D_{n-1} - bD_{n-2}) = \cdots = a^n$ 。与前面式子结合一起成为

### 行列式的思考算例三

得到递推公式:  $D_n = (a+b)D_{n-1} - abD_{n-2}$ .

$$\begin{aligned} D_n - aD_{n-1} &= b(D_{n-1} - aD_{n-2}) \\ &= b^2(D_{n-2} - aD_{n-3}) = \cdots = b^{n-2}(D_2 - aD_1) = b^n. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_n &= aD_{n-1} + b^n = a(aD_{n-2} + b^{n-1}) + b^n \\ &= a^2(aD_{n-3} + b^{n-2}) + ab^{n-1} + b^n = \cdots \end{aligned}$$

另一计算方法:  $D_n - bD_{n-1} = a(D_{n-1} - bD_{n-2}) = \cdots = a^n$ 。与前面式子结合一起成为 二元一次方程组。求解即得到  $D_n$ 。

## 行列式的思考算例四

整数  $1798 = 31 \cdot 58$ ,  $2139 = 31 \cdot 69$ ,  $3255 = 31 \cdot 105$ ,  $4867 = 31 \cdot 157$ ,  
都可被31整除, 不用计算证明以下行列式可被31整除:

$$\begin{vmatrix} 1 & 7 & 9 & 8 \\ 2 & 1 & 3 & 9 \\ 3 & 2 & 5 & 5 \\ 4 & 8 & 6 & 7 \end{vmatrix}$$

# 行列式的思考算例五

$$\begin{vmatrix} \lambda & a & a & a & \dots & a \\ b & \alpha & \beta & \beta & \dots & \beta \\ b & \beta & \alpha & \beta & \dots & \beta \\ b & \beta & \beta & \alpha & \dots & \beta \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ b & \beta & \beta & \beta & \dots & \alpha \end{vmatrix}$$

# 作业

6 (4) , 8 (1) (3) , 10 (1) (2)

# 拉普拉斯定理

将行列式按多行（列）展开。



# 拉普拉斯定理

将行列式按多行（列）展开。

**拉普拉斯定理：**

# 拉普拉斯定理

将行列式按多行（列）展开。

**拉普拉斯定理：**在 $n$ 阶行列式中任意选定 $k$ 行（列），则 $n$ 阶行列式等于位于这 $k$ 个行（列）中一切 $k$ 阶子式 $M_i$ 与其代数余子式乘积的和。

# 拉普拉斯定理

将行列式按多行（列）展开。

**拉普拉斯定理：**在 $n$ 阶行列式中任意选定 $k$ 行（列），则 $n$ 阶行列式等于位于这 $k$ 个行（列）中一切 $k$ 阶子式 $M_i$ 与其代数余子式乘积的和。

$$|A| = \sum_{i=1}^{\binom{n}{k}} M_i A_i.$$

# 拉普拉斯定理

将行列式按多行（列）展开。

**拉普拉斯定理：**在 $n$ 阶行列式中任意选定 $k$ 行（列），则 $n$ 阶行列式等于位于这 $k$ 个行（列）中一切 $k$ 阶子式 $M_i$ 与其代数余子式乘积的和。

$$|A| = \sum_{i=1}^{\binom{n}{k}} M_i A_i.$$

证明过程简述：以 $k = 3$ 来说明。

# 拉普拉斯定理

将行列式按多行（列）展开。

**拉普拉斯定理：**在 $n$ 阶行列式中任意选定 $k$ 行（列），则 $n$ 阶行列式等于位于这 $k$ 个行（列）中一切 $k$ 阶子式 $M_i$ 与其代数余子式乘积的和。

$$|A| = \sum_{i=1}^{\binom{n}{k}} M_i A_i.$$

证明过程简述：以 $k=3$ 来说明。

$$|A| = \sum_{j_1 j_2 \dots j_n} (-1)^{\tau(j_1 \dots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3} \cdots a_{nj_n}.$$

# 拉普拉斯定理

$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33}$$

# 拉普拉斯定理

$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33} \sum_{123j_4 \dots j_n} (-1)^{\tau(123j_4 \dots j_n)} a_{4j_4} \cdots a_{nj_n} +$$

# 拉普拉斯定理

$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33} \sum_{123j_4 \dots j_n} (-1)^{\tau(123j_4 \dots j_n)} a_{4j_4} \cdots a_{nj_n} + \\ + a_{11}a_{22}a_{34}$$



# 拉普拉斯定理

$$\begin{aligned} |A| = & a_{11}a_{22}a_{33} \sum_{123j_4 \dots j_n} (-1)^{\tau(123j_4 \dots j_n)} a_{4j_4} \cdots a_{nj_n} + \\ & + a_{11}a_{22}a_{34} \sum_{124j_4 \dots j_n} (-1)^{\tau(124j_4 \dots j_n)} a_{4j_4} \cdots a_{nj_n} + \cdots \end{aligned}$$

# 拉普拉斯定理

$$\begin{aligned} |A| = & a_{11}a_{22}a_{33} \sum_{123j_4 \dots j_n} (-1)^{\tau(123j_4 \dots j_n)} a_{4j_4} \cdots a_{nj_n} + \\ & + a_{11}a_{22}a_{34} \sum_{124j_4 \dots j_n} (-1)^{\tau(124j_4 \dots j_n)} a_{4j_4} \cdots a_{nj_n} + \cdots \\ & + a_{12}a_{23}a_{31} \end{aligned}$$

# 拉普拉斯定理

$$\begin{aligned}|A| = & a_{11}a_{22}a_{33} \sum_{123j_4 \dots j_n} (-1)^{\tau(123j_4 \dots j_n)} a_{4j_4} \cdots a_{nj_n} + \\ & + a_{11}a_{22}a_{34} \sum_{124j_4 \dots j_n} (-1)^{\tau(124j_4 \dots j_n)} a_{4j_4} \cdots a_{nj_n} + \cdots \\ & + a_{12}a_{23}a_{31} \sum_{231j_4 \dots j_n} (-1)^{\tau(231j_4 \dots j_n)} a_{4j_4} \cdots a_{nj_n} + \cdots\end{aligned}$$

# 拉普拉斯定理

$$\begin{aligned}|A| = & a_{11}a_{22}a_{33} \sum_{123j_4 \dots j_n} (-1)^{\tau(123j_4 \dots j_n)} a_{4j_4} \cdots a_{nj_n} + \\ & + a_{11}a_{22}a_{34} \sum_{124j_4 \dots j_n} (-1)^{\tau(124j_4 \dots j_n)} a_{4j_4} \cdots a_{nj_n} + \cdots \\ & + a_{12}a_{23}a_{31} \sum_{231j_4 \dots j_n} (-1)^{\tau(231j_4 \dots j_n)} a_{4j_4} \cdots a_{nj_n} + \cdots \\ & + a_{1n}a_{2\underline{n-1}}a_{3\underline{n-2}} \sum_{\underline{nn-1n-2} \dots j_n} (-1)^{\tau(\underline{nn-1n-2} \dots j_n)} a_{4j_4} \cdots a_{nj_n}\end{aligned}$$

# 拉普拉斯定理

对任意排列 $j_1 \dots j_n$ ，将其分为前 $s$ 元和后 $n-s$ 元两部分：

$$j_1 \dots j_s \parallel j_{s+1} \dots j_n.$$

# 拉普拉斯定理

对任意排列 $j_1 \dots j_n$ , 将其分为前 $s$ 元和后 $n-s$ 元两部分:

$$j_1 \dots j_s \parallel j_{s+1} \dots j_n.$$

$j_1 \dots j_s j_{s+1} \dots j_n$ 的反序, 可以分为三种情况:

# 拉普拉斯定理

对任意排列 $j_1 \dots j_n$ ，将其分为前 $s$ 元和后 $n-s$ 元两部分：

$$j_1 \dots j_s \parallel j_{s+1} \dots j_n.$$

$j_1 \dots j_s j_{s+1} \dots j_n$ 的反序，可以分为三种情况：

- 在 $j_1, \dots, j_s$ 中挑一对数构成反序；

# 拉普拉斯定理

对任意排列 $j_1 \dots j_n$ ，将其分为前 $s$ 元和后 $n-s$ 元两部分：

$$j_1 \dots j_s \parallel j_{s+1} \dots j_n.$$

$j_1 \dots j_s j_{s+1} \dots j_n$ 的反序，可以分为三种情况：

- 在 $j_1, \dots, j_s$ 中挑一对数构成反序；
- 在 $j_{s+1}, \dots, j_n$ 中挑一对数构成反序；



# 拉普拉斯定理

对任意排列 $j_1 \dots j_n$ ，将其分为前 $s$ 元和后 $n-s$ 元两部分：

$$j_1 \dots j_s \parallel j_{s+1} \dots j_n.$$

$j_1 \dots j_s j_{s+1} \dots j_n$ 的反序，可以分为三种情况：

- 在 $j_1, \dots, j_s$ 中挑一对数构成反序；
- 在 $j_{s+1}, \dots, j_n$ 中挑一对数构成反序；
- $j_1, \dots, j_s$ 中挑一个数， $j_{s+1}, \dots, j_n$ 中挑一个数构成反序；

# 拉普拉斯定理

对任意排列 $j_1 \dots j_n$ ，将其分为前 $s$ 元和后 $n-s$ 元两部分：

$$j_1 \dots j_s \parallel j_{s+1} \dots j_n.$$

$j_1 \dots j_s j_{s+1} \dots j_n$ 的反序，可以分为三种情况：

- 在 $j_1, \dots, j_s$ 中挑一对数构成反序；
- 在 $j_{s+1}, \dots, j_n$ 中挑一对数构成反序；
- $j_1, \dots, j_s$ 中挑一个数， $j_{s+1}, \dots, j_n$ 中挑一个数构成反序；

因此关于反序数，容易证明如下公式：

# 拉普拉斯定理

对任意排列 $j_1 \dots j_n$ , 将其分为前 $s$ 元和后 $n-s$ 元两部分:

$$j_1 \dots j_s \parallel j_{s+1} \dots j_n.$$

$j_1 \dots j_s j_{s+1} \dots j_n$ 的反序, 可以分为三种情况:

- 在 $j_1, \dots, j_s$ 中挑一对数构成反序;
- 在 $j_{s+1}, \dots, j_n$ 中挑一对数构成反序;
- $j_1, \dots, j_s$ 中挑一个数,  $j_{s+1}, \dots, j_n$ 中挑一个数构成反序;

因此关于反序数, 容易证明如下公式:

$$\begin{aligned}\tau(j_1 \dots j_s j_{s+1} \dots j_n) &= \tau(j_1 \dots j_s) + \tau(j_{s+1} \dots j_n) \\ &\quad + \tau(j_1 \dots j_s, j_{s+1} \dots j_n).\end{aligned}$$

# 拉普拉斯定理

其中 $\tau(j_1 \dots j_s, j_{s+1} \dots j_n)$ 为 $j_1, \dots, j_s$ 中取一个数,  $j_{s+1}, \dots, j_n$ 中取一个数构成反序的个数。

# 拉普拉斯定理

其中 $\tau(j_1 \dots j_s, j_{s+1} \dots j_n)$ 为 $j_1, \dots, j_s$ 中取一个数,  $j_{s+1}, \dots, j_n$ 中取一个数构成反序的个数。

- $\tau(j_1 \dots j_s)$ 仅由 $j_1, \dots, j_s$ 取值决定, 与 $j_{s+1}, \dots, j_n$ 的排列无关。  
即 $j_1, \dots, j_s$ 给定, 则 $\tau(j_1 \dots j_s)$ 为常数。

# 拉普拉斯定理

其中 $\tau(j_1 \dots j_s, j_{s+1} \dots j_n)$ 为 $j_1, \dots, j_s$ 中取一个数,  $j_{s+1}, \dots, j_n$ 中取一个数构成反序的个数。

- $\tau(j_1 \dots j_s)$ 仅由 $j_1, \dots, j_s$ 取值决定, 与 $j_{s+1}, \dots, j_n$ 的排列无关。  
即 $j_1, \dots, j_s$ 给定, 则 $\tau(j_1 \dots j_s)$ 为常数。
- $\tau(j_1, \dots, j_s, j_{s+1} \dots j_n)$ 仅决定于从 $1, \dots, n$ 中取哪些数作为 $j_1, \dots, j_s$ , 与 $j_1 \dots j_s$  或 $j_{s+1} \dots j_n$ 的排列方式无关。

# 拉普拉斯定理

其中 $\tau(j_1 \dots j_s, j_{s+1} \dots j_n)$ 为 $j_1, \dots, j_s$ 中取一个数,  $j_{s+1}, \dots, j_n$ 中取一个数构成反序的个数。

- $\tau(j_1 \dots j_s)$ 仅由 $j_1, \dots, j_s$ 取值决定, 与 $j_{s+1}, \dots, j_n$ 的排列无关。  
即 $j_1, \dots, j_s$ 给定, 则 $\tau(j_1 \dots j_s)$ 为常数。
- $\tau(j_1, \dots, j_s, j_{s+1} \dots j_n)$ 仅决定于从 $1, \dots, n$ 中取哪些数作为 $j_1, \dots, j_s$ , 与 $j_1 \dots j_s$  或 $j_{s+1} \dots j_n$ 的排列方式无关。

利用这些特点, 前面式子等于

# 拉普拉斯定理

$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33}$$



# 拉普拉斯定理

$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33}(-1)^{\tau(123)}(-1)^{\tau(123,4\dots n)}$$

# 拉普拉斯定理

$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33}(-1)^{\tau(123)}(-1)^{\tau(123,4\dots n)} \sum_{j_4\dots j_n} (-1)^{\tau(j_4\dots j_n)} a_{4j_4} \cdots a_{nj_n}$$

# 拉普拉斯定理

$$\begin{aligned} |A| = & a_{11}a_{22}a_{33}(-1)^{\tau(123)}(-1)^{\tau(123,4\dots n)} \sum_{j_4\dots j_n} (-1)^{\tau(j_4\dots j_n)} a_{4j_4} \cdots a_{nj_n} \\ & + a_{11}a_{22}a_{34}(-1)^{\tau(124)}(-1)^{\tau(124,3\dots n)} \end{aligned}$$

# 拉普拉斯定理

$$\begin{aligned}|A| &= a_{11}a_{22}a_{33}(-1)^{\tau(123)}(-1)^{\tau(123,4\dots n)} \sum_{j_4\dots j_n} (-1)^{\tau(j_4\dots j_n)} a_{4j_4} \cdots a_{nj_n} \\ &\quad + a_{11}a_{22}a_{34}(-1)^{\tau(124)}(-1)^{\tau(124,3\dots n)} \sum_{j_4\dots j_n} (-1)^{\tau(j_4\dots j_n)} a_{4j_4} \cdots a_{nj_n} \\ &\quad + \cdots +\end{aligned}$$

# 拉普拉斯定理

$$\begin{aligned}|A| &= a_{11}a_{22}a_{33}(-1)^{\tau(123)}(-1)^{\tau(123,4\dots n)} \sum_{j_4\dots j_n} (-1)^{\tau(j_4\dots j_n)} a_{4j_4} \cdots a_{nj_n} \\ &\quad + a_{11}a_{22}a_{34}(-1)^{\tau(124)}(-1)^{\tau(124,3\dots n)} \sum_{j_4\dots j_n} (-1)^{\tau(j_4\dots j_n)} a_{4j_4} \cdots a_{nj_n} \\ &\quad + \cdots + \\ &\quad + a_{11}a_{23}a_{32}(-1)^{\tau(132)}(-1)^{\tau(132,4\dots n)}\end{aligned}$$

# 拉普拉斯定理

$$\begin{aligned} |A| &= a_{11}a_{22}a_{33}(-1)^{\tau(123)}(-1)^{\tau(123,4\dots n)} \sum_{j_4\dots j_n} (-1)^{\tau(j_4\dots j_n)} a_{4j_4} \cdots a_{nj_n} \\ &\quad + a_{11}a_{22}a_{34}(-1)^{\tau(124)}(-1)^{\tau(124,3\dots n)} \sum_{j_4\dots j_n} (-1)^{\tau(j_4\dots j_n)} a_{4j_4} \cdots a_{nj_n} \\ &\quad + \cdots + \\ &\quad + a_{11}a_{23}a_{32}(-1)^{\tau(132)}(-1)^{\tau(132,4\dots n)} \sum_{j_4\dots j_n} (-1)^{\tau(j_4\dots j_n)} a_{4j_4} \cdots a_{nj_n} \\ &\quad + \cdots + \end{aligned}$$

# 拉普拉斯定理

$$\begin{aligned} |A| &= a_{11}a_{22}a_{33}(-1)^{\tau(123)}(-1)^{\tau(123,4\dots n)} \sum_{j_4\dots j_n} (-1)^{\tau(j_4\dots j_n)} a_{4j_4} \cdots a_{nj_n} \\ &\quad + a_{11}a_{22}a_{34}(-1)^{\tau(124)}(-1)^{\tau(124,3\dots n)} \sum_{j_4\dots j_n} (-1)^{\tau(j_4\dots j_n)} a_{4j_4} \cdots a_{nj_n} \\ &\quad + \cdots + \\ &\quad + a_{11}a_{23}a_{32}(-1)^{\tau(132)}(-1)^{\tau(132,4\dots n)} \sum_{j_4\dots j_n} (-1)^{\tau(j_4\dots j_n)} a_{4j_4} \cdots a_{nj_n} \\ &\quad + \cdots + \\ &\quad + a_{1n}a_{2\underline{n-1}}a_{3\underline{n-2}}(-1)^{\tau(\cdot)}(-1)^{\tau(\cdot,\cdot)} \sum_{j_4\dots j_n} (-1)^{\tau(j_4\dots j_n)} a_{4j_4} \cdots a_{nj_n} \end{aligned}$$

# 拉普拉斯定理

$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33}(-1)^{\tau(123)}(-1)^{\tau(123,4\dots n)}$$



# 拉普拉斯定理

$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33}(-1)^{\tau(123)}(-1)^{\tau(123,4\dots n)} \begin{vmatrix} a_{44} & \dots & a_{4n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n4} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} +$$

# 拉普拉斯定理

$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33}(-1)^{\tau(123)}(-1)^{\tau(123,4\dots n)} \begin{vmatrix} a_{44} & \dots & a_{4n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n4} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} +$$

$$a_{11}a_{22}a_{34}(-1)^{\tau(124)}(-1)^{\tau(124,3\dots n)}$$

# 拉普拉斯定理

$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33}(-1)^{\tau(123)}(-1)^{\tau(123,4\dots n)} \begin{vmatrix} a_{44} & \dots & a_{4n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n4} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} +$$
$$a_{11}a_{22}a_{34}(-1)^{\tau(124)}(-1)^{\tau(124,3\dots n)} \begin{vmatrix} a_{43} & a_{45} & \dots & a_{4n} \\ a_{53} & a_{55} & \dots & a_{5n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n3} & a_{n5} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \dots$$

# 拉普拉斯定理

上式的最后一项为：

# 拉普拉斯定理

上式的最后一项为：

$$a_{1n}a_{2\underline{n-1}}a_{3\underline{n-2}}(-1)^{\tau(\cdot)}(-1)^{\tau(\overline{nn-1n-2,1\dots n-3})} \begin{vmatrix} a_{41} & \dots & a_{4,n-3} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn-3} \end{vmatrix}$$

# 拉普拉斯定理

上式的最后一项为：

$$a_{1n}a_{2\underline{n-1}}a_{3\underline{n-2}}(-1)^{\tau(\cdot)}(-1)^{\tau(\overline{nn-1n-2,1\dots n-3})} \begin{vmatrix} a_{41} & \dots & a_{4,n-3} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn-3} \end{vmatrix}$$

而上式的项中含有因子  $M_{4\dots n} = \begin{vmatrix} a_{44} & \dots & a_{4n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n4} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$  的项有：

# 拉普拉斯定理

$$a_{11}a_{22}a_{33}(-1)^{\tau(123)}(-1)^{\tau(123,4\dots n)}M_{4\dots n}$$

# 拉普拉斯定理

$$a_{11}a_{22}a_{33}(-1)^{\tau(123)}(-1)^{\tau(123,4\dots n)}M_{4\dots n}$$

$$a_{11}a_{23}a_{32}(-1)^{\tau(132)}(-1)^{\tau(123,4\dots n)}M_{4\dots n}$$



# 拉普拉斯定理

$$a_{11}a_{22}a_{33}(-1)^{\tau(123)}(-1)^{\tau(123,4\dots n)}M_{4\dots n}$$

$$a_{11}a_{23}a_{32}(-1)^{\tau(132)}(-1)^{\tau(123,4\dots n)}M_{4\dots n}$$

$$a_{12}a_{21}a_{33}(-1)^{\tau(213)}(-1)^{\tau(123,4\dots n)}M_{4\dots n}$$

# 拉普拉斯定理

$$a_{11}a_{22}a_{33}(-1)^{\tau(123)}(-1)^{\tau(123,4\dots n)}M_{4\dots n}$$

$$a_{11}a_{23}a_{32}(-1)^{\tau(132)}(-1)^{\tau(123,4\dots n)}M_{4\dots n}$$

$$a_{12}a_{21}a_{33}(-1)^{\tau(213)}(-1)^{\tau(123,4\dots n)}M_{4\dots n}$$

$$a_{12}a_{23}a_{31}(-1)^{\tau(231)}(-1)^{\tau(123,4\dots n)}M_{4\dots n}$$

$$a_{13}a_{21}a_{32}(-1)^{\tau(312)}(-1)^{\tau(123,4\dots n)}M_{4\dots n}$$

$$a_{13}a_{22}a_{31}(-1)^{\tau(321)}(-1)^{\tau(123,4\dots n)}M_{4\dots n}$$

# 拉普拉斯定理

$$a_{11}a_{22}a_{33}(-1)^{\tau(123)}(-1)^{\tau(123,4\dots n)}M_{4\dots n}$$

$$a_{11}a_{23}a_{32}(-1)^{\tau(132)}(-1)^{\tau(123,4\dots n)}M_{4\dots n}$$

$$a_{12}a_{21}a_{33}(-1)^{\tau(213)}(-1)^{\tau(123,4\dots n)}M_{4\dots n}$$

$$a_{12}a_{23}a_{31}(-1)^{\tau(231)}(-1)^{\tau(123,4\dots n)}M_{4\dots n}$$

$$a_{13}a_{21}a_{32}(-1)^{\tau(312)}(-1)^{\tau(123,4\dots n)}M_{4\dots n}$$

$$a_{13}a_{22}a_{31}(-1)^{\tau(321)}(-1)^{\tau(123,4\dots n)}M_{4\dots n}$$

这些项的和为：

# 拉普拉斯定理

$$\begin{aligned} & (-1)^{\tau(123,4\dots n)} M_{4\dots n} [(-1)^{\tau(123)} a_{11} a_{22} a_{33} + (-1)^{\tau(132)} a_{11} a_{23} a_{32} \\ & (-1)^{\tau(213)} a_{12} a_{21} a_{33} + (-1)^{\tau(231)} a_{12} a_{23} a_{31} + (-1)^{\tau(312)} a_{13} a_{21} a_{32} \\ & + (-1)^{\tau(321)} a_{13} a_{22} a_{31}] \end{aligned}$$

# 拉普拉斯定理

$$\begin{aligned} & (-1)^{\tau(123,4\dots n)} M_{4\dots n} [(-1)^{\tau(123)} a_{11} a_{22} a_{33} + (-1)^{\tau(132)} a_{11} a_{23} a_{32} \\ & (-1)^{\tau(213)} a_{12} a_{21} a_{33} + (-1)^{\tau(231)} a_{12} a_{23} a_{31} + (-1)^{\tau(312)} a_{13} a_{21} a_{32} \\ & + (-1)^{\tau(321)} a_{13} a_{22} a_{31}] = (-1)^{\tau(123,4\dots n)} M_{4\dots n} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

# 拉普拉斯定理

$$\begin{aligned} & (-1)^{\tau(123,4\dots n)} M_{4\dots n} [(-1)^{\tau(123)} a_{11} a_{22} a_{33} + (-1)^{\tau(132)} a_{11} a_{23} a_{32} \\ & (-1)^{\tau(213)} a_{12} a_{21} a_{33} + (-1)^{\tau(231)} a_{12} a_{23} a_{31} + (-1)^{\tau(312)} a_{13} a_{21} a_{32} \\ & + (-1)^{\tau(321)} a_{13} a_{22} a_{31}] = (-1)^{\tau(123,4\dots n)} M_{4\dots n} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$|A|$ 中的其它项也有类似的结果，因此：

# 拉普拉斯定理

$$\begin{aligned} |A| = & (-1)^{\tau(123,4\dots n)} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_{44} & \dots & a_{4n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n4} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \\ & + (-1)^{\tau(124,35\dots n)} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_{43} & a_{45} & \dots & a_{4n} \\ a_{53} & a_{55} & \dots & a_{5n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n3} & a_{n5} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \dots \end{aligned}$$

# 拉普拉斯定理

上式的最后一项为：



# 拉普拉斯定理

上式的最后一项为：

$$(-1)^{\tau(\overline{nn-1}n-2, 1\dots n-3)} \begin{vmatrix} a_{1,n-2} & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{2,n-2} & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ a_{3,n-2} & a_{3,n-1} & a_{3n} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_{41} & \dots & a_{4n-3} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn-3} \end{vmatrix}$$

# 拉普拉斯定理

上式的最后一项为：

$$(-1)^{\tau(\overline{nn-1}n-2, 1\dots n-3)} \begin{vmatrix} a_{1,n-2} & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{2,n-2} & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ a_{3,n-2} & a_{3,n-1} & a_{3n} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_{41} & \dots & a_{4n-3} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn-3} \end{vmatrix}$$

上式已经具备了拉普拉斯定理的主要形式。只是出现了 $\tau(j_1 j_2 j_3, j_4 \dots j_n)$ ，与拉普拉斯定理不符。

# 拉普拉斯定理

上式的最后一项为：

$$(-1)^{\tau(\overline{nn-1}n-2, 1 \dots n-3)} \begin{vmatrix} a_{1,n-2} & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{2,n-2} & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ a_{3,n-2} & a_{3,n-1} & a_{3n} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_{41} & \dots & a_{4n-3} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn-3} \end{vmatrix}$$

上式已经具备了拉普拉斯定理的主要形式。只是出现了 $\tau(j_1 j_2 j_3, j_4 \dots j_n)$ ，与拉普拉斯定理不符。 $\tau(j_1 j_2 j_3, j_4 \dots j_n)$ 除了按定义计算外，还可以如下计算：

# 拉普拉斯定理

前面已经说明,  $\tau(j_1 j_2 j_3, j_4 \dots j_n)$  与  $j_1 j_2 j_3$  的排列方式无关。

假定  $j_1 j_2 j_3$  已经排好序:  $j_1 < j_2 < j_3$ 。

# 拉普拉斯定理

前面已经说明,  $\tau(j_1j_2j_3, j_4 \dots j_n)$  与  $j_1j_2j_3$  的排列方式无关。

假定  $j_1j_2j_3$  已经排好序:  $j_1 < j_2 < j_3$ 。

- $j_1j_2j_3, j_4 \dots j_n$  的因  $j_1$  而起的反序数为:

# 拉普拉斯定理

前面已经说明,  $\tau(j_1 j_2 j_3, j_4 \dots j_n)$  与  $j_1 j_2 j_3$  的排列方式无关。

假定  $j_1 j_2 j_3$  已经排好序:  $j_1 < j_2 < j_3$ 。

- $j_1 j_2 j_3, j_4 \dots j_n$  的因  $j_1$  而起的反序数为:  $j_1 - 1$ 。

# 拉普拉斯定理

前面已经说明,  $\tau(j_1 j_2 j_3, j_4 \dots j_n)$  与  $j_1 j_2 j_3$  的排列方式无关。

假定  $j_1 j_2 j_3$  已经排好序:  $j_1 < j_2 < j_3$ 。

- $j_1 j_2 j_3, j_4 \dots j_n$  的因  $j_1$  而起的反序数为:  $j_1 - 1$ 。
- $j_1 j_2 j_3, j_4 \dots j_n$  的因  $j_2$  而起的反序数为:

# 拉普拉斯定理

前面已经说明,  $\tau(j_1 j_2 j_3, j_4 \dots j_n)$  与  $j_1 j_2 j_3$  的排列方式无关。

假定  $j_1 j_2 j_3$  已经排好序:  $j_1 < j_2 < j_3$ 。

- $j_1 j_2 j_3, j_4 \dots j_n$  的因  $j_1$  而起的反序数为:  $j_1 - 1$ 。
- $j_1 j_2 j_3, j_4 \dots j_n$  的因  $j_2$  而起的反序数为:  $j_2 - 2$ 。



# 拉普拉斯定理

前面已经说明,  $\tau(j_1 j_2 j_3, j_4 \dots j_n)$  与  $j_1 j_2 j_3$  的排列方式无关。

假定  $j_1 j_2 j_3$  已经排好序:  $j_1 < j_2 < j_3$ 。

- $j_1 j_2 j_3, j_4 \dots j_n$  的因  $j_1$  而起的反序数为:  $j_1 - 1$ 。
- $j_1 j_2 j_3, j_4 \dots j_n$  的因  $j_2$  而起的反序数为:  $j_2 - 2$ 。
- $j_1 j_2 j_3, j_4 \dots j_n$  的因  $j_3$  而起的反序数为:

# 拉普拉斯定理

前面已经说明,  $\tau(j_1j_2j_3, j_4 \dots j_n)$  与  $j_1j_2j_3$  的排列方式无关。

假定  $j_1j_2j_3$  已经排好序:  $j_1 < j_2 < j_3$ 。

- $j_1j_2j_3, j_4 \dots j_n$  的因  $j_1$  而起的反序数为:  $j_1 - 1$ 。
- $j_1j_2j_3, j_4 \dots j_n$  的因  $j_2$  而起的反序数为:  $j_2 - 2$ 。
- $j_1j_2j_3, j_4 \dots j_n$  的因  $j_3$  而起的反序数为:  $j_3 - 3$ 。

# 拉普拉斯定理

前面已经说明,  $\tau(j_1j_2j_3, j_4 \dots j_n)$  与  $j_1j_2j_3$  的排列方式无关。

假定  $j_1j_2j_3$  已经排好序:  $j_1 < j_2 < j_3$ 。

- $j_1j_2j_3, j_4 \dots j_n$  的因  $j_1$  而起的反序数为:  $j_1 - 1$ 。
- $j_1j_2j_3, j_4 \dots j_n$  的因  $j_2$  而起的反序数为:  $j_2 - 2$ 。
- $j_1j_2j_3, j_4 \dots j_n$  的因  $j_3$  而起的反序数为:  $j_3 - 3$ 。

$$\therefore \tau(j_1j_2j_3, j_4 \dots j_n) = j_1 - 1 + j_2 - 2 + j_3 - 3.$$

# 拉普拉斯定理

前面已经说明,  $\tau(j_1j_2j_3, j_4 \dots j_n)$  与  $j_1j_2j_3$  的排列方式无关。

假定  $j_1j_2j_3$  已经排好序:  $j_1 < j_2 < j_3$ 。

- $j_1j_2j_3, j_4 \dots j_n$  的因  $j_1$  而起的反序数为:  $j_1 - 1$ 。
- $j_1j_2j_3, j_4 \dots j_n$  的因  $j_2$  而起的反序数为:  $j_2 - 2$ 。
- $j_1j_2j_3, j_4 \dots j_n$  的因  $j_3$  而起的反序数为:  $j_3 - 3$ 。

$$\therefore \tau(j_1j_2j_3, j_4 \dots j_n) = j_1 - 1 + j_2 - 2 + j_3 - 3.$$

又

$$(-1)^{j_1-1+j_2-2+j_3-3} = (-1)^{j_1+1+j_2+2+j_3+3},$$

# 拉普拉斯定理

$$\begin{aligned}
 |A| = & (-1)^{1+2+3+1+2+3} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_{44} & \dots & a_{4n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n4} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \\
 & + (-1)^{1+2+3+1+2+4} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_{43} & a_{45} & \dots & a_{4n} \\ a_{53} & a_{55} & \dots & a_{5n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n3} & a_{n5} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \dots
 \end{aligned}$$

# 拉普拉斯定理

这就是拉普拉斯定理。

# 拉普拉斯定理

这就是拉普拉斯定理。

例题：P. 33(4)。