

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

БОЛЬШОЕ НАЗВАНИЕ КУРСА
V СЕМЕСТР

Лектор: *Иван Иванович Иванов*

h\nu

Автор: *Павел Дуров*
Репозиторий на Github

осень 2022

Содержание

1	Числовые Ряды	2
1.1	Ряды с неотрицательными членами	4

1 Числовые Ряды

Определение 1.1. Пусть $\{a_n\}$ — последовательность чисел. Выражение $\sum_{i=1}^{\infty} a_i = a_1 + a_2 + \dots$ называется числовым рядом с n -ым членом a_n . При этом сумма $\sum_{i=1}^N a_i = S_N$ называется N -ой частичной суммой, а $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N$ называется суммой ряда. Тогда кратко пишут: $S = \sum_{i=1}^{\infty} a_i$. Причем, если указанный предел конечен, то ряд называется сходящимся, иначе — расходящимся.

Пример (Геометрический ряд). Рассмотрим ряд

$$\sum_{i=1}^{\infty} z^n$$

1. $|z| < 1$. Заметим, что $1 + z + \dots + z^N = \frac{1-z^{N+1}}{1-z}$. Тогда $\lim_{N \rightarrow \infty} z^{N+1} = 0$ и $\exists \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \frac{1}{1-z}$.
2. $|z| \geq 1$. Заметим, что $z^N = S_N - S_{N-1} \rightarrow 0$. Но $z^N \not\rightarrow 0$, тогда этот ряд расходится. $\nexists \lim_{N \rightarrow \infty} S_N$.

Замечание. Геометрический ряд сходится $\Leftrightarrow |z| < 1$.

Лемма 1.1 (Телескопические ряды). Для числовой последовательности $\{s_n\}$ рассмотрим последовательность $a_n = s_n - s_{n+1}$. Тогда

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i \text{ сходится} \Leftrightarrow \{s_i\} \text{ сходится}$$

В этом случае,

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i = s_1 - \lim_{N \rightarrow \infty} s_N$$

Доказательство.

$$S_n = (s_1 - s_2) + (s_2 - s_3) + \dots + (s_n - s_{n+1}) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = s_1 - \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$$

□

Пример.

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i(i+1)}$$

$$a_i = \frac{1}{i} - \frac{1}{i+1}$$

Т.к. $\frac{1}{i}$ —

Утверждение 1.1 (Локализация). Для любого $m \in \mathbb{N}$ ряды

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_n, \quad \sum_{i=m+1}^{\infty} a_n$$

Сходятся или не сходятся одновременно, причем, если сходятся, то

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_n = \sum_{i=1}^m a_n + \sum_{i=m+1}^{\infty} a_n$$

Доказательство. При $N > m$ имеем

$$\sum_{i=1}^N = \sum_{i=1}^m a_n + \sum_{i=m+1}^N a_n$$

Поэтому

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_n, \sum_{i=m+1}^{\infty} a_n$$

Сходятся или не сходятся одновременно. В случае сходимости достаточно применить предельный переход для доказательства равенства. \square

Определение 1.2. Ряд $r_N = \sum_{i=N+1}^{\infty} a_n$ называется N -ым остатком ряда

Утверждение 1.2 (Линейность). Пусть ряды $\sum_{i=1}^{\infty} a_n, \sum_{i=1}^{\infty} b_n$ сходятся и $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$. Тогда сходится и ряд $\sum_{i=1}^{\infty} \lambda a_n + \mu b_n$, причем

$$\lambda \sum_{i=1}^{\infty} a_n + \mu \sum_{i=1}^{\infty} b_n = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda a_n + \mu b_n$$

Доказательство. Очевидно при предельном переходе \square

Утверждение 1.3 (Необходимое условие сходимости ряда). Если $\sum_{i=1}^{\infty} a_n$ сходится, то $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

Доказательство. $a_n = S_n - S_{n-1}$. Тогда $S_n - S_{n-1} \rightarrow \sum_{i=1}^{\infty} a_n - \sum_{i=1}^{\infty} a_n = 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ \square

Обратное неверно:

Пример (Гармонический ряд).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$$

$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$. Но тогда:

$$H_{2n} - H_n \geq n \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$$

Противоречие, т.к. если ряд сходится, то начиная с какого то момента все H_n удалены друг от друга не более чем на $\varepsilon \forall \varepsilon > 0$.

Теорема 1.1 (Коши). $\sum_{i=1}^{\infty} a_n$ сходится $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N \forall m, n \geq N (|\sum_{k=m+1}^n a_k| < \varepsilon)$

Доказательство. Утверждение является переформулировкой критерия Коши для последовательности s_n . \square

Определение 1.3. Если ряд $\sum_{i=1}^{\infty} |a_n|$ сходится, то его называют абсолютно сходящимся, иначе — условно сходящимся.

Следствие. Абсолютная сходимость влечет условную сходимость

Доказательство.

$$\forall n > m \left| \sum_{k=m+1}^n a_k \right| \leq \sum_{k=m+1}^n |a_k|$$

□

Следствие. $a_n \in \mathbb{C}, a_n = u_n + iv_n$. Тогда ряд сходится \Leftrightarrow сходятся ряды вещественной и мнимой частей. При этом,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} u_n + i \sum_{n=1}^{\infty} v_n$$

Пусть $a_n \in \mathbb{R}$ — последовательность вещественных чисел. Рассмотрим $f_a : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f_a(x) = a_n, n \leq x < n+1$

Лемма 1.2 (О равносходимости). Пусть $a_n \in \mathbb{R}$. Тогда

$$\sum_{i=1}^n \text{сходится} \Leftrightarrow \int_1^{+\infty} f_a(x) dx \text{ сходится}$$

Причем в случае сходимости, левая и правая части равны

Доказательство. Пусть интеграл сходится:

$$s_n = \sum_{k=1}^n a_k \Rightarrow s_n = \int_1^{n+1} f_a(x) dx$$

Пусть ряд сходится, s_n — его частичная сумма ($n = [x]$). Тогда:

$$\begin{aligned} \left| \int_1^x f_a(t) dt - S \right| &\leq \left| \int_1^x f_a(t) dt - S_n \right| + |S_n - S| \leq \left| \int_1^x f_a(t) dt - \int_1^{n+1} f_a(t) dt \right| + |S_n - S| \leq \\ &\leq |a_n| + |S_n - S| \end{aligned}$$

□

1.1 Ряды с неотрицательными членами

Лемма 1.3. Пусть $a_n \geq 0 \forall n \in \mathbb{N}$. Тогда ряд a_n сходится тогда и только тогда, когда $\{S_n\}$ — ограничена.

Доказательство. Т.к. $S_{n+1} = S_n + a_n \Rightarrow S_n$ нестрого возрастает. По теореме о монотонной последовательности, она сходится \Leftrightarrow она ограничена. □

Теорема 1.2 (Признак сравнения). Пусть $0 \leq a_n \leq b_n \forall n \in \mathbb{N}$

1. Если $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится, то и $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — тоже
2. Если $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится, то и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ — тоже

Доказательство. По лемме о равносходимости данная теорема равносильна признаку сходимости для интегралов \square

Следствие. Пусть $a_n, b_n \geq 0 \forall n \in \mathbb{N}$, $a_n = O(b_n), n \rightarrow \infty$. Тогда справедливо заключение предыдущей теоремы

Следствие. Пусть $a_n, b_n \geq 0 \forall n \in \mathbb{N}$, $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} \in (0, +\infty)$. Тогда $\sum_{i=1}^{\infty} a_n, \sum_{i=1}^{\infty} b_n$ сходятся или расходятся одновременно

Теорема 1.3 (Интегральный признак). Пусть f нестрого убывает и неотрицательна на $[1, +\infty]$. Тогда последовательность $u_n = f(1) + \dots + f(n) - \int_1^{n+1} f(t)dt$ сходится, в частности, $\sum_{i=1}^{\infty} a_n, \int_1^{+\infty} f(t)dt$ сходятся или расходятся одновременно