

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

БОЛЬШОЕ НАЗВАНИЕ КУРСА
V СЕМЕСТР

Лектор: *Иван Иванович Иванов*

h/ν

Автор: *Павел Дуров*
Репозиторий на Github

осень 2022

Содержание

0.1	Несобственные интегралы от знакопеременных функций	2
0.2	Несобственные интегралы с несколькими особенностями	4

0.1 Несобственные интегралы от знакопеременных функций

Изучим вопросы сходимости несобственных интегралов от функций ни в какой функции точки b .

Лемма 0.1. Пусть f, g — локально интегрируемы на $[a, b)$ и $\int_a^b g(x)dx$ — абсолютно сходится. Тогда несобственные интегралы

$$\int_a^b (f(x) + g(x))dx, \int_a^b f(x)dx$$

Либо одинаково расходятся, либо одновременно сходятся условно, либо одновременно сходятся абсолютно.

Доказательство. Абсолютная сходимость влечет сходимость, поэтому $\int_a^b g(x)dx$ сходится. Тогда по линейности

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b (f(x) + g(x))dx - \int_a^b g(x)dx$$

И заключаем, что интегралы $\int_a^b (f(x) + g(x))dx, \int_a^b f(x)dx$ сходятся одновременно. При этом,

$$|f + g| \leq |f| + |g|, |f| \leq |f + g| + |g|$$

Тогда по критерию сравнения, получаем, что $\int_a^b |f(x) + g(x)|dx, \int_a^b |f(x)|dx$ сходятся одновременно, т.е. $\int_a^b (f(x) + g(x))dx, \int_a^b f(x)dx$ абсолютно сходятся одновременно. \square

Теорема 0.1 (Признак Дирихле). Пусть f, g локально интегрируемы на $[a, b)$, причем

1. $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ ограничена на $[a, b)$
2. $g(x)$ — монотонна
3. $g \rightarrow 0$ при $x \rightarrow b - 0$

Тогда $\int_a^b f(x)g(x)dx$ сходится.

Доказательство. Существует такая константа $M : |F| \leq M$. Тогда $\forall \xi \in [a, b)$ имеем $\left| \int_\xi^x f(t)g(t)dt \right| = |F(x) - F(\xi)| < 2M$. Пусть $\varepsilon > 0$. Тогда $\exists b' \in [a, b) \forall x \in (b', b)$ ($|g(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2M}$).

По лемме Абеля, для интервалов $\forall [\xi, \eta] \subset (b', b)$ выполнено $\left| \int_\xi^\eta f(x)g(x)dx \right| < 2 \cdot 2M(|g(\xi)| + |g(\eta)|) < \varepsilon$. Далее применяем свойство Коши. \square

Замечание. Условия 1, 2 выполнены если f непрерывна и имеет ограниченную первообразную на $[a, b)$, а g дифференцируема и g' сохраняет знак на $[a, b)$.

Пример. Исследуем сходимость и абсолютную сходимость интеграла

$$I(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{\sin kx}{x^\alpha} dx, \alpha \in \mathbb{R} (k > 0)$$

Делаем замену $t = kx$ и получаем следующее:

$$I(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\alpha} dt$$

1. $\alpha > 1$.

$$\left| \frac{\sin t}{t^\alpha} \right| \leq \frac{1}{t^\alpha} \Rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{|\sin t|}{t^\alpha} dt - \text{сходится}$$

То есть $I(\alpha)$ сходится абсолютно

2. $\alpha \leq 0$. Проверим расходимость при помощи Коши.

$$\exists \varepsilon_0 = \forall \Delta > 1 \exists \xi = 2\pi n > \Delta, \eta = 2\pi n + \pi > \Delta$$

$$\left| \int_\xi^\eta \frac{\sin t}{t^\alpha} dt \right| = \int_\xi^\eta t^{-\alpha} \sin t dt \geq (2\pi n)^{-\alpha} \int_{2\pi n}^{2\pi n + \pi} \sin t dt = (2\pi n)^{-\alpha} \cdot 2 \geq 2$$

Тогда по критерию Коши, $I(\alpha)$ расходится.

3. $\alpha \in (0, 1]$.

$$f(x) = \sin x, g(t) = \frac{1}{t^\alpha}, F(t) = \int_1^t \sin s ds - \text{ограничена на } 1, +\infty$$

Тогда $I(\alpha)$ сходится по признаку Дирихле. Теперь проверим абсолютную сходимость:

$$\left| \frac{\sin x}{x^\alpha} \right| \geq \frac{\sin^2 x}{x^\alpha} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x^\alpha} - \frac{\cos 2x}{x^\alpha} \right) \geq 0$$

При этом $\int \frac{1}{x^\alpha} - \text{расходится}$, а $\int \frac{\cos 2x}{x^\alpha} - \text{сходится}$. Тогда их разность расходится.

Тогда $I(\alpha)$ сходится при $\alpha > 0$ и абсолютно сходится при $\alpha > 1$

Теорема 0.2 (Признак Абеля). Пусть f, g локально интегрируемы на $[a, b)$, причем

1. $\int_a^b f(x) dx$ сходится
2. g монотонна на $[a, b)$
3. g ограничена на $[a, b)$

Тогда

$$\int_a^b f(x)g(x)dx$$

сходится.

Доказательство. Из монотонности и ограниченности следует, что $\exists \lim_{x \rightarrow b-0} g(x) = c \in \mathbb{R}$. Поэтому $\int_a^b f(x)(g(x) - c)dx$ сходится, но тогда $\int_a^b f(x)g(x)dx = \int_a^b f(x)(g(x) - c)dx + c \int_a^b f(x)dx - \text{сходится}$ \square

Пример.

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x} - \sin x} dx$$

$$\frac{\sin x}{\sqrt{x} - \sin x} \sim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}}$$

Так делать нельзя, т.к. свойство, котоыре мы использовали выше, работает только для неотрицательных функций. Как правильно:

$$g(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{x}} = \frac{\sin x(\sqrt{x} - (\sqrt{x} - \sin x))}{\sqrt{x}(\sqrt{x} - \sin x)}$$

$$g(x) = \frac{\sin^2 x}{x(1 - \frac{\sin x}{\sqrt{x}})} \sim \frac{\sin^2 x}{x} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} - \frac{\cos x}{x} \right) \geq 0 \Rightarrow \int_1^{+\infty} g(x)dx - \text{расходится}$$

Короче говоря, принцип сравнения для знакопеременных функций не применим

Следствие (Из теоремы 4). Пусть f, g локально интегрируемы на $[a, b)$ и g монотонна на $[a, b)$, $\lim_{x \rightarrow b-0} g(x) = c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Тогда $\int_a^b f(x)g(x)dx, \int_a^b f(x)dx$ либо одновременно расходятся, либо одновременно сходятся условно, либо одновременно сходятся абсолютно.

Доказательство. Из сходимости $\int_a^b f(x)dx$ следует сходимость $\int_a^b f(x)g(x)dx$ по теореме 4. Т.к. $c \neq 0$, то $\exists a^* \in [a, b) \forall x \in [a^*, b) (g(x) \neq 0)$. Следовательно, $f = fg \cdot \frac{1}{g}$ на $[a, b)$. По теореме 4, сходимость $\int_{a^*}^b f(x)g(x)dx$ влечет $\int_{a^*}^b f(x)dx$, а значит, $\int_a^b f(x)dx$ сходится \square

0.2 Несобственные интегралы с несколькими особенностями

Определение 0.1. Пусть $a < b \in \overline{\mathbb{R}}$, функция f определена на a, b за исключением, быть может, конечного числа точек. Точка $c \in (a, b)$ называется особенностью f , если $\forall [\alpha, \beta] : c \in [\alpha, \beta] \subset (a, b)$ функция $f \notin R[\alpha, \beta]$. Точка b называется особенностью f , если либо