

Московский физико-технический институт  
Физтех-школа прикладной математики и информатики

БОЛЬШОЕ НАЗВАНИЕ КУРСА  
V СЕМЕСТР

Лектор: *Иван Иванович Иванов*

**$h/nu$**

Автор: *Павел Дуров*  
*Проект на Github*

осень 2022

## Содержание

<b>1</b>	<b>Квадратичные вычеты и невычеты</b>	<b>2</b>
----------	---------------------------------------	----------

# 1 Квадратичные вычеты и невычеты

**Определение 1.1.** Пусть  $a, m \in \mathbb{N}$ ,  $(a, m) = 1$ . Тогда

Если  $\exists x : x^2 \equiv_m a$ , то  $a$  называется квадратичным вычетом

Если  $\nexists x : x^2 \equiv_m a$ , то  $a$  называется квадратичным невычетом

Будем рассматривать случай, когда  $m$  — простое нечетное число

**Теорема 1.1** (Лагранжа). Пусть  $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ . Тогда число решений  $f(x) \equiv_p 0$  не превосходит  $n$ .

*Доказательство.* От противного: пусть найдутся  $x_1, \dots, x_{n+1}$ , т.ч. они являются решениями. Заметим, что  $f$  можно представить следующим образом:

$$\begin{aligned} f(x) &= b_n(x - x_1) \dots (x - x_n) \\ &\quad + b_{n-1}(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}) \\ &\quad \vdots \\ &\quad + b_1(x - x_1) \\ &\quad + b_0 \end{aligned}$$

Но тогда, подставляя  $x_1 \dots x_{n-1}$  получаем, что все  $b_i = 0 \forall i \leq n-1$ . Но тогда  $f(x_{n+1}) \neq 0$ . Противоречие.  $\square$

**Замечание.** Если  $m$  — простое нечетное число, то решений

$$x^2 \equiv a^2$$

Ровно 2 ( $x = \pm a$ )

**Замечание.** Множество всех квадратичных вычетов:

$$\left\{ 1^2, 2^2, \dots, \frac{p-1}{2}^2 \right\}$$

Итого, квадратичных вычетов  $\frac{p-1}{2}$ , ровно как и невычетов.

**Определение 1.2.** Символ Лежандра  $\left(\frac{a}{p}\right)$  — читается "a по p"

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 0, & a = 0 \\ 1, & a \text{ — вычет} \\ -1, & a \text{ — невычет} \end{cases}$$

**Анекдот:** посчитать сумму

$$\frac{4}{p+1} \sum_{a=1}^p \left(\frac{a}{p}\right)$$

*Решение (1).* Если вы знаете, что  $\left(\frac{a}{p}\right)$  — символ Лежандра, то сумма будет равна 0

*Решение (2).* Иначе, вы посчитаете арифметическую прогрессию и получите свою оценку на экзамене

Рассмотрим уравнение

$$a^{p-1} \equiv_p 1$$

$$\left(a^{\frac{p-1}{2}} - 1\right) \left(a^{\frac{p-1}{2}} + 1\right) \equiv_p 0$$

Причем, первая скобка имеет не более  $\frac{p-1}{2}$  решений, поэтому, т.к. любой квадратичный вычет ее зануляет, ее решения — только квадратичные вычеты. Таким образом:

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv_p a^{\frac{p-1}{2}}$$

Поэтому можно сказать, что

$$\left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right) = \left(\frac{ab}{p}\right)$$

**Замечание.**

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$$

**Утверждение 1.1.** *Зафиксируем некоторое число  $a$ . Пусть  $x$  пробегает числа  $1, 2, \dots, \frac{p-1}{2} = p_1$ . Рассмотрим числа  $ax = \varepsilon_x \cdot r_x$ , где  $\varepsilon_x \in \{0, 1\}, r_x \in \{1, 2, \dots, p_1\}$ . Тогда  $x \neq y \Rightarrow r_x \neq r_y$ .*