

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
IV СЕМЕСТР

Лектор:

h\nu

Автор: *Киселев Николай*
Репозиторий на Github

весна 2025

Содержание

1	Введение	2
1.1	Предисловие	2
1.2	Напоминание с ОВиТМа	2
2	Вероятностная мера на прямой	3
2.1	Классификация вероятностных мер	4
2.1.1	Дискретные распределения	4
	Примеры	4
2.1.2	Абсолютно непрерывные распределения	4
	Примеры	5
2.1.3	Сингулярные распределения	5
	Примеры	6
3	Вероятностные меры в \mathbb{R}^n	6
3.1	Примеры	7
4	Вероятностные меры в \mathbb{R}^∞	8
5	Случайные величины и векторы	9
5.1	Действия со случайными величинами	9
5.2	Характеристики случайных величин и векторов	10
6	Математическое ожидание	11
6.1	Свойства матожидания	11
6.2	Обобщенная плотность	12
6.3	Примеры	12
7	Независимость	13
7.1	Независимость событий	13
7.2	Независимость случайных величин и случайных векторов	14

1 Введение

1.1 Предисловие

Ну чето рассказали там про принцип устойчивости частот, про то, что ля-ля-ля тополя

1.2 Напоминание с ОВиТМа

Определение 1.1. \mathcal{F} — алгебра над Ω , если

1. $\Omega \in \mathcal{F}$
2. $A, B \in \mathcal{F} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{F}$
3. $A \in \mathcal{F} \Rightarrow \bar{A} \in \mathcal{F}$

Замечание. Элементы Ω называются элементарными событиями.

Замечание. Элементы \mathcal{F} называются событиями.

Определение 1.2. \mathcal{F} — σ -алгебра над Ω , если

1. \mathcal{F} — алгебра
2. $A_1, \dots \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$

Определение 1.3. Функция $P : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ называется вероятностной мерой, если $P(\Omega) = 1$, P — σ -аддитивна.

Замечание. 1. $P(\emptyset) = 0$

2. $A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$ — **монотонность меры**
3. P конечно аддитивна
4. Для P верна формула включений-исключений.
5. $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

Теорема 1.1 (О непрерывности вероятностной меры). Пусть (Ω, \mathcal{F}) таково, что \mathcal{F} — алгебра над Ω , P — мера и $P(\Omega) = 1$. Тогда следующие условия эквивалентны:

1. P — σ -аддитивна на \mathcal{F}
2. P непрерывна в нуле, т.е. $\bigcap A_i = \emptyset \Rightarrow P(A_i) \rightarrow 0$
3. P непрерывна сверху, т.е. $\bigcap A_i = A \Rightarrow P(A_i) \rightarrow P(A)$
4. P непрерывна снизу, т.е. $\bigcup A_i = A \Rightarrow P(A_i) \rightarrow P(A)$

Определение 1.4. Вероятностное пространство — это измеримое пространство (Ω, \mathcal{F}, P) , т.е. Ω — множество, \mathcal{F} — некая σ -алгебра над Ω , P — вероятностная мера на (Ω, \mathcal{F}) .

Определение 1.5. Система \mathcal{M} подмножеств Ω называется π -системой, если \mathcal{M} замкнуто относительно счетного пересечения

Определение 1.6. Система \mathcal{M} подмножеств Ω называется λ -системой, если

1. $\Omega \in \mathcal{M}$
2. $A, B \in \mathcal{M}, A \subset B \Rightarrow B \setminus A \in \mathcal{M}$
3. $A_i \in \mathcal{M} \Rightarrow \bigcup A_i \in \mathcal{M}$

Теорема 1.2 (Первая теорема о λ -системах). Система \mathcal{F} является σ -алгеброй над Ω тогда и только тогда, когда она является λ -системой и π -системой.

Утверждение 1.1. Для любой системы \mathcal{M} подмножеств Ω существует минимальная по включению, содержащаяся в \mathcal{M}

Замечание. $\sigma(\mathcal{M}), \alpha(\mathcal{M}), \pi(\mathcal{M}), \lambda(\mathcal{M})$ — порожденные (минимальные) σ -алгебра, алгебра, π -система, λ -система соответственно.

Теорема 1.3 (Вторая теорема о λ -системах). Если \mathcal{M} — π -система на Ω , то $\sigma(\mathcal{M}) = \lambda(\mathcal{M})$

Доказательство. См. доказательство из курса ОВиТМа □

Пример (Борелевская σ -алгебра). $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ — σ -алгебра, порожденная всеми открытыми множествами (или, что равносильно, всеми полуинтервалами)

Пример (Борелевская σ -алгебра в \mathbb{R}^n). $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ — σ -алгебра, порожденная всеми открытыми множествами (или, что равносильно, всеми кубами, где куб — декартово произведение борелевских множеств).

Пример. $\mathcal{B}(\mathbb{R}^\infty)$ — σ -алгебра, порожденная всеми цилиндрами. Цилиндр — множество $x \in \mathbb{R}^\infty : (x_1, \dots, x_n) \in B, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$

Пример (Борелевская σ -алгебра в общем случае). Пусть (S, ρ) — метрическое пространство, тогда $\mathcal{B}(S)$ — σ -алгебра, порожденная всеми открытыми множествами.

2 Вероятностная мера на прямой

Пусть P — вероятностная мера на $\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})$

Определение 2.1. Функцией распределения называется функция $F(x) = P((-\infty, x]), x \in \mathbb{R}$.

Лемма 2.1 (О свойствах функции распределения).

1. F не убывает
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$
3. F непрерывна справа

Доказательство.

1. $x \leq y \Rightarrow (-\infty, x] \subset (-\infty, y] \Rightarrow F(x) \leq F(y)$

2. $x_n \rightarrow -\infty \Rightarrow (-\infty, x_n] \rightarrow \emptyset \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} F(x_n) = 0 = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$, $x_n \rightarrow +\infty \Rightarrow (-\infty, x_n] \rightarrow \mathbb{R} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} F(x_n) = 1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$
3. Если $x_n \searrow x$, то $(-\infty, x_n] \searrow (-\infty, x]$ и $F(x_n) \rightarrow F(x)$

□

Теорема 2.1 (О взаимно-однозначном соответствии функции распределения и вероятностной меры). Пусть F удовлетворяет условиям 1-3 из предыдущей теоремы. Тогда существует единственная вероятностная мера P на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, т.ч. F — её функция распределения.

2.1 Классификация вероятностных мер

Далее мы будем отождествлять понятия распределения и вероятностной меры.

2.1.1 Дискретные распределения

Определение 2.2. Вероятностная мера P на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ называется дискретной, если $\exists X$ — не более, чем счетное множество на \mathbb{R} , такое, что $P(\mathbb{R} \setminus X) = 0$ и $\forall x \in X P(\{x\}) > 0$.

Примеры

1. Распределение Бернулли: $P \sim \text{Bern}(p)$, если $X = \{0, 1\}$, $P(\{1\}) = p$, $P(\{0\}) = 1 - p$
2. Равномерное распределение: $X = 1, 2, \dots, n$, $P(\{i\}) = \frac{1}{n}$
3. Биномиальное распределение: $P \sim \text{Bin}(n, p)$, если $X = \mathbb{N}$, $P(\{k\}) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$, $P(\{0\})$, моделирует количество успехов среди n испытаний.
4. Пуассоновское распределение: $P \sim \text{Pois}(n, p)$, если $X = \mathbb{N}$, $P(\{k\}) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, $P(\{0\})$, моделирует редкие события
5. Геометрическое распределение: $P \sim \text{Geom}(p)$, если $X = \mathbb{N}$, $P(\{k\}) = p(1-p)^{k-1}$, $P(\{0\})$, моделирует первый момент удачи в бесконечной схеме испытаний Бернулли

2.1.2 Абсолютно непрерывные распределения

Определение 2.3. $F(x)$ называется абсолютно непрерывной, если $\exists p(t) \geq 0 : \forall x \in \mathbb{R} F(x) = \int_{-\infty}^x p(t) dt$. В таком случае мы говорим, что $p(t)$ является плотностью функции F или соответствующего распределения (вероятностной меры).

Замечание. В таком случае $F'(x) = p(x)$ почти всюду по мере Лебега.

Примеры

1. Равномерное распределение на отрезке $[a, b]$ — $U(a, b)$:

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, a \leq x \leq b \\ 0, \text{ иначе} \end{cases}, F(x) = \begin{cases} 0, x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, a \leq x \leq b \\ 1, x > b \end{cases}$$

Моделирует случайную точку из отрезка $[a, b]$

2. Нормальное распределение — $N(a, \sigma^2)$:

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

Моделирует измерение с ошибкой

3. Экспоненциальное распределение — $N(a, \sigma^2)$:

$$p(x) = \lambda e^{-\lambda x} I\{x > 0\}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, x \geq 0 \end{cases}$$

Моделирует время ожидания

4. Гамма-распределение: $\Gamma(\lambda, \alpha)$, $\lambda, \alpha > 0$.

$$p(x) = \frac{x^{\alpha-1} \lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} e^{-\lambda x} I\{x > 0\}$$

Где:

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$$

Нам в дальнейшем потребуются различные свойства Γ -функции: $\Gamma(n) = (n-1)!$, $\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha)$

5. Распределение Коши $K(\sigma)$, $\sigma > 0$

$$p(x) = \frac{\sigma}{\pi(x^2 + \sigma^2)}$$

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{\sigma}$$

Модель

2.1.3 Сингулярные распределения

Определение 2.4. Точка x называется точкой роста функции распределения $F(x)$, если $\forall \varepsilon > 0 : F(x + \varepsilon) - F(x - \varepsilon) > 0$

Определение 2.5. Функция распределения $F(x)$ называется сингулярной, если она непрерывна, и множество точек ее роста имеет $\mu = 0$.

Примеры

1. Канторова лестница — ее точками роста является канторово множество.

Теорема 2.2 (Лебега о разложении). *Если $F(x)$ — функция распределения на прямой, тогда $\exists!$ разложение вида: $F(x) = \alpha_1 F_1(x) + \alpha_2 F_2(x) + \alpha_3 F_3(x)$, где $\alpha_i \geq 0$, $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1$ и F_1 — дискретная, F_2 — абсолютно непрерывная, F_3 — сингулярная.*

3 Вероятностные меры в \mathbb{R}^n

Пусть P — вероятностная мера на $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$.

Определение 3.1. Функцией распределения P называется $F(x_1, \dots, x_n) = P((-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_n])$

Замечание (Обозначения). 1. $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$

$$2. \vec{x} \geq \vec{y} \Leftrightarrow x_i \geq y_i$$

$$3. (-\infty, \vec{x}] = (-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_n]$$

$$4. \vec{x}_n \downarrow \vec{x} \text{ если } \vec{x} = \lim_{n \rightarrow \infty} \vec{x}_n \text{ и } \vec{x}_n \geq \vec{x}_{n+1}.$$

Определение 3.2. Для $i = 1, \dots, n$, $a_i < b_i$ введем:

$$\Delta_{a_i, b_i}^i F(x_1, \dots, x_n) = F(x_1, x_{i-1}, b_i, x_{i+1}, \dots, x_n) - F(x_1, x_{i-1}, a_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$$

Лемма 3.1 (Свойства многомерных функций распределения). 1. Если $\vec{x}_n \downarrow \vec{x}$, то $F(\vec{x}_n) \rightarrow F(\vec{x})$

$$2. \lim_{\substack{x_1 \rightarrow \infty \\ \vdots \\ x_n \rightarrow \infty}} F(x_1, \dots, x_n) = 1$$

$$3. \forall i = 1, \dots, n : \lim_{x_i \rightarrow -\infty} F(x_1, \dots, x_n) = 0.$$

$$4. \text{ Для любых } a_i < b_i, i = 1, \dots, n:$$

$$\Delta_{a_1, b_1}^1 \circ \Delta_{a_2, b_2}^2 \circ \dots \circ \Delta_{a_n, b_n}^n F(x_1, \dots, x_n) \geq 0$$

Доказательство.

1. Если $\vec{x}_n \downarrow \vec{x}$, то $(-\infty, \vec{x}_n] \downarrow (-\infty, \vec{x}] \Rightarrow$ в силу непрерывности вероятностной меры, получаем $F(\vec{x}_n) \rightarrow F(\vec{x})$
2. Если $\vec{x}_n \uparrow (+\infty, \dots, +\infty)$, то $(-\infty, \vec{x}_n] \uparrow \mathbb{R}^n \Rightarrow$ в силу непрерывности вероятностной меры, получаем $F(\vec{x}_n) \rightarrow P(\mathbb{R}^n) = 1$
3. Если $x_i \downarrow -\infty$, то $(-\infty, \vec{x}_n] \downarrow \emptyset \Rightarrow$ в силу непрерывности вероятностной меры, получаем $F(\vec{x}_n) \rightarrow P(\emptyset) = 0$

4. Для $n = 2$:

$$\Delta_{a_1, b_1}^1 \circ \Delta_{a_2, b_2}^2 F(x_1, x_2) = F(b_1, b_2) - F(b_1, a_2) - F(a_1, b_2) + F(a_1, a_2) = P((a_1, b_1] \times (a_2, b_2]) \geq 0$$

В общем случае:

$$\begin{aligned} \Delta_{a_i, b_i}^i P(A_1 \times \dots \times A_{i-1} \times (-\infty, x_i) \times A_{i+1} \times \dots \times A_n) = \\ = P(A_1 \times \dots \times A_{i-1} \times (a_i, b_i] \times A_{i+1} \times \dots \times A_n) \end{aligned}$$

Получаем, что

$$\Delta_{a_1, b_1}^1 \circ \Delta_{a_2, b_2}^2 \circ \dots \circ \Delta_{a_n, b_n}^n F(x_1, \dots, x_n) = P((a_1, b_1] \times \dots \times (a_n, b_n]) \geq 0$$

□

Теорема 3.1 (О взаимно однозначном соответствии). *Если F удовлетворяет свойствам 1-3 из леммы, то $\exists!$ вероятностная мера P на $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$, такая, что F — ее функция распределения*

Доказательство. См. ОВиТМ

□

Замечание. Свойство 3 нельзя заменить на неубывание по каждой из переменных.

Доказательство. Рассмотрим $F(x, y) = \begin{cases} 1, & x + y \geq 0 \\ 0, & x + y < 0 \end{cases}$. Заметим, что F удовлетворяет свойствам 1, 2 и не убывает по обеим переменным. При этом, если мы возьмем:

$$\Delta_{-1, 1}^x \circ \Delta_{-1, 1}^y F(x, y) = F(1, 1) - F(-1, 1) - F(1, -1) + F(-1, -1) = 1 - 2 + 0 < 0$$

Получаем, что F — не двумерная функция распределения.

□

3.1 Примеры

1. Пусть F_1, F_2, \dots, F_n — одномерные функции распределения. Рассмотрим $F(x_1, \dots, x_n) = F_1(x_1) \dots F_n(x_n)$ — многомерная функция распределения. Свойства 1, 2 очевидны, проверим 3:

$$\Delta_{a_1, b_1}^1 \circ \Delta_{a_2, b_2}^2 \circ \dots \circ \Delta_{a_n, b_n}^n F(x_1, \dots, x_n) = \prod_{k=1}^n (F_k(b_k) - F_k(a_k)) \geq 0$$

2. Пусть $p(t_1, \dots, t_n) \geq 0$, т.ч.

$$\int_{\mathbb{R}^n} p(t_1, \dots, t_n) dt_1 dt_2 \dots dt_n = 1$$

Тогда:

$$(*) \quad F(x_1, \dots, x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{x_2} \dots \int_{-\infty}^{x_n} p(t_1, \dots, t_n) dt_1 dt_2 \dots dt_n$$

Свойства 1, 2 очевидны, проверим 3:

$$\Delta_{a_1, b_1}^1 \circ \Delta_{a_2, b_2}^2 \circ \dots \circ \Delta_{a_n, b_n}^n F(x_1, \dots, x_n) = \int_{a_1}^{b_1} \int_{a_2}^{b_2} \dots \int_{a_n}^{b_n} p(t_1, \dots, t_n) dt_1 dt_2 \dots dt_n$$

Определение 3.3. Если имеет место представление (*), то $p(t_1, \dots, t_n)$ называется плотностью функции распределения F .

4 Вероятностные меры в \mathbb{R}^∞

Определение 4.1. Пусть P — вероятностная мера на $(\mathbb{R}^\infty, \mathcal{B}(\mathbb{R}^\infty))$. Рассмотрим для $n \in \mathbb{N}$ вероятностную меру P_n на $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$, т.ч.

$$P_n(B) = P(\text{Cyl}(n, B)), B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$$

Тогда можно заметить, что $P_{n+1}(B \times \mathbb{R}) = P_n(B)$.

Определение 4.2. Свойство выше называется согласованностью для последовательности вероятностных мер $\{P_n\}$

Теорема 4.1 (Колмогорова, о мерах в \mathbb{R}^∞). Пусть $\{P_n, n \in \mathbb{N}\}$ — последовательность согласованных вероятностных мер, P_n — мера на \mathbb{R}^n . Тогда $\exists!$ вероятностная мера P на $(\mathbb{R}^\infty, \mathcal{B}(\mathbb{R}^\infty))$, такая, что $\forall n \in \mathbb{N} : \forall B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$:

$$(*) \quad P_n(B_n) = P(\text{Cyl}(n, B_n))$$

Доказательство. Зададим меру P на цилиндрах по правилу (*). Цилиндры образуют алгебру \mathcal{A} . Проверим корректность задания P . Если $\text{Cyl}(n, B_n) = \text{Cyl}(n+k, B_{n+k})$, то $B_{n+k} = B_n \times \mathbb{R}^k$. Тогда в силу согласованности:

$$P_n(B_n) = P_{n+k}(B_{n+k})$$

Проверим, что P — конечно аддитивна на \mathcal{A} . Если $\tilde{B}_1, \dots, \tilde{B}_N \in \mathcal{A}$ — непересекаются, то будем считать, что $\exists n : \tilde{B}_i = \text{Cyl}(n, B_i), i = 1, \dots, N, B_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. Тогда:

$$P\left(\bigsqcup_{i=1}^N \tilde{B}_i\right) = P\left(\text{Cyl}\left(n, \bigsqcup_{i=1}^N \tilde{B}_i\right)\right) = P_n\left(\bigsqcup_{i=1}^N B_i\right) = \sum_{i=1}^N P_n(B_i) = \sum_{i=1}^N P(\tilde{B}_i)$$

Проверим, что P непрерывна в нуле (на \mathcal{A}). Пусть $\tilde{B}_n \downarrow \emptyset, \tilde{B}_n \in \mathcal{A}$. Без ограничения общности, считаем, что $\tilde{B}_n = \text{Cyl}(n, B_n)$.

От противного. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} P(\tilde{B}_n) = \delta > 0$. Тогда для $\forall n \in \mathbb{N}$ выберем компактные $A_n \subset \mathbb{R}^n$, такие, что $A_n \subset B_n$ и $P(B_n \setminus A_n) \leq \frac{\delta}{2^{n+1}}$. Обозначим $\tilde{A}_n = \text{Cyl}(n, A_n)$. Тогда: $P(\tilde{B}_n \setminus \tilde{A}_n) = P_n(B_n \setminus A_n) \leq \frac{\delta}{2^{n+1}}$. Введем $\tilde{C}_n = \bigcap_{i=1}^n \tilde{A}_i$. Тогда $\tilde{C}_n \downarrow \emptyset, \tilde{C}_n = \text{Cyl}(n, C_n)$, где $C_n = A_n \cap (A_{n-1} \times \mathbb{R}) \cap (A_{n-2} \times \mathbb{R}^2) \cap \dots \cap (A_1 \times \mathbb{R}^{n-1})$ — тоже компакт в \mathbb{R}^n . Далее:

$$P(\tilde{B}_n \setminus \tilde{C}_n) \leq \sum_{i=1}^n P(\tilde{B}_n \setminus \tilde{A}_i) \leq |B_i \subset B_n, i \geq n| \leq \sum_{i=1}^n P(\tilde{B}_i \setminus \tilde{A}_i) \leq \frac{\delta}{2} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(\tilde{C}_n) \geq \frac{\delta}{2} > 0$$

Возьмем в каждом \tilde{C}_n по точке $(x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots) \in \tilde{C}_n$. Тогда $(x_1^{(n)}, \dots, x_n^{(n)}) \in C_n$. Рассмотрим последовательность $x_1^{(n)}$. Эти все точки лежат в C_1 . Выберем подпоследовательность n_{k_i} $x_1^{(n_{k_i})} \rightarrow x_1^0 \in C_1$. Для $k \in \mathbb{N}$ построим последовательности $(x_1^{(n_{k_i})}, x_2^{(n_{k_i})}, \dots, x_k^{(n_{k_i})})$, которая сходится к $x_k^{(0)}, \dots, x_k^{(0)}$ в k . Возьмем диагональ, т.е. положим $m_k = n_{k_k}$. Тогда $\forall s \in \mathbb{N} : (x_1^{(m_k)}, \dots, x_s^{(m_k)}) \rightarrow (x_1^{(0)}, \dots, x_s^{(0)}) = x^{(0)}$. Получаем, что P счетно-аддитивна на \mathcal{A} . В таком случае по теореме о продолжении меры, P единственным образом продолжается до вероятностной меры на $\sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^\infty)$ \square

5 Случайные величины и векторы

Пусть (Ω, \mathcal{F}, P) — вероятностное пространство, (E, \mathcal{E}) — измеримое пространство

Определение 5.1. Отображение $X : \Omega \rightarrow E$ называется случайным элементом, если X — измеримо, т.е. $\forall B \in \mathcal{E} : X^{-1}(B) = \omega : X(\omega) \in B \in \mathcal{F}$

Определение 5.2. Если $(E, \mathcal{E}) = (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, то X называется случайной величиной.

Определение 5.3. Если $(E, \mathcal{E}) = (\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$, то X называется случайным вектором.

Напоминание (Критерий измеримости отображения). Если $\mathcal{M} \subset \mathcal{E}$ и $\sigma(\mathcal{M}) = \mathcal{E}$, то X — случайный элемент $\Leftrightarrow \forall B \in \mathcal{M} X^{-1}(B) \in \mathcal{F}$

Следствие (Эквивалентные определения случайных величин и векторов). 1. $\xi : \Omega \Rightarrow \mathbb{R}$ — случайная величина $\Leftrightarrow \{\xi \leq x\} \in \mathcal{F} \Leftrightarrow \{\xi < x\} \in \mathcal{F}$

2. $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ — случайный вектор $\Leftrightarrow \forall i : \xi_i$ измеримо

Доказательство. 1. Очевидно следует из критерия, т.к. лучи (замкнутые или открытые) порождают $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

2. В одну сторону. возьмем $B_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Т.к. $\underbrace{\mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_{i-1} \times B_i \times \dots \times \mathbb{R} = B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, то $\{\xi_i \in B_i\} = \{\xi \in B\} \in \mathcal{F}$. В другую: $\{\xi \in B_1 \times \dots \times B_n\} = \bigcap_{i=1}^n \{\xi_i \in B_i\}$. Далее, по критерию измеримости, следствие верно (т.к. полуалгебра кубов порождает $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$). \square

5.1 Действия со случайными величинами

1. Если $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$ — борелевская, ξ — случайная, то $f(\xi)$ — случайная.

2. Арифметические операции

3. Пусть ξ_n — последовательность случайных величин, тогда $\sup_n \xi_n, \inf_n \xi_n, \overline{\lim} \xi_n, \underline{\lim} \xi_n$ — тоже случайные величины

5.2 Характеристики случайных величин и векторов

Определение 5.4. Распределением случайной величины ξ на (Ω, \mathcal{F}, P) называется вероятностная мера P_ξ на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, определяемая по правилу $\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) : P_\xi(B) = P(\xi \in B)$

Определение 5.5. Распределением случайного вектора ξ на (Ω, \mathcal{F}, P) называется вероятностная мера P_ξ на $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$, определяемая по правилу $\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) : P_\xi(B) = P(\xi \in B)$

Упражнение. P_ξ действительно является вероятностной мерой.

Определение 5.6. Функция распределения случайной величины ξ — это функция $F_\xi(x) = P_\xi((-\infty, x]) = P(\xi \leq x)$.

Определение 5.7. Функция распределения случайного вектора $\vec{\xi}$ — это функция $F_{\vec{\xi}} = P_{\vec{\xi}}((-\infty, \vec{x}]) = P(\vec{\xi} \leq \vec{x}) = P(\xi_1 \leq x_1, \xi_2 \leq x_2, \dots, \xi_n \leq x_n)$.

Замечание. Обозначение $\{\xi \leq x, \eta \leq y\}$ обозначает $\{\xi \leq x\} \cap \{\eta \leq y\}$.

Замечание. Случайные величины и векторы наследуют классификацию распределений.

Определение 5.8. σ -алгебра, порожденная случайной величиной ξ называется $\mathcal{F}_\xi = \{\{\xi \in B\} : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$.

Определение 5.9. σ -алгебра, порожденная случайным вектором ξ называется $\mathcal{F}_\xi = \{\{\xi \in B\} : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)\}$.

Упражнение. Проверить, что \mathcal{F}_ξ действительно является σ -алгеброй.

Определение 5.10. Пусть ξ — случайный вектор на (Ω, \mathcal{F}, P) . Пусть $\mathcal{C} \subset \mathcal{F}$ — некая σ -алгебра. Тогда ξ является \mathcal{C} -измеримой, если $\mathcal{F}_\xi \subset \mathcal{C}$.

Возникает вопрос: а что, если $\mathcal{C} = \mathcal{F}_\eta$?

Лемма 5.1. Случайная величина ξ является \mathcal{F}_η -измеримой $\Leftrightarrow \exists$ борелевская функция f , такая, что $\xi = f(\eta)$.

Доказательство.

\Leftarrow Пусть $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Тогда $\{\xi \in B\} = \{f(\eta) \in B\} = \{\eta \in \underbrace{f^{-1}(B)}_{\in \mathcal{B}(\mathbb{R})}\} \in \mathcal{F}_\eta$.

\Rightarrow Пусть $\xi = I_A$, $A \in \mathcal{F}_\eta$. Тогда $\exists B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, т.ч. $A = \{\eta \in B\}$. Тогда $\xi = f(\eta)$, $f(x) = I_B$. Следовательно, все простые \mathcal{F}_η -измеримые случайные величины тоже являются борелевскими функциями от η . Если ξ — произвольная случайная величина, то рассмотрим последовательность последовательность величин $\{\xi_n\}$, такую, что $\forall \omega \in \Omega : \xi_n(\omega) \rightarrow \xi(\omega)$, где ξ_m — простые случайные величины и $\forall m \in \mathbb{N} : \xi_m = g_m(\xi)$, где g — борелевская. Далее, $\mathcal{F}_{\xi_m} \subset \mathcal{F}_\xi \subset \mathcal{F}_\eta \Rightarrow \exists$ борелевская функция f_m , т.ч. $\xi_m = f_m(\eta)$.

Введем $B = \{x \in \mathbb{R}^n : \exists \lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x)\}$. Положим $f(x) = \begin{cases} \lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x), & x \in B \\ 0, & x \notin B. \end{cases}$

Заметим, что $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \Rightarrow f$ — тоже борелевская функция. По построению $\forall \omega \in \Omega : \xi(\omega) = \lim_{m \rightarrow \infty} \xi_m(\omega) = \lim_{m \rightarrow \infty} f_m(\eta(\omega)) = f(\eta)$.

□

6 Математическое ожидание

Пусть ξ — случайная величина на (Ω, \mathcal{F}, P)

Определение 6.1. Математическое ожидание случайной величины ξ называется интеграл Лебега:

$$\mathbb{E}\xi = \int_{\Omega} \xi(\omega)P(d\omega) = \int_{\Omega} \xi dP$$

Напоминание. Напомним, как мы строили интеграл Лебега:

1. Для простой функции как сумму
2. Для неотрицательной функции как предел
3. Для функции разных знаков, разбиваем $\xi = \xi^+ - \xi^-$

Далее говорим следующее:

1. Если $\mathbb{E}\xi^{\pm}$ конечно, то $\mathbb{E}\xi = \mathbb{E}\xi^+ - \mathbb{E}\xi^-$.
2. Если одно из $\mathbb{E}\xi^{\pm}$ равно $+\infty$, то $\mathbb{E}\xi = \pm\infty$ (ставим соответствующий знак).
3. Если $\mathbb{E}\xi^+ = \mathbb{E}\xi^- = +\infty$, то говорим, что $\mathbb{E}\xi$ не определено.

6.1 Свойства матожидания

Из свойств интеграла:

1. Линейность: $\mathbb{E}(\alpha\xi + \beta\eta) = \alpha\mathbb{E}\xi + \beta\mathbb{E}\eta$
2. Сохраняет отношение порядка: $\xi \leq \eta \Rightarrow \mathbb{E}\xi \leq \mathbb{E}\eta$.
3. $|\mathbb{E}\xi| \leq \mathbb{E}|\xi|$

Определение 6.2. Событие $A \in \mathcal{F}$ происходит почти наверное, если $P(A) = 1$. Мы будем писать это как " A п.н."

И еще свойства математического ожидания:

4. Если $\xi \geq 0$, $\mathbb{E}\xi = 0$, то $\xi = 0$ п.н.
5. Если $\xi = \eta$ п.н., то $\mathbb{E}\xi = \mathbb{E}\eta$.
6. Если $\forall A \in \mathcal{F} : \mathbb{E}(\xi \cdot I_A) \leq \mathbb{E}(\eta \cdot I_A) \Rightarrow \xi \leq \eta$ п.н.

Теорема 6.1 (Замена переменных в интеграле Лебега). Пусть ξ — случайный вектор из \mathbb{R}^n на (Ω, \mathcal{F}, P) . Пусть $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ — борелевская функция. Тогда $\mathbb{E}f(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)P_{\xi}(dx)$.

Доказательство. Пусть сначала $f(x) = I_B(x)$, $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. Тогда

$$\mathbb{E}f(\xi) = E \cdot I\{\xi \in B\} = P(\xi \in B) = P_{\xi}(B) = \int_B P_{\xi}(dx) = \int_{\mathbb{R}^n} I_B(x)P_{\xi}(dx) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)P_{\xi}(dx)$$

Закключаем, что теорема верна для простых функции в силу линейности матожидания и интеграла Лебега. Далее осуществляем приближение простыми функциями в общем случае. \square

Замечание. Матожидание функций от случайной величины или случайного вектора зависит только от распределения.

Определение 6.3. Случайные величины (векторы) ξ, η называются одинаково распределенными, если их распределения равны, т.е. $P_\xi = P_\eta$. В таком случае пишут $\xi \stackrel{d}{=} \eta$.

Следствие. Если $\xi \stackrel{d}{=} \eta$, то $\forall f : \mathbb{E}f(\xi) = \mathbb{E}f(\eta)$

Следствие. Если ξ — случайная величина, то $\mathbb{E}\xi = \int_{\mathbb{R}} x P_\xi(dx)$.

Доказательство. Подставляем $f(x) = x$ □

6.2 Обобщенная плотность

Но как посчитать последний интеграл? Здесь нам поможет обобщенная плотность. Пусть P — вероятностная мера на (Ω, \mathcal{F}) , μ — σ -конечная мера на (Ω, \mathcal{F}) .

Определение 6.4. Мера P имеет обобщенную плотность по мере μ по мере $p(x)$, если

$$\forall B \in \mathcal{F} : P(B) = \int_B p(x) \mu(dx)$$

Смысл данного определения состоит в том, что если P — абсолютно непрерывна относительно μ , то $p = \frac{dP}{d\mu}$ — производная Радона-Никодима.

6.3 Примеры

1. μ — мера Лебега на $\mathbb{R} \Rightarrow$ для абсолютно-непрерывного распределения обобщенная плотность совпадает с обычной плотностью
2. μ — считающая мера на \mathbb{Z} (дискретное распределение на \mathbb{Z}). Тогда обобщенная плотность вычисляется по формуле $p(x) = P(\{x\})$

Теорема 6.2 (О вычислении через обобщенную плотность). Пусть P — вероятностная мера на $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$, имеющая плотность $p(x)$ по мере μ . Тогда \forall борелевской функции $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ выполнено:

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) P(dx) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) p(x) dx$$

Доказательство. Пусть $f(x) = I_B(x)$, $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. Тогда:

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) P(dx) = \int_B P(dx) = P(B) = \int_B p(x) \mu(dx) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) p(x) \mu(dx)$$

Т.к. обе части требуемого линейны по f , получаем, что равенство верно для простых функций. Для произвольной f осуществляем приближение простыми по стандартной схеме. □

Следствие. Пусть ξ — абсолютно непрерывный случайный вектор. с плотностью $p(x)$. Тогда $\forall f$ — борелевской:

$$\mathbb{E}f(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) p(x) dx$$

Следствие. Пусть ξ — дискретная случайная величина, сосредоточенная на некотором множестве \mathcal{X} . Тогда $\forall f$ — борелевской:

$$\mathbb{E}f(\xi) = \sum_{x \in \mathcal{X}} (f(x)P(\xi = x))$$

Доказательство.

$$\mathbb{E}f(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)P_{\xi}(dx) = \sum_{x \in \mathcal{X}} f(x) \underbrace{P(\xi = x)}_{\text{обобщ. плотность считающая}} \underbrace{\mu(\{x\})}_{\text{считающая}} = \sum_{x \in \mathcal{X}} f(x)P(\xi = x)$$

□

Пример. Пусть ξ имеет следующую функцию распределения:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-x}, & x \in [0, 1) \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Требуется найти $\mathbb{E}\xi$

Решение.

$$\mathbb{E}\xi = 1 \cdot P\left(\xi = \frac{1}{e}\right) + \int_0^1 xF'(x)dx = \frac{1}{e} + \int_0^1 xe^{-x}dx = \frac{1}{e} + (-xe^{-x} - e^{-x})|_0^1 = 1 - \frac{2}{e} + \frac{1}{e} = 1 - \frac{1}{e}$$

7 Независимость

7.1 Независимость событий

Пусть (Ω, \mathcal{F}, P) — вероятностное пространство.

Определение 7.1. События A, B независимы в (Ω, \mathcal{F}, P) , если $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

Определение 7.2. События A_1, \dots, A_n называются попарно независимыми, если $\forall i \neq j : A_i, A_j$ независимы.

Определение 7.3. События A_1, \dots, A_n называются независимыми в совокупности, если $\forall k \leq n \forall i_1 < \dots < i_k : P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \dots P(A_{i_k})$.

Далее, под независимостью будем подразумевать независимость в совокупности.

Определение 7.4. Системы событий $\mathcal{M}_1, \dots, \mathcal{M}_n$ независимы в совокупности, если $\forall A_i \in \mathcal{M}_i$ события $\{A_i\}$ независимы в совокупности.

Теорема 7.1 (критерий независимости σ -алгебр). Пусть $\mathcal{M}_1, \dots, \mathcal{M}_n$ — π -системы событий на (Ω, \mathcal{F}, P) . Тогда $\mathcal{M}_1, \dots, \mathcal{M}_n$ независимы $\Leftrightarrow \sigma(\mathcal{M}_1), \dots, \sigma(\mathcal{M}_n)$

Доказательство.

\Leftarrow очевидно из определения

\Rightarrow Докажем для $n = 2$ (для других аналогично). Рассмотрим

$$\mathcal{L}_1 = \{A \in \mathcal{F} : A \text{ независимо с } \mathcal{M}_2\}$$

По условию, $\mathcal{M}_1 \subset \mathcal{L}_1$. Проверим, что \mathcal{L}_1 — λ -система.

- (а) $\Omega \in \mathcal{L}_1$, т.к. оно независимо со всеми событиями.
 (б) Пусть $A, B \in \mathcal{L}_1$, $A \subset B$ докажем, что $B \setminus A \in \mathcal{L}_1$. Пусть $C \in \mathcal{M}_2$. Тогда:

$$P((B \setminus A) \cap C) = P((B \cap C) \setminus (A \cap C)) = P(B \cap C) - P(A \cap C) = (*)$$

Из того, что $B, A \in \mathcal{L}_1$ получаем, что они независимы с C . Тогда:

$$(*) = P(B)P(C) - P(A)P(C) = (P(B) - P(A))P(C) = P(B \setminus A)P(C)$$

- (с) Пусть $\{A_n, n \in \mathbb{N}\}$ таковы, что $A_n \uparrow A$ и $\forall n : A_n \in \mathcal{L}_1$ докажем, что $A \in \mathcal{L}_1$. Пусть $C \in \mathcal{M}_2$. Тогда $A_n \cap C \uparrow A \cap C$. В силу непрерывности вероятностной меры:

$$P(A \cap C) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n \cap C) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)P(C) = P(C) \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(C)P(A)$$

Получили, что A независимо с $\mathcal{M}_2 \Rightarrow A \in \mathcal{L}_1$.

То есть \mathcal{L}_1 — это λ -система, $\mathcal{M}_1 \subset \mathcal{L}_1$. По второй теореме о π - λ -системах:

$$\sigma(\mathcal{M}_1) \subset \mathcal{L}_1 \Rightarrow \sigma(\mathcal{M}_1) \text{ независимо с } \mathcal{M}_2$$

Теперь рассмотрим $\mathcal{L}_2 = \{A \in \mathcal{F} : A \text{ независимо с } \sigma(\mathcal{M}_1)\}$. По доказанному $\mathcal{M}_2 \subset \mathcal{L}_2$. Далее точно так же проверяем, что \mathcal{L}_2 — λ -система.

□

Определение 7.5. Пусть $\{\mathcal{M}_\alpha, \alpha \in \mathcal{A}\}$ — системы событий на (Ω, \mathcal{F}, P) . Этот набор называется независимым, если любой конечный поднабор $\mathcal{M}_{\alpha_1}, \dots, \mathcal{M}_{\alpha_k}, \alpha_i \neq \alpha_j$ независим.

7.2 Независимость случайных величин и случайных векторов

Определение 7.6. Случайные векторы ξ_1, \dots, ξ_n называются независимыми в совокупности, если порожденные ими σ -алгебры являются независимыми.

Утверждение 7.1. Случайные векторы $\xi_1, \dots, \xi_n, \xi_i \in \mathbb{R}^{k_i}$ независимы в совокупности $\Leftrightarrow \forall B_1, \dots, B_n, B_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^{k_i})$ выполнено

$$P(\xi_1 \in B_1, \dots, \xi_n \in B_n) = \prod_{i=1}^n P(\xi_i \in B_i)$$

Доказательство. \Rightarrow очевидно

\Leftarrow Надо проверить, что $\forall B_1, \dots, B_n$ события $\{\xi_i \in B_i\}$ независимы в совокупности. Если фиксирован набор i_1, \dots, i_k , положим $B_j = \mathbb{R}^{k_j}$ для $j \neq i_s$. Тогда получаем:

$$P(\xi_1 \in B_1, \dots, \xi_n \in B_n) = \prod_{i=1}^n P(\xi_i \in B_i) = \prod_{s=1}^k P(\xi_{i_s} \in B_{i_s})$$

□

Определение 7.7. Пусть ξ_1, \dots, ξ_n — случайные величины. Совместным распределением ξ_1, \dots, ξ_n называется распределение вектора (ξ_1, \dots, ξ_n) . Соответствующие функции распределения и плотности тоже называются совместными

Утверждение 7.2. Если случайные величины ξ_1, \dots, ξ_n независимы, то их совместное распределение есть прямое произведение распределений ξ_1, \dots, ξ_n , т.е:

$$P_{(\xi_1, \dots, \xi_n)} = P_{\xi_1} \times \dots \times P_{\xi_n}$$

Доказательство. Для $\forall B_1, \dots, B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ имеем:

$$P_{(\xi_1, \dots, \xi_n)}(B_1 \times \dots \times B_n) = P((\xi_1, \dots, \xi_n) \in B_1 \times \dots \times B_n) =$$

$$P(\xi_1 \in B_1, \dots, \xi_n \in B_n) = P(\xi_1 \in B_1) \dots P(\xi_n \in B_n) = P_{\xi_1} \times \dots \times P_{\xi_n}$$

□

Теорема 7.2 (Критерий независимости для функции распределения). Пусть ξ_1, \dots, ξ_n — случайные величины на (Ω, \mathcal{F}, P) . Они независимы в совокупности $\Leftrightarrow \forall x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ выполнено:

$$P(\xi_1 \leq x_1, \dots, \xi_n \leq x_n) = \prod_{i=1}^n \underbrace{P(\xi_i \leq x_i)}_{F_{\xi_i}(x_i)}$$

Доказательство. \Rightarrow следует из определения

\Leftarrow Рассмотрим

$$G(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n F_{\xi_i}(x_i) = P(\xi_1 \leq x_1, \dots, \xi_n \leq x_n)$$

Это многомерная функция распределения. Заметим, что ей соответствует

□