Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

IV СЕМЕСТР

Лектор: *Редкозубов Вадим Витальевич*

h\nu

Автор: *Киселев Николай*
Репозиторий на Github

весна 2025

Содержание

1 Пространство Лебега **2**

1.1 Пространства L_p 2

1.2 Свертка и аппроксимация функции 6

2 Тригонометриеский ряд Фурье **8**

2.1 Поточечная сходимость рядов Фурье 10

2.2 Почленное дифференцирование и интегрирование рядов Фурье 14

2.3 Суммирование рядов Фурье методом средних арифметических 16

1 Пространство Лебега

1.1 Пространства L_p

Определение 1.1. Пусть $E \subset \mathbb{R}^m$. Будем говорить, что $f : E \to \mathbb{C}$ измерима (интегрируема) по Лебегу, если $\operatorname{Re} f, \operatorname{Im} f$ измеримы (интегрируемы) по Лебегу.

Определение 1.2. В случае интегрируемости положим $\int_E f = \int_E \operatorname{Re} f + i \int_E \operatorname{Im} f$. Полученный интеграл линеен и аддитивен по множествам

Замечание.

$$\left\| \int_E f \right\| \leqslant \int_E |f|$$

Доказательство.

$$\int_E f = \left\| \int_E f \right\| e^{i\theta} \Rightarrow \int_E f e^{-i\theta} = \left\| \int_E f \right\| = \int_E \operatorname{Re}(e^{-i\theta} f) \leqslant \int_E |e^{i\theta} f| = \int_E |f|$$

□

Определение 1.3. Пусть $1 \leqslant p \leqslant< \infty$ и E измеримо. Определим:

$$L_p(E) = \{f : E \to \mathbb{C} | \int_E |f|^p < \infty\}$$

В таком случае положим $\|f\|_p = \left(\int_E |f|^p\right)^{\frac{1}{p}}$

Пусть $f, g \in L_p(E)$. Если $\lambda \in \mathbb{C}$, то $\lambda f \in L_p(E)$ и ввиду $|f+g|^p \leqslant (2\max\{|f|, |g|\})^p \leqslant 2^p(|f|^p + |g|^p)$ выполнено $f + g \in L_p$. Получили, что L_p является линейным пространством относительно $+, \lambda\cdot$.

Лемма 1.1. *Пусть $a, b \geqslant 0$. Если $1 < p < \infty, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, то $ab \leqslant \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$, причем равенство достигается тогда и только тогда, когда $a^p = b^q$*

Доказательство. Можно считать, что $ab > 0$. Ввиду выпуклости экспоненты, имеем:

$$e^{\frac{x}{p} + \frac{y}{q}} \leqslant \frac{1}{p} e^x + \frac{1}{q} e^y$$

Положим $x = p \ln a, y = q \ln b$ и получаем желаемое. □

Теорема 1.1 (Гельдер)**.** *Пусть $1 < p < \infty, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Если $f \in L_p(E), g \in L_q(E)$, то $fg \in L_1(E)$ и $\|fg\|_1 \leqslant \|f\|_p \|g\|_q$*

Доказательство. Если $\|f\|_p = 0 \Rightarrow f = 0$ п.в. $\Rightarrow fg = 0$ п.в. $\Rightarrow$ утверждение доказано. Аналогично и для случая $\|g\|_q = 0$. В противном случае, получаем:

$$\|f\|_p \|g\|_q > 0$$

По предыдущей лемме, имеем:

$$\frac{|f(x)|}{\|f\|_p} \frac{|g(x)|}{\|g\|_q} \leqslant \frac{1}{p} \left(\frac{|f(x)|}{\|f\|_p}\right)^p + \frac{1}{q} \left(\frac{|g(x)|}{\|g\|_q}\right)^q$$

Проинтегрировав, получим:

$$\frac{1}{\|f\|_p\|g\|_q}\int_E |fg| \leqslant \frac{1}{p}\left(\int_E \frac{|f|^p}{\|f\|_p^p}\right) + \frac{1}{q}\left(\int_E \frac{|g|^q}{\|g\|_q^q}\right) = 1$$

□

Замечание. В неравенстве гельдера равенство имеет место тогда и только тогда, когда $|f|^p = c|g|^q$ п.в. на E для некоторого $c > 0$.

Теорема 1.2 (Минковский)**.** *Пусть* $1 \leqslant p < \infty$. *Если* $f, g \in L_p(E)$, *то* $f + g \in L_p(E)$ *и* $\|f+g\|_p \leqslant \|f\|_p + \|g\|_p$.

Доказательство. При $p = 1$ применим $|f+g| \leqslant |f| + |g|$. Далее при $p \geqslant 1$: Применим неравенство Гельдера для $p, q = \frac{p}{p-1} \Rightarrow \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

$$\|f+g\|_p^p = \int_E |f+g|^p \leqslant \int_E |f||f+g|^{p-1} + \int_E |g||f+g|^{p-1} \leqslant$$

$$\leqslant \left(\int_E |f|^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_E |f+g|^p\right)^{\frac{1}{q}} + \left(\int_E |g|^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_E |f+g|^p\right)^{\frac{1}{q}} =$$

$$= \|f+g\|_p^{p-1}(\|f\|_p + \|g\|_p)$$

□

Замечание. Равенство в теореме Минковского выполняется тогда и только тогда, когда $f = cg$ п.в. для некоторой $c > 0$

Определение 1.4. На L_p введем отношение $\sim$. Будем говорить, что $f \sim g \Leftrightarrow f = g$ п.в. на E.

Замечание. $\sim$ — отношение эквивалентности на L_p, согласованное с операциями сложения и умножения на скаляр. Факторпространство $L_p(E)/_\sim$ будем также обозначать $L_p(E)$

Следствие. Пространство L_p относительно нормы $\|\cdot\|_p$ является нормированным линейным пространством

Доказательство.

1. $\|f\|_p \geqslant 0, \|f\|_p = 0 \Leftrightarrow f \sim 0$
2. $\|\lambda f\|_p = \lambda\|f\|_p$
3. $\|f+g\|_p \leqslant \|f\|_p + \|g\|_p$

□

Задача. *Если* $\mu(E) < \infty, 1 \leqslant p < q < \infty$, *то* $L_q(E) \subsetneq L_p(E)$

Напоминание. Полное метрическое пространство — такое, что любая фундаментальная последовательность сходится

Теорема 1.3 (Рисса)**.** *Пространство* L_p *банахово (т.е. является полным относительно метрики, порожденной p-нормой).*

Доказательство. Будет позднее □

Напоминание. Напомним, что $\operatorname{supp}(f) = \overline{\{x : f(x) \neq 0\}}$. Будем называть функции с компактным носителем финитными.

Лемма 1.2. *Пусть $f \in L_p, \varepsilon > 0$. Тогда $\exists$ простая финитная функция φ такая, что $\|f - \varphi\|_p < \varepsilon$.*

Доказательство. Можно считать, что f вещественнозначная (иначе приближаем $\operatorname{Re} f, \operatorname{Im} f$) отдельно. Т.к. $|f - I_{B_k(0)}|^p \leqslant |f|^p$. Тогда по Теореме Лебега о мажорируемой сходимости, $\|f - fI_{B_k(0)}\|_p \to 0, k \to \infty$. Заменяя функцию f на $fI_{B_k(0)}$ для достаточно большого k, заключаем, что она финитная. Пусть сначала $f \geqslant 0$. По теореме о приближении, найдется последовательность $\{\varphi_k\}$ — простых функций, т.ч. $0 \leqslant \varphi_1 \leqslant \ldots, \varphi_k \to f$. Т.к. $|f - \varphi_k|^p \leqslant |f|^p$. По теореме Лебега о мажорируемой сходимости $f - \varphi_k \to 0, k \to \infty$, причем все φ_k финитны, т.к. $0 \leqslant \varphi_k \leqslant f$ на E. Пусть f теперь произвольного знака $\Rightarrow f = f^+ - f^-$. Тогда по доказанному найдутся простые финитные функции φ^+, φ^-, такие, что $\|f^+ - \varphi^+\|_p < \frac{\varepsilon}{2}, \|f^- - \varphi^-\|_p < \frac{\varepsilon}{2}$. Положим $\varphi = \varphi^+ - \varphi^-$. Тогда φ — простая финитная функция и по неравенству треугольника:

$$\|f - \varphi\|_p \leqslant \|f^+ - \varphi^+\| + \|f^- - \varphi^-\| < \varepsilon$$

□

Теорема 1.4. *Пусть $f \in L_p, \varepsilon > 0$. Тогда $\exists g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^m)$, т.ч. $\|f - g\|_p < \varepsilon$*

Доказательство. По предыдущей лемме, любую функцию можно приблизить финитной простой функцией. Всякая простая функция есть линейная комбинация индикаторов. Из этого заключаем, что достаточно доказать теорему для случая $f = I_A$, где A — ограниченное измеримое множество. По свойству регулярности меры Лебега, $\exists G, H$ — открытые, такие, что $G \supset A, H \supset A^c$ и $\mu(G \backslash A) < \frac{\varepsilon}{2}, \mu(H \backslash A^c) < \frac{\varepsilon}{2}$. Положим $k = H^c$ — замкнутое и ограниченное (т.к. лежит в A), т.е. компакт, лежащий в A. $\mu(G \backslash A) \leqslant \mu(G \backslash A) + \mu(H \backslash A^c) < \varepsilon$. По теореме о гладком разбиении единицы, $\exists g \in C^\infty(\mathbb{R}^m)$ с носителем в G, такая, что $0 \leqslant g \leqslant 1$ и $g|_K = 1$. Поэтому $\|I_A - g|_E\|_p^p = \int_E |I_A - g|^p \leqslant \int_{(G \cap E) \backslash K} |I_A - g|^p \leqslant \mu(G \setminus K) < \varepsilon$ □

Теорема 1.5 (Кантора)**.** *Пусть $f : U \to \mathbb{C}$, где $U \subset \mathbb{R}^n$ — открыто. Тогда, если K — компакт и f непрерывна на нем, то f равномерно непрерывна на нем, т.е.*

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in K \forall h \in \mathbb{R}^n (h < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x - h)| < \delta)$$

Доказательство. От противного. Тогда $\exists \{x_k\} \subset K \exists \{h_k\} \subset \mathbb{R}^m |f(x_k) - f(x_k - h_k)| \geqslant \varepsilon_0, h_k \to 0$. Т.к. K — компакт, то $\exists x_{n_k} \to x_0 \in K$ и $x_{n_k} + h_{n_k} \to x_0$. Тогда по непрерывности, $f(x_{n_k}) \to f(x_0), f(x_{n_k} - h_{n_k}) \to f(x_0) \Rightarrow |f(x_{n_k}) - f(x_{n_k} - h_{n_k})| \to 0$ □

Определение 1.5. Пусть $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{C}, h \in \mathbb{R}^m$. Функция $f_h : \mathbb{R}^m \to \mathbb{C}, f_h(x) = f(x - h)$ называется сдвигом функции f на h.

Замечание. Функции f, f_h одновременно лежат в $L_p(\mathbb{R}^m)$ и $\|f\|_p = \|f_h\|_p$

Теорема 1.6 (Непрерывность сдвига)**.** *Если $f \in L_p(\mathbb{R}^m)$, то $\|f_h - f\|_p \to 0$ при $h \to 0$.*

Доказательство. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. $\exists g \in C_c(\mathbb{R}^m)$ (можно считать, что $g = 0$ вне $B_r(0)$), такая, что $\|f - g\|_p < \frac{\varepsilon}{3}$. По неравенству треугольника:

$$\|f_h - f\|_p \leqslant \|f_h - g_h\|_p + \|g_h - g\|_p + \|g - f\|_p < \frac{2}{3}\varepsilon + \|g_h - g\|$$

Т.к. g непрерывна на $\overline{B_r(0)}$, то $\exists \delta \in (0, 1] \forall h \in \mathbb{R}^m (|h| < \delta \Rightarrow |g(x) - g(x-h)| < \frac{\varepsilon}{3M})$, где $M^p = \mu()B_{r+1}(0)$. Поэтому:

$$\|g_h - g\|_p^p = \int |g(x-h) - g(x)|^p dx \leqslant \left(\frac{\varepsilon}{3M}\right)^p \mu(B_{r+1}) = \left(\frac{\varepsilon}{3}\right)^p$$

Следовательно, при $|h| < \delta$, выполнено $\|f_h - f\|_p < \varepsilon$ □

Следствие (Непрерывность сдвига для периодических функций)**.** Пусть f — 2π-периодичная измеримая на $\mathbb{R}$ функция. Если $\int_{[-\pi,\pi]} |f(x)|^p dx < \infty$, то

$$\int_{[-\pi,\pi]} |f(x-h) - f(x)|^p dx \to 0, h \to 0$$

Доказательство. Пусть $g = \begin{cases} f, x \in (-2\pi, 2\pi) \\ 0, \text{иначе} \end{cases}$. Тогда $g \in L_p(\mathbb{R})$. Также, при $x \in (-\pi, \pi)$ и $|h| < \pi$ имеем: $|g(x-h) - g(x)| = |f(x-h) - f(x)|$, а значит,

$$\int_{[-\pi,\pi]} |f(x-h) - f(x)|^p dx = \int_{[-\pi,\pi]} |g(x-h) - g(x)|^p dx \leqslant \|g_h - g\|_p \to 0, h \to 0$$

□

Теорема 1.7 (Римана об осцилляции)**.** *Пусть I — промежуток в $\mathbb{R}$, $f \in L_1(I)$. Тогда*

$$\int_I f(x) e^{i\lambda x} dx \to 0, \lambda \to \pm\infty$$

В частности,

$$\int_I f(x) \cos \lambda x dx \to 0, \int_I f(x) \sin \lambda x dx \to 0, \lambda \to \pm\infty$$

Доказательство. Рассмотрим случай $I = \mathbb{R}$. Сделаем в интеграле замену $x = t - \frac{\pi}{\lambda}$, тогда:

$$\int_I f(x) e^{i\lambda x} dx = \int_I f\left(t - \frac{\pi}{\lambda}\right) e^{i\lambda\left(t - \frac{\pi}{\lambda}\right)} dx = -\int_I f\left(t - \frac{\pi}{\lambda}\right) e^{i\lambda t} dx$$

Следовательно,

$$\int_I f(x) e^{i\lambda x} dx = \frac{1}{2}\left(\int_I f(x) e^{i\lambda x} dx - \int_I f\left(x - \frac{\pi}{\lambda}\right) e^{i\lambda x} dx\right) = \frac{1}{2}\left(\int_I \left(f(x) - f\left(x - \frac{\pi}{\lambda}\right)\right) e^{i\lambda x} dx\right)$$

Следовательно,

$$\left|\int_I f(x) e^{i\lambda x} dx\right| \leqslant \frac{1}{2}\left(\int_I \left|f(x) - f\left(x - \frac{\pi}{\lambda}\right)\right| dx\right) = \|f_h - f\|_1 \to 0$$

□

1.2 Свертка и аппроксимация функции

Определение 1.6. Пусть f, g — измеримы в $\mathbb{R}^m$, функция $f * g$ определяемая по формуле

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^m} f(x-t)g(t)dt$$

называется сверткой функций f, g.

Замечание. Покажем измеримость функции $f(x-t)g(t)$ в $\mathbb{R}^{2m}$. Т.к. $g(t)$ измерима в $\mathbb{R}^{2m}$, достаточно показать измеримость $f(x-t)$. Положим $E_a = \{x \in \mathbb{R}^m : f(x) < a\}$ и определим оператор $L : \mathbb{R}^{2m} \to \mathbb{R}^{2m}, L(x,t) = (x-t, t)$. Тогда $\{(x-t) : f(x-t) < a\} = \{(x,t) : x - t \in E_a\} = L^{-1}(E_a \times \mathbb{R}^m)$ — измеримо как образ измеримого при диффеоморфизме L^{-1}

Лемма 1.3. *Пусть $f, g \in L_1(\mathbb{R}^m)$, тогда $f * g$ определена почти всюду. Более того, $f * g \in L_1(\mathbb{R}^m)$ и $\|f * g\|_1 \leqslant \|f\|_1 \|g\|_1$*

Доказательство. Определим $H(x) = \int_{\mathbb{R}^m} |f(x-t)||g(t)|dt$. По теореме Тонелли:

$$\int_{\mathbb{R}^m} H(x)dx = \int_{\mathbb{R}^m} \left(\int_{\mathbb{R}^m} |f(x-t)|dx \right) |g(t)|dt = \int_{\mathbb{R}^m} \left(\int_{\mathbb{R}^m} |f(y)|dy \right) |g(t)|dt = \|f\|_1 \|g\|_1$$

Получаем:

$$\left| \int_{\mathbb{R}^m} f(x-t)g(t) \right| \leqslant \int_{\mathbb{R}^m} H(x)dx = \|f\|_1 \|g\|_1$$

Тогда $|f(x-t)g(t)|$ конечна почти всюду $\Rightarrow (f * g)(x)$ определена почти всюду. □

Теорема 1.8. *1. Если $f \in L_p(\mathbb{R}^m), g \in L_q(\mathbb{R}^m), \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, то $(f * g)$ существует, равномерно непрерывна на $\mathbb{R}^m$ и $|(f * g)(x)| \leqslant \|f\|_p \|g\|_q$*

2. Если $f \in L_p(\mathbb{R}^m), g$ измерима и ограничена в $\mathbb{R}^m$, то $(f * g)$ существует, равномерно непрерывна на $\mathbb{R}^m$ и $|(f * g)(x)| \leqslant \|f\|_p \|g\|_\infty$, где $\|g\|_\infty = \sup_{\mathbb{R}^m} |g|$

Доказательство.

1.

$$\int_{\mathbb{R}^m} |f(x-t)g(t)|dt \leqslant \left(\int_{\mathbb{R}^m} |f(x-t)|^p dt \right) \frac{1}{p} \left(\int_{\mathbb{R}^m} |g(t)|^q dt \right) \frac{1}{q} = \|f\|_p \|g\|_q < \infty$$

Тогда $f * g$ определена всюду на $\mathbb{R}^m$, и справедлива оценка из условия. Докажем равномерную непрерывность:

$$|(f * g)(x-h) - (f * g)(x)| = \left| \int_{\mathbb{R}^m} (f(x-h-t) - f(x-t))g(t)dt \right| =$$

$$= |((f_h - f) * g)(x)| \leqslant \|f_h - f\|_p \|g\|_q \to 0, h \to 0$$

Последнее стремление равномерное, т.е. не зависит от x, поэтому утверждение доказано

2.
$$\int_{\mathbb{R}^m} |f(x-t)g(t)|dt \leqslant \|g\|_\infty \|f\|_1 < \infty$$

Равномерное стремление доказывается аналогично пункту 1.

□

Утверждение 1.1. *Пусть $f, g, h \in L_1(\mathbb{R}^m)$, тогда:*

1. $(f * g) = (g * f)$
2. $(f * g) * h = f * (g * h)$

Доказательство.

1.
$$(f * g) = \int_{\mathbb{R}^m} f(x-t)g(t)dt = \left\{ \begin{array}{c} x - t = y \\ |J| = 1 \end{array} \right\} = \int_{\mathbb{R}^m} f(y)g(x-y)dy = (g * f)$$

2. Следует из теоремы Фубини

□

Определение 1.7. Последовательность $\{K_n\}_{n=1}^\infty$ интегрируемых на $\mathbb{R}^m$ функций называется аппроксимацией единицей (δ-образным семейством), если

1. $K_n \geqslant 0 \forall n$
2. $\int_{\mathbb{R}^m} K_n dx = 1$
3. $\lim_{n\to\infty} \int_{|x|\geqslant\delta} K_n(x)dx \to 0$ для всех $\delta > 0$.

Пример. Рассмотрим $\varphi \in L_1(\mathbb{R}), \varphi \geqslant 0$ с $\int_{\mathbb{R}^m} \varphi(x)dx = 1$, положим $K_n(x) = n^m \varphi(nx)$. Тогда:

$$\int_{|x|\geqslant\delta} = \int_{|x|\geqslant\delta} n^m \varphi(nx)dx = \left\{ \begin{array}{c} y = nx \\ |J| = n^m \end{array} \right\} = \int_{|y|\geqslant n\delta} \varphi dy = \int_{\mathbb{R}^m} \varphi I_{\{|y|\geqslant n\delta\}} dy \to 0$$

Теорема 1.9. *Пусть $\{K_n\}_{n=1}^\infty$ — аппроксимация единицы и f — ограниченная измеримая функция на $\mathbb{R}^n$. Тогда справедливы утверждения:*

1. *Если f непрерывна в $x \in \mathbb{R}^m$, то $K_n * f(x) \to f(x)$.*
2. *Если f непрерывна в каждой точке компакта $K \subset \mathbb{R}^m$, то $K_n * f \rightrightarrows f$ на K*

Доказательство. Из пункта 2 определения K_n следует, что $f(x) = \int_{\mathbb{R}^m} f(x)K_n(t)dt$, поэтому $K_n * f(x) - f(x) = \int_{\mathbb{R}^m} (f(x-t) - f(x))K_n dt$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Пользуясь равномерной непрерывностью f на K, найдем такое $\delta > 0$, что $\forall x \in K \forall t \in \mathbb{R}^m \left(|t| < \delta \Rightarrow |f(x-t) - f(x)| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}\right)$. Разобьем последний интеграл следующим образом:

$$K_n * f(x) - f(x) = \left(\int_{|t|<\delta} + \int_{|t|>\delta} \right) (f(x-t) - f(x))K_n(t)dt = I_1 + I_2$$

Имеем:

$$|I_1| \leqslant \int_{|t|<\delta} |f(x-t) - f(x)||K_n(t)|dt \leqslant \frac{\varepsilon}{2} \int_{\mathbb{R}^m} K_n(t)dt = \frac{\varepsilon}{2}$$

$$|I_2| \leqslant \int_{|t|\geqslant\delta} (f(x-t) + |f(x)|)K_n(t)dt \leqslant 2C \int_{|t|\geqslant\delta} K_n(t)dt$$

Из пункт 3 опрелеления K_n, найдем $N = N(\delta)$ такое, что $\forall n \geqslant N \left(2C \int_{|t|\geqslant\delta} K_n(t)dt \leqslant< \frac{\varepsilon}{2}\right)$, тогда при таких n выполнено $|K_n * f(x) - f(x)| < \varepsilon$, т.е. $K_n * f \rightrightarrows f$ на K.

Пункт 1 следует из пункта 2, где в качестве компакта рассматривается точка. □

Задача. *Если $f \in L_p(\mathbb{R}^m)$, то $K_n * f(x) \to f$ в L_p.*

В периодическом случае свертка определяется аналогично.

Определение 1.8. Пусть f, g — 2π-периодичны и измеримы на $\mathbb{R}$. Тогда:

$$f * g = \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t)g(t)dt$$

Замечание. Все утверждения для свертки верны и в периодическом случае, если заменить $\mathbb{R}$ на $[-\pi, \pi]$ и воспользоваться следующим утверждением:

Утверждение 1.2. *Если f интегрируема на $[-\pi, \pi]$, то интеграл $\int_a^{a+2\pi} f(t)dt$ не зависит от a.*

Доказательство. Пусть $b \in \mathbb{R}$. Тогда $\forall a \in \mathbb{R} \exists k \in \mathbb{Z} : a + 2\pi k \in [b, b + 2\pi)$, тогда:

$$\int_a^{a+2\pi} = \int_{a+2\pi(k-1)}^{a+2\pi k} = \int_{a+2\pi(k-1)}^{b} + \int_b^{a+2\pi k} = \int_b^{a+2\pi k} + \int_{a+2\pi k}^{b+2\pi} = \int_b^{b+2\pi}$$

□

Определение 1.9. Пусть $p \geqslant 1$, тогда определим $L_p(T) = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ — 2π-периодичная измеримая, $L_p(-\pi, \pi)\}$. Норма определяется аналогично:

$$\|f\|_p = \left(\int_{\pi}^{\pi} |f|^p\right)^{\frac{1}{p}}$$

Определение 1.10. $C(T) = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ — 2π-периодическая непрерывная функци $\}$ с $\|f\| = \sup_{[-\pi,\pi]} |f|$.

2 Тригонометриеский ряд Фурье

Определение 2.1. Ряд:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kx + b_k \sin kx \tag{2.1}$$

Называется тригонометрическим рядом с коэффициентами $a_k, b_k \in \mathbb{C}$.

По формулам Эйлера: $\cos kx = \frac{e^{ikx}+e^{-ikx}}{2}, \sin kx = -i\left(\frac{e^{ikx}-e^{-ikx}}{2}\right)$, поэтому частичные суммы можно переписать в виде:

$$S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n} a_k \cos kx + b_k \sin kx = \sum_{k=-n}^{n} c_k e^{ikx}$$

Где $c_{\pm k} = \frac{a_k \mp i b_k}{2}, \frac{a_0}{2} = c_0$.

Определение 2.2. Ряд:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx} \tag{2.2}$$

Называется тригонометрическим рядом в комплексной форме, и его сумма считается как

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx} = \lim_{n\to\infty} \sum_{-n}^{n} c_k e^{ikx}$$

Лемма 2.1. *Пусть $f \in L_1(-\pi,\pi)$ и тригонометрический ряд в форме (2.1) или (2.2) сходится почти всюду к f и существует $g \in L_1(-\pi,\pi)$, такая, что $|S_n(x)| \leqslant g \forall n$ для почти всех x. Тогда:*

$$a_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\cos kt, b_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\sin kt, c_k = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-ikx}$$

Доказательство. Зафиксируем $k \in \mathbb{Z}$. По условию, $S_n(x)e^{-ikx} \to f(x)e^{-ikx}$ почти всюду. При этом, $|S_n(x)e^{-ikx}| \leqslant g$. Поэтому, по теореме Лебега о мажорируемой сходимости, имеем:

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-\pi}^{\pi} S_n(x)e^{-ikx}dx = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-ikx}dx$$

Так как $\int_{-\pi}^{\pi} e^{imx}e^{-ikx}dx = \begin{cases} 0, k \neq m \\ 2\pi, k = m \end{cases}$, то

$$\int_{-\pi}^{\pi} S_n e^{-ikx}dx = 2\pi c_k, n \geqslant |k|$$

Следовательно, $\int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-ikx}dx = 2\pi c_k$ □

Определение 2.3. Пусть $f \in L_1(T)$. Числа

$$a_k(f) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\cos kt, b_k(f) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\sin kt, c_k(f) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-ikx}$$

Называются коэффициентами Фурье функции f, а ряд

$$S(f,x) = \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k(f)\cos kx + b_k(f)\sin kx = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k(f)e^{ikx}$$

Называется тригонометрическим рядом Фурье функции f

Замечание. По лемме Римана об осцилляции, $a_k(f), b_k(f) \to 0$ при $k \to \infty$ и $c_k(f) \to 0$ при $|k| \to 0$.

2.1 Поточечная сходимость рядов Фурье

Определение 2.4. $D_n(t) = \frac{1}{2}\sum_{k=-n}^{n} e^{ikt} = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{n} \cos kt$ называется n-ым ядром Дирихле.

Замечание. Функция D_n непрерывна, 2π-периодическая, $\int_{-\pi}^{\pi} D_n(t)dt = \pi$.

Имеем:

$$S_n(f,x) = \sum_{k=-n}^{n}\left(\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(s)e^{-iks}ds\right)e^{ikx} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(s)\sum_{k=-n}^{n} e^{ik(x-s)}ds = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(s)D_n(x-s)ds =$$

$$\frac{1}{\pi}D_n * f(x) = \frac{1}{\pi}f * D_n(x)$$

$$D_n(t) = \frac{1}{2}e^{-nit}\left(1 + e^{it} + \dots + e^{2nit}\right) = \frac{1}{2}e^{-nit}\frac{e^{2(n+1)it} - 1}{e^{it} - 1} = \frac{e^{\left(n+\frac{1}{2}\right)it} - e^{-\left(n+\frac{1}{2}\right)it}}{2\left(e^{\frac{it}{2}} - e^{-\frac{it}{2}}\right)} = \frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)t}{2\sin\frac{t}{2}}$$

Лемма 2.2. *Пусть $f \in L_1(T)$ и $0 < \delta < \pi$. Тогда $\forall x \in \mathbb{R}$ выполнено:*

$$S_n(f,x) = \frac{1}{\pi}\int_{-\delta}^{\delta}\frac{f(x-t)}{t}\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)tdt + \varepsilon_n(x), \lim_{n\to\infty}\varepsilon_n(x) = 0$$

Доказательство. Имеем:

$$S_n(f,x) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x-t)\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)t}{2\sin\frac{t}{2}}dt =$$

$$= \frac{1}{\pi}\int_{|t|<\delta}\frac{f(x-t)}{t}\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)tdt + \frac{1}{\pi}\int_{\delta\leqslant|t|\leqslant\pi}\frac{f(x-t)}{t}\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)t +$$

$$+\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x-t)\left(\frac{1}{2\sin\frac{t}{2}} - \frac{1}{t}\right)\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)t$$

$h(t) = f(x-t)$ интегрируема на $(-\pi,\pi)$. Положим $g(t) = \frac{1}{2\sin\frac{t}{2}} - \frac{1}{t}$. По непрерывности, доопределим $g(0) = 0$ — то есть g непрерывна на $[-\pi,\pi] \Rightarrow$ ограничена. Аналогично, $\frac{f(x-t)}{t}$ интегрируема на $\pi \geqslant |t| \geqslant \delta$. Но тогда по лемма Римана об осцилляции, получаем желаемое. □

Теорема 2.1. *Пусть $f \in L_1(T), x \in \mathbb{R}$. Тогда:*

$$\lim_{n\to\infty} S_n(f,x) = S \Leftrightarrow \exists\delta \in (0,\pi] : \lim_{n\to\infty}\int_0^{\delta}\frac{f(x+t) + f(x-t) - 2S}{t}\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)tdt = 0 \quad (2.3)$$

Доказательство. Функция $t \mapsto \frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)t}{t}$ — четная, поэтому:

$$S_n(f,x) = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi \frac{f(x+t)+f(x-t)}{t}\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)tdt + o(1)$$

Заметим, что для $h \equiv 1, c_0(h) = 1, c_n(h) = 0 \Rightarrow S_n(h,x) = 1$. Поэтому:

$$1 = \frac{2}{\pi}\int_0^\delta \frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)t}{t}dt + o(1)$$

$$S_n(f,x) - S = \frac{1}{\pi}\int_0^\delta \frac{f(x+t)+f(x-t)-2S}{t}\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)tdt + o(1)$$

□

Среди признаков сходимости рядов выделим 2: признак Дини и признак Дирихле.

Утверждение 2.1 (Признак Дини)**.** *Пусть $f \in L_1(T), x \in \mathbb{R}$. Если для некоторого $S \in \mathbb{C}\exists\delta > 0$, такое, что выполнено*

$$\int_0^\delta \frac{|f(x+t)+f(x-t)-2S|}{t}dt < \infty$$

Тогда ряд Фурье $S(f,x)$ сходится в x к S.

Доказательство. По условию подынтегральная функция лежит в $L_1(0,\delta)$. Следовательно, по лемме Римана об осцилляции выполнено (2.3). Далее утверждение следует из предыдущей теоремы. □

Следствие. Пусть $f \in L_1(T), x \in \mathbb{R}$. Если существуют $f(x\pm 0) \in \mathbb{R}$ и $\alpha_I = \lim_{t\to\pm 0}\frac{f(x+t)+f(x\pm 0)}{t} \in \mathbb{R}$, то ряд Фурье $S(f,x) = \frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}$.

Доказательство. Положим $S = \frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}$. Рассмотрим $\psi_x(t) = \frac{f(x+t)-f(x-t)-2S}{t}, t > 0$. Тогда:

$$\psi_x(t) = \frac{f(x+t)-f(x+0)}{t} + \frac{f(x-t)-f(x-0)}{t} \to_{t\to+0} \alpha_+ - \alpha_-$$

Данная функция ограничена на $(0,\delta)$ □

Следствие. Пусть f — 2π-периодическая функция, такая, что $\forall x \in \mathbb{R}\exists f'_\pm(x) \in \mathbb{R}$ (в частности, f непрерывна). Тогда $S(f,x) = f(x)$.

Лемма 2.3 (Абеля)**.** *Пусть $f \in L_1([a,b]), g$ монотонна на $[a,b]$. Если*

$$\left|\int_a^x f(t)dt\right| \leqslant M$$

Тогда:

$$\left|\int_a^b f(x)g(x)dx \leqslant 2M(|g(b)|+|g(a)|)\right|$$

Доказательство. См 2 семестр □

Утверждение 2.2 (Признак Дирихле)**.** *Пусть* $f \in L_1(T), x \in \mathbb{R}$. *Если* f *монотонна на* $[x-\delta, x+\delta]$ *при некотором* $\delta > 0$, *то* $S(f,x) = \frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}$

Доказательство. Пусть f нестрого возрастает на $[x-\delta, x+\delta]$. Рассмотрим:

$$\int_0^\sigma \frac{f(x+t)-f(x+0)}{t} \sin\left(n+\frac{1}{2}\right) tdt, \sigma \in (0,\delta)$$

Также, пусть $I(n) = \int_0^n \frac{\sin t}{t} dt \to_{n\to\infty} \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt \Rightarrow \exists M : |I(n)| \leqslant M$ на $[0,+\infty)$. Следовательно:

$$\left|\int_0^x \frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)t}{t} dt\right| = \left|\int_0^{x\left(n+\frac{1}{2}\right)} \frac{\sin u}{u} du\right| \leqslant M$$

Т.к. монотонная функция имеет множество точек разрыва меры 0, и разрывы могут быть только первого рода, то зааменим $f(x)$ на $f(x+0)$, т.к. интеграл от этого не изменится. По неравенству Абеля:

$$\left|\int_0^\sigma \frac{f(x+t)-f(x+0)}{t} \sin\left(n+\frac{1}{2}\right) tdt\right| \leqslant 2M|f(x+\sigma)-f(x+0)|$$

Заметим, что по теореме Римана об осцилляции,

$$\int_\sigma^\delta \frac{f(x+t)-f(x+0)}{t} \sin\left(n+\frac{1}{2}\right) tdt \to 0, n \to \infty$$

Получаем, что

$$\int_0^\delta \frac{f(x+t)-f(x+0)}{t} \sin\left(n+\frac{1}{2}\right) tdt \to 0$$

Аналогично доказывается, что

$$\int_0^\delta \frac{f(x-t)-f(x-0)}{t} \sin\left(n+\frac{1}{2}\right) tdt \to 0$$

Из чего по теореме следует утверждение. □

Лемма 2.4. *Пусть* $f \in L_1(T), 0 < \delta \leqslant \pi$. *Тогда:*

$$S_n(f,x) = \frac{1}{\pi}\int_{-\delta}^\delta \frac{f(x-t)}{t} \sin\left(n+\frac{1}{2}\right) tdt + \varepsilon_n(x), \varepsilon_n(x) \rightrightarrows 0 \text{ на } K \text{ — компакте}, K \subset \mathbb{R}$$

Лемма 2.5. *Пусть* $f, g \in L_1(T)$, *причем* g *ограничена. Тогда*

$$\varphi_n(x) = \int_{-\pi}^\pi f(x-t)g(t)e^{int}dt \rightrightarrows 0 \text{ на любом компакте } K \subset \mathbb{R}$$

Доказательство. $\varphi_n(x) \to 0 \forall x$ по лемме Римана об осцилляции. Предположим противное, т.е.

$$\exists \varepsilon > 0 : \exists \{n_k\} \exists \{x_k\} \subset K \left(\varphi_{n_k}(x_k)\right) \geqslant \varepsilon$$

У последовательности x_k имеется сходящаяся подпоследовательность, поэтому считаем,

что $x_k \to x_0$.

$$\varepsilon \leqslant |\varphi_{n_k}(x_k)| \leqslant |\varphi_{n_k}(x_k) - \varphi_{n_k}(x_0)| + \underbrace{|\varphi_{n_k}(x_0)|}_{\to 0}$$

Рассмотрим первый модуль:

$$|\varphi_{n_k}(x_k) - \varphi_{n_k}(x_0)| = \left|\int_{-\pi}^{\pi} (f(x_k - t) - f(x_0 - t))g(t)e^{in_k t}dt\right| \leqslant \int_{-\pi}^{\pi} |f(x_k - t) - f(\underbrace{x_0 - t}_{y})| \underbrace{|g(t)|}_{\leqslant C} dt \leqslant$$

$$\leqslant C \int_{-\pi}^{\pi} |f(x_k - x_0 + y) - f(y)| dy \to_{k\to\infty} 0$$

Получили противоречие с тем, что правая часть $\geqslant \varepsilon$. □

Замечание. По ходу доказательства мы доказали, что семейство $\{\varphi_{n_k}\}$ — компактное множество в пространстве непрерывных функций.

Теорема 2.2 (Риман)**.** *Пусть $f, g \in L_1(T), x \in \mathbb{R}$. Если $f = g$ на $(x - \delta, x + \delta)$, то $S_n(f, x) - S_n(g, x) \to 0, n \to +\infty$, причем данная сходимость равномерная на любом $[a, b] \subset (x - \delta, x + \delta)$*

Доказательство.

$$f(x - t) = g(x - t) \forall |t| < \delta$$

$$S_n(g, x) = S_n(f, x) + \varepsilon_n(x) = o(1)$$

Причем $\varepsilon_n(x) \rightrightarrows 0$ на любом $K \subset (x - \delta, x + \delta)$. □

Теорема 2.3. *Пусть $S(x)$ ограничена и $K \subset \mathbb{R}$ — компакт. Тогда $S_n(f, x) \rightrightarrows_K S(x) \Leftrightarrow \exists \delta > 0 : \lim_{n\to\infty} \int_0^\delta \frac{f(x+t)+f(x-t)-2S(x)}{t} dt$ равномерно по $x \in K$*

Доказательство. Аналогично предыдущей теореме. □

Определение 2.5. Говорят, что функция f удовлетворяет условию Гельдера на $E \subset \mathbb{R}$ с показателем $\alpha \in (0, 1]$, если $\exists C > 0 : \forall x, y \in E : |f(x) - f(y)| \leqslant C|x - y|^\alpha$

Пример. Рассмотрим $f = \sqrt{x}, E = (0, +\infty)$. Данная функция удовлетворяет условию Гельдера с $\alpha = \frac{1}{2}$ (следует из неравенства $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leqslant \sqrt{|x - y|}$).

Определение 2.6. Функция f называется кусочно-непрерывной на $[a, b]$, если $\exists I$ — разбиение $[a, b]$ точками $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, что f непрерывна на (x_i, x_{i+1}) и существуют и конечны пределы $f(x_i \pm 0)$ при $0 < i < n$ и $f(a + 0), f(b - 0)$.

Пример. Если для непрерывной функции f, производная f' кусочно-непрерывная, то f удовлетворяет условию Гельдера с $\alpha = 1$.

Теорема 2.4 (Признак Липшица)**.** *Пусть $f \in L_1(T)$ и удовлетворяет условию Гельдера на $[a, b]$. Тогда $S_n(f, x) \rightrightarrows f(x)$ на любом $[a', b'] \subset (a, b)$.*

Доказательство. Существует $\delta < 0$, такое, что $|t| < \delta \Rightarrow x - t \in [a, b]$ для $x \in [a', b'] \subset (a, b)$. Для $\delta_1 \in (0, \delta)$, имеем $|f(x \pm t) - f(x)| \leqslant C|t|^\alpha$. Тогда:

$$\left|\int_0^{\delta_1} \frac{f(x + t) + f(x - t) - 2f(x)}{t} \sin\left(n + \frac{1}{2}\right) t dt\right| \leqslant$$

$$\leqslant \int_0^{\delta_1} \frac{|f(x+t)-f(x)|+|f(x-t)-f(x)|}{t} dt \leqslant$$

$$\leqslant 2C \int_0^{\delta_1} t^{\alpha-1} dt = \frac{2C}{\alpha}\delta_1^\alpha < \frac{\varepsilon}{2}$$

Также,

$$\int_{\delta_1}^{\delta} \frac{f(x+t)+f(x-t)-2f(x)}{t} \sin\left(n+\frac{1}{2}\right) t dt =$$

$$= \int_{-\pi}^{\pi} (f(x+t)+f(x-t)-2f(x)) \frac{I_{[\delta_1,\delta]}}{t} \sin\left(n+\frac{1}{2}\right) dt \rightrightarrows 0$$

Для доказательства равномерной сходимости достаточно разбить интеграл на три части и воспользовался предыдущей леммой. Тогда

$$\exists N : \forall n \geqslant N \forall x \in [a', b'] : \left| \int_{-}^{\pi} (f(x+t)+f(x-t)-2f(x)) \frac{I_{[\delta_1,\delta]}}{t} \sin\left(n+\frac{1}{2}\right) dt \right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

А значит:

$$\left| \int_0^{\delta} \frac{f(x+t)+f(x-t)-2f(x)}{t} \sin\left(n+\frac{1}{2}\right) t dt \right| < \varepsilon$$

Что и требовалось □

Следствие. Пусть $f \in C(T)$ и f' кусочно-непрерывна на $[-\pi, \pi] \Rightarrow S_n(f, x) \rightrightarrows f(x)$ на $\mathbb{R}$.

2.2 Почленное дифференцирование и интегрирование рядов Фурье

Теорема 2.5. *Пусть $f \in C(T)$ и f' кусочно непрерывна на $[-\pi, \pi]$. Тогда $S(f', x) = S'(f, x)$ — почленно продифференцированный ряд Фурье*

Доказательство. По формуле интегрирования по частям:

$$2\pi c_n(f') = \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) e^{-inx} dx = f(x) e^{-inx}|_{-\pi}^{\pi} + in \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx = 2\pi i n c_n(f)$$

Итак, $c_n(f') e^{inx} = (c_n(f) e^{inx})'$, что и требовалось □

Следствие (О порядке убывания коэффициентов Фурье)**.** Пусть $f, f', \dots f^{(m-1)} \in C(T)$ и $f^{(m)}, f^{(m+1)}$ — кусочно-непрерывны на $[-\pi, \pi]$. Тогда $c_n(f) = O\left(\frac{1}{|n|^{m+1}}\right)$ при $n \to \infty$

Доказательство. Последовательно применяя предыдущую теорему, имеем: $c_n(f^{(m)}) = (in)^m c_n(f)$. К точкам разрыва $f^{(m+1)}$ добавим еще точки $-\pi, \pi$ и упорядочим по возрастанию: $-\pi = x_0 < x_1 < \dots < x_N = \pi$. По формуле интегрирования по частям:

$$\int_{x_{j-1}}^{x_j} f^{(m+1)}(x) e^{-inx} dx = f^{(m)}(x) e^{-inx}|_{x_{j-1}+0}^{x_j-0} + in \int_{x_{j-1}}^{x_j} f^{(m)}(x) e^{-inx} dx$$

$$c_n(f^{m+1}) = \lambda_n + i n c_n(f^{(m)}), \lambda_n = \frac{1}{2\pi} \sum_{j=1}^{N} \left(f^{(m)}(x_j - 0) e^{-inx_j} - f^{(m)}(x_{j-1}+0) e^{-inx_{j-1}} \right)$$

Заметим, что λ_n ограничена. Т.к. $c_n(f^{(m+1)}) = o(1)$, то $i n c_n(f^{(m)}) = O(1)$. □

Задача. *Если в условии следствия* $c_n(f) = O\left(\frac{1}{|n|^{m+1+\varepsilon}}\right)$ *для некоторого* $\varepsilon > 0$, *то* $f^{(m)} \in C(T)$.

Упражнение. *По свойствам интеграла с переменным пределом получить, что* $f^{(m)}$ *кусочно-непрерывна, если* $f^{(m+1)}$ *кусочно-непрерывна*

Лемма 2.6. *Пусть* $f \in L_1(T), F(x) = \int_{-\pi}^{x}(f(t) - c_0(f))dt, x \in \mathbb{R}$. *Тогда* F *непрерывна,* 2π*-периодическая и является суммой своего ряда Фурье:*

$$F(x) = c_0(F) + \sum_{n\neq 0} \frac{c_n(F)}{in} e^{inx}$$

Доказательство. Положим $f_0 = f - c_0(f)$. Найдем $c_n(F)$ при $n \neq 0$:

$$\int_{-\pi}^{\pi} F(x)e^{-inx}dx = \int_{-\pi}^{\pi}\left(\int_{-\pi}^{x} f_0(t)e^{-inx}dt\right)dx$$

Применяя теорему Фубини, получаем:

$$\int_{-\pi}^{\pi}\left(\int_{t}^{\pi} f_0(t)e^{-inx}dx\right)dt = \int_{-\pi}^{\pi} f_0(t)\frac{e^{-int} - (-1)^n}{in}dt =$$

$$= \int_{-\pi}^{\pi}(f(t) - c_0(f))\frac{e^{-int}}{in}dt = \frac{1}{in}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-int}dt$$

Следовательно, $c_n(F) = \frac{c_n(f)}{in}, n \neq 0$. Положим $f = f^+ - f^- \Rightarrow F(x) = \int_{-\pi}^{x} f^+(t)dt - \int_{-\pi}^{x} f^-(t)dt - c_0(x+\pi)$, то сходимость ряда Фурье к F следует из признака Дирихле (как сумма рядов Фурьте для монотонных функций). □

Замечание. Положим $x = 0$ в формуле из леммы:

$$F(0) = c_0(F) + \sum_{n\neq 0}\frac{c_n(F)}{in}$$

Следовательно, сходится ряд:

$$-\sum_{n\neq 0}\frac{c_n(f)}{in} = -\sum_{n=1}^{\infty}\frac{c_n(f) - c_{-n}(f)}{in} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{b_n(f)}{n}$$

Теорема 2.6. *Если* $f \in L_1(T), -\infty \leqslant a < b \leqslant \infty$, *то*

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(f)\int_a^b e^{inx}dx$$

Доказательство.

$$F(b) - F(a) = \sum_{n\neq 0}\frac{c_n(f)}{in}(e^{inb} - e^{ina}) = \sum_{n\neq 0} c_n(f)\int_a^b e^{inx}dx = \int_a^b f(x)dx - c_0(f)(b-a)$$

□

Следствие (Теорема единственности)**.** Если $f, g \in L_1(T)$ и $c_n(f) = c_n(g) \forall n \in \mathbb{Z}$, то $f = g$ почти всюду.

Доказательство. $\forall x \in [-\pi, \pi] \int_{-\pi}^{x} f(x)dt = \int_{-\pi}^{x} g(t)dt$. Из теории меры нам известно, что это гарантирует равенство функций f, g почти всюду. □

2.3 Суммирование рядов Фурье методом средних арифметических

Ряд Фурье непрерывной функции может расходиться в некоторых точках (и даже на множестве меры 0). Однако он всегда суммируем методом средних арифметических.

Определение 2.7. Пусть $f \in L_1(T)$, тогда определим последовательность:

$$\sigma_N(f, x) = \frac{S_1(f, x) + \cdots + S_N(f, x)}{N}$$

Данная последовательность называется суммой Фейера.

Замечание. $\sigma_N(f, x) = \sum_{n=-N}^{N} \left(1 - \frac{|n|}{N+1}\right) c_n(f) e^{inx}$

Т.к. $S_n(f) = \frac{1}{\pi} f * D_n$, то $\sigma_N(f) = \frac{1}{\pi(N+1)} \sum_{n=0}^{N} f * D_n = \frac{1}{\pi} f * F_N$, где $F_N = \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^{N} D_n$ — ядро Фейера. Получим формулу для ядра Фейера без значка суммирования. Имеем:

$$(N+1)F_N(t) = \sum_{n=0}^{N} \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right) t \sin\frac{t}{2}}{2\sin^2\frac{t}{2}} = \sum_{n=0}^{N} \frac{\cos nt - \cos(n+1)t}{4\sin^2\frac{t}{2}} = \frac{1 - \cos(N+1)t}{4\sin^2\frac{t}{2}} =$$

$$= \frac{\sin^2\frac{N+1}{2}t}{2\sin^2\frac{t}{2}}, t \neq 2\pi, m \in \mathbb{Z}$$

Таким образом, получили:

$$F_N(t) = \begin{cases} \frac{1}{2(N+1)} \frac{\sin^2\frac{N+1}{2}t}{\sin^2\frac{t}{2}}, t \neq 2\pi m \\ \frac{N+1}{2}, t = 2\pi m \end{cases}$$

Замечание (Свойства ядра Фейера)**.**

1. $F_N \geqslant 0$
2. $$\int_{-\pi}^{\pi} F_N(t)dt = \pi$$
3. $$\forall \delta > 0 \int_{\delta < |t| \leqslant \pi} F_N(t)dt \to 0, N \to +\infty$$

Утверждение 2.3. *3.* $0 \leqslant F_N(t) \leqslant \frac{1}{2(N+1)} \frac{1}{\sin^2\frac{\delta}{2}}$

Следствие. $\left\{\frac{1}{\pi} F_N\right\}$ — аппроксимация единицей.

Тогда по теореме 6 параграфа 1, получаем:

Теорема 2.7 (Фейер)**.** *Пусть $f_1 \in L_1(T)$, тогда справедливы утверждения:*

1. *Если f непрерывна в точке x, то $\sigma_N(f,x) \to f(x)$.*
2. *Если f непрерывна на компакте K, то $\sigma_N(f,x) \rightrightarrows_K f$. В частности, если $f \in C(T)$, то $\sigma_N(f,x) \rightrightarrows f$ на $\mathbb{R}$*

Определение 2.8. $T(x) = \alpha_0 + \sum_{k=1}^n \alpha_k \cos kx + \beta_k \sin kx = \sum_{k=-n}^n \gamma_k e^{ikx}$ называется тригонометрическим многочленом.

Следствие (1-ая теорема Вейерштрасса)**.** Если $f \in C(T)$, то $\forall \varepsilon > 0 \exists T$ — тригонометрический многочлен, такой, что $\|f - T\|_\infty < \varepsilon$, где $\|f\|_\infty = \sup_{[-\pi,\pi]} |f|$.

Доказательство. По теореме Фейера, $\|f - \sigma_N(f)\|_\infty \to 0$ при $N \to \infty$, поэтому в качестве $T(x)$ положим $\sigma_N(f,x)$. □

Следствие (2-ая теорема Вейерштрасса)**.** Если $f \in C[a,b]$, то $\forall \varepsilon > 0 \exists P(x) = \sum_{k=0}^n \alpha_k x^k$ — алгебраический многочлен, т.ч. $\|f - P\|_{C[a,b]} < \varepsilon$

Доказательство. Замена $x = a + \frac{b-a}{\pi} t$ сводит отрезок $[a,b]$ к случаю $[0,\pi]$, $f \in C[0,\pi]$. Рассмотрим $\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), x \in [0,\pi] \\ f(-x), x \in [-\pi, 0] \end{cases}$ с периодом 2π на $\mathbb{R}$. Тогда $\tilde{f} \in C(T)$ и по предыдущему следствию $\exists T$ — тригонометрический многочлен, такой, что $\|\tilde{f} - T\|_\infty < \frac{\varepsilon}{2}$. Функцию T можно представить рядом Маклорена на $\mathbb{R}$: $T(x) = \sum_{k=0}^\infty \alpha_k x^k$, причем данный ряд сходится равномерно на любом подотрезке $\mathbb{R}$. Тогда $\exists P(x) = \sum_{k=0}^n \alpha_k x^k : \|T - P\|_{C[-\pi,\pi]} < \frac{\varepsilon}{2}$. Следовательно, $\|f - P\|_{C[0,\pi]} \leqslant \|\tilde{f} - P\|_{C[-\pi,\pi]} \leqslant \|\tilde{f} - T\|_[C[-\pi,\pi]] + \|T - P\|_{C[-\pi,\pi]} = \varepsilon$ □

Теорема 2.8. *$L_p(E)$ банахово.*

Доказательство. Пусть $\{f_n\}$ — фундаментальная последовательность в $L_p(E)$. Покажем, что $\exists f \in L_p(E), \exists \{f_{n_k}\} : f_{n_k} \to f$ почти всюду на E. Из определения фундаментальной последовательности по индукции строим подпоследовательность $\{f_{n_k}\}$, т.ч. $\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\| < \frac{1}{2^k}$. Заметим, что $\{f_{n_k}\}$ сходится $\Leftrightarrow$ сходится почти всюду ряд

$$(*) = f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^\infty (f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x))$$

Покажем, что ряд $(*)$ сходится абсолютно почти всюду. Рассмотрим $F = \sum_{k=1}^\infty |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|, F_n = \sum_{k=1}^n |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|$. Последовательность $\{F_n^p\}$ нестрого возрастает, тогда по теореме Леви,

$$\lim_{n\to\infty} \int F_n^p d\mu = \int F^p d\mu$$

Интегралы в левой части ограничены:

$$\|F_n\|_p \leqslant \sum_{k=1}^n \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < \sum_{k=1}^\infty \frac{1}{2^k} = 1 \Rightarrow \|F\|_p \leqslant 1$$

Получили, что F интегрируема, но тогда она конечна почти всюду и ряд $(*)$ сходится тоже почти всюду. □