Problem: Regular Triangular Pyramids & Regular Quadrilateral Pyramids – Bài Tập: Hình Chóp Tam Giác Đều & Hình Chóp Tứ Giác Đều

Nguyễn Quản Bá Hồng*

Ngày 10 tháng 10 năm 2024

Tóm tắt nội dung

This text is a part of the series Some Topics in Elementary STEM & Beyond: URL: https://nqbh.github.io/elementary_STEM.

Latest version:

• Problem: Regular Triangular Pyramids & Regular Quadrilateral Pyramids – Bài Tập: Hình Chóp Tam Giác Đều & Hình Chóp Tứ Giác Đều.

PDF: URL: .pdf. T_FX: URL: .tex.

• Problem & Solution: Regular Triangular Pyramids & Regular Quadrilateral Pyramids – Bài Tập & Lời Giải: Hình Chóp Tam Giác Đều & Hình Chóp Tứ Giác Đều.


PDF: URL: .pdf. T_EX: URL: .tex.

Mục lục

1	Regular Triangular Pyramids – Hình Chóp Tam Giác Đêu	1
	1.1 Diện Tích Xung Quanh của Hình Chóp Tam Giác Đều	2
	1.2 Diện Tích Toàn Phần của Hình Chóp Tam Giác Đều	
	1.3 Thể Tích của Hình Chóp Tam Giác Đều	2
2	Regular Quadrilateral Pyramids – Hình Chóp Tứ Giác Đều	2
3	Miscellaneous	2

1 Regular Triangular Pyramids – Hình Chóp Tam Giác Đều

Hình chóp tam giác đều S.ABC có 4 mặt, 6 cạnh. Mặt đáy ABC là 1 tam giác đều. 3 mặt bên SAB, SBC, SCA là 3 tam giác cân tại S. 3 cạnh đáy bằng nhau: AB = BC = CA. 3 cạnh bên bằng nhau: SA = SB = SC. S gọi là dinh của hình chóp tam giác đều S.ABC.



^{*}A Scientist & Creative Artist Wannabe. E-mail: nguyenquanbahong@gmail.com. Bén Tre City, Việt Nam.

1.1 Diện Tích Xung Quanh của Hình Chóp Tam Giác Đều

Định nghĩa 1 (Diện tích xung quanh & trung đoạn của hình chóp tam giác đều). Với hình chóp tam giác đều S.ABC. Tổng diện tích của 3 tam giác (mặt bên) SAB,SBC,SCA gọi là diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều S.ABC: $S_{xq,S.ABC} := S_{SAB} + S_{SBC} + S_{SCA}$. Gọi SM,SN,SP lần lượt là đường cao của $\Delta SAB,SBC,SCA$. Mỗi đoạn thẳng SM,SN,SP đều được gọi là trung đoạn của hình chóp tam giác đều S.ABC.

Định lý 1. Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều bằng nửa tích của chu vi đáy với độ dài trung đoạn.

Chứng minh. Vì SA = SB = SC & AB = BC = CA nên $\Delta SAB = \Delta SBC = \Delta SCA$ (c.c.c) suy ra SM = SN = SP (3 đường cao tương ứng). Đặt $d \coloneqq SM = SN = SP$. Có: $S_{\text{xq},S.ABC} \coloneqq S_{SAB} + S_{SBC} + S_{SCA} = \frac{1}{2}AB \cdot SM + \frac{1}{2}BC \cdot SN + \frac{1}{2}BC \cdot SP = \frac{1}{2}d \cdot AB + \frac{1}{2}d \cdot BC + \frac{1}{2}d \cdot CA = \frac{1}{2}d(AB + BC + CA) = \frac{1}{2}dC_{ABC}$.

Nhận xét 1. Nhờ chứng minh này, dễ thấy định lý trên, i.e., công thức tính diện tích xung quanh $S_{xq} = \frac{1}{2}Cd$ vẫn đúng với các hình chóp tam giác có 3 trung đoạn bằng nhau với đáy không nhất thiết phải là tam giác đều.

- \star Công thức tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều: $S_{xq} = \frac{1}{2}Cd = \frac{3}{2}ad$, trong đó S_{xq} : diện tích xung quanh, C: $chu\ vi\ đáy,\ a$: $d\hat{\rho}$ dài canh của tam giác đều mặt đáy, C = 3a, d: $d\hat{\rho}$ dài trung đoạn của hình chóp tam giác đều.
- 1. Cho 1 hình chóp tam giác đều có độ dài cạnh đáy bằng a & độ dài trung đoạn bằng d. Tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều đó.

Giải. Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều đó: $S_{xq} = \frac{1}{2}Cd = \frac{3}{2}ad$.

2. Cho 1 hình chóp tam giác đều có độ dài cạnh đáy bằng a \mathcal{E} diện tích xung quanh bằng S_{xq} . Tính độ dài trung đoạn của hình chóp tam giác đều đó.

Giải. Độ dài trung đoạn của hình chóp tam giác đều đó: $d = \frac{2S_{xq}}{C} = \frac{2S_{xq}}{3C}$.

3. Cho 1 hình chóp tam giác đều có độ dài trung đoạn bằng d $\mathscr E$ diện tích xung quanh bằng $S_{
m xq}$. Tính chu vi đáy $\mathscr E$ độ dài cạnh đáy của hình chóp tam giác đều đó.

Giải. Chu vi đáy & độ dài cạnh đáy của hình chóp tam giác đều đó lần lượt là: $C = \frac{2S_{xq}}{d}$, $a = \frac{C}{3} = \frac{2S_{xq}}{3d}$.

1.2 Diện Tích Toàn Phần của Hình Chóp Tam Giác Đều

* Công thức tính diện tích toàn phần của hình chóp tam giác đều:

$$S_{\text{tp}} = S_{\text{xq}} + S_{\text{d}} = \frac{1}{2}Cd + \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{3}{2}ad + \frac{a^2\sqrt{3}}{4}.$$

1.3 Thể Tích của Hình Chóp Tam Giác Đều

Định lý 2. Thể tích của hình chóp tam giác đều bằng $\frac{1}{3}$ tích của diện tích đáy với chiều cao.

 \star Công thức tính thể tích của hình chóp tam giác đều: $V = \frac{1}{3}S_{\mathrm{d}}h = \frac{a^2h\sqrt{3}}{12}$, trong đó V: thể tích, S_{d} : diện tích đáy, h: chiều cao của hình chóp tam giác đều.

2 Regular Quadrilateral Pyramids – Hình Chóp Tứ Giác Đều

3 Miscellaneous