

Problem: Root – Bài Tập: Căn Thức

Nguyễn Quân Bá Hồng*

Ngày 20 tháng 12 năm 2023

Tóm tắt nội dung

Last updated version: [GitHub/NQBH/elementary STEM & beyond/elementary mathematics/grade 9/root/problem: set \$\mathbb{Q}\$ of roots \[pdf\]](https://github.com/NQBH/elementary-STEM_beyond/blob/main/elementary_mathematics/grade_9/root/problem/NQBH_root_problem.pdf).¹ [\[TeX\]](https://github.com/NQBH/elementary-STEM_beyond/blob/main/elementary_mathematics/grade_9/rational/problem/NQBH_root_problem.tex).²

Mục lục

1 Căn Bậc 2 & Số Vô Tỷ	1
2 Căn Thức Bậc 2 & Hằng Đẳng Thức $\sqrt{A^2} = A $	2
3 Liên Hệ Giữa Phép Nhân, Phép Chia & Phép Khai Phương	4
4 Biến Đổi Đơn Giản Biểu Thức Chứa Căn Thức Bậc 2	6
5 Rút Gọn Biểu Thức Có Chứa Căn Thức Bậc 2	7
6 Phương Trình Vô Tỷ	8
7 Cube Root – Căn Bậc 3	9
8 n th Root – Căn Bậc n	9
9 Miscellaneous	9
Tài liệu	9

1 Căn Bậc 2 & Số Vô Tỷ

Ở Toán 7 (xem, e.g., [Thá+23, §5, pp. 27–29]), ta đã biết dạng biểu diễn thập phân của số hữu tỷ là hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn, dạng biểu diễn thập phân của số vô tỷ là vô hạn không tuần hoàn. Số hữu tỷ $a \in \mathbb{Q}$ nào cũng viết được dưới dạng $a = \frac{m}{n}$ với $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

[Thá+24, Chap. III, §1, pp. 48–54]: HD1. LT1. HD2. LT2. HD3. LT3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1 ([BBN23], p. 30). Chứng minh $\sqrt{3} + \sqrt{5}, 2\sqrt{3} - 3\sqrt{5}, \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}$ là 3 số vô tỷ.

2. Chứng minh tổng, hiệu, tích, thương của 2 số hữu tỷ (số chia $\neq 0$) là 1 số hữu tỷ.

Chứng minh. Gọi 2 số hữu tỷ bất kỳ là $\frac{a}{b}$ & $\frac{c}{d}$ với $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, $bd \neq 0$. Tổng, hiệu, tích, thương của 2 số hữu tỷ (số chia $\neq 0$) là 1 số hữu tỷ vì:

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}, \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \quad \forall a, b, c, d \in \mathbb{Z}, bd \neq 0; \quad \frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}, \quad \forall a, b, c, d \in \mathbb{Z}, bcd \neq 0,$$

trong đó điều kiện $bcd \neq 0$ đã đảm bảo số chia khác 0. □

3 ([Bin23], Ví dụ 2, p. 7). Chứng minh tổng 8 hiệu của 1 số hữu tỷ với 1 số vô tỷ là 1 số vô tỷ.

Giải. Chứng minh bằng phản chứng. Giả sử tồn tại 2 số $a \in \mathbb{Q}$ & $b \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sao cho $c = a + b \in \mathbb{Q}$. Ta có $b = c - a$, mà hiệu của 2 số hữu tỷ c, a là 1 số hữu tỷ nên $b \in \mathbb{Q}$, mâu thuẫn với giả thiết, nên c phải là số vô tỷ. Chứng minh tương tự cho hiệu. □

*Independent Researcher, Ben Tre City, Vietnam

e-mail: nguyenquanbahong@gmail.com; website: <https://nqbh.github.io>.

¹URL: https://github.com/NQBH/elementary-STEM_beyond/blob/main/elementary_mathematics/grade_9/root/problem/NQBH_root_problem.pdf.

²URL: https://github.com/NQBH/elementary-STEM_beyond/blob/main/elementary_mathematics/grade_9/rational/problem/NQBH_root_problem.tex.

4. (a) Chứng minh tích, thương của 1 số hữu tỷ khác 0 với 1 số vô tỷ là 1 số vô tỷ.³ (b) Chứng minh nếu tích hoặc thương của 1 số hữu tỷ với 1 số vô tỷ là 1 số hữu tỷ thì số hữu tỷ đó bằng 0.
5. Xét tính hữu tỷ, vô tỷ của 2 số $a, b \in \mathbb{R}$ thỏa mãn: (a) $a + b \in \mathbb{Q}$. (b) $a - b \in \mathbb{Q}$. (c) $ab \in \mathbb{Q}$. (d) $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$. (e) $a^2 + b^2 \in \mathbb{Q}$. (f) $a^2 - b^2 \in \mathbb{Q}$. (g) $a^3 + b^3 \in \mathbb{Q}$. (h) $a^3 - b^3 \in \mathbb{Q}$. (i) $a^m + b^n \in \mathbb{Q}$ với $m, n \in \mathbb{N}^*$. (j) $a^m - b^n \in \mathbb{Q}$ với $m, n \in \mathbb{N}^*$.
- 6 ([Bin23], Ví dụ 3, p. 7). Xét xem 2 số a, b có thể là số vô tỷ hay không, nếu: (a) $a + b$ và $a - b$ là 2 số hữu tỷ. (b) $a - b$ và ab là 2 số hữu tỷ.
- 7 ([Bin23], Ví dụ 4, p. 7). Chứng minh: Nếu số tự nhiên a không là số chính phương thì \sqrt{a} là số vô tỷ.
- 8 (Mở rộng [Bin23], Ví dụ 4, p. 7). Chứng minh: Nếu số hữu tỷ a không có dạng $\frac{m^2}{n^2}$ với $m, n \in \mathbb{N}$, $n \neq 0$, thì \sqrt{a} là số vô tỷ.
- 9 ([Bin23], 2., p. 8). Chứng minh các số sau là số vô tỷ: (a) $\sqrt{1 + \sqrt{2}}$. (b) $m + \frac{\sqrt{3}}{n}$ với $m, n \in \mathbb{Q}$, $n \neq 0$.
- 10 (Mở rộng [Bin23], 2., p. 8). Cho $a, b, c \in \mathbb{Q}$. Tìm điều kiện của a, b để: (a) $\sqrt{a + \sqrt{b}} \in \mathbb{Q}$. (b) $a + \frac{\sqrt{b}}{c} \in \mathbb{Q}$.
- 11 ([Bin23], 3., p. 8). Xét xem 2 số a, b có thể là số vô tỷ hay không nếu: (a) ab và $\frac{a}{b}$ là các số hữu tỷ. (b) $a + b$ và $\frac{a}{b}$ là các số hữu tỷ ($a + b \neq 0$). (c) $a + b$, a^2 , và b^2 là các số hữu tỷ ($a + b \neq 0$).
- 12 ([Bin23], 4., p. 8). So sánh 2 số: (a) $2\sqrt{3}$ và $3\sqrt{2}$. (b) $6\sqrt{5}$ và $5\sqrt{6}$. (c) $\sqrt{24} + \sqrt{45}$ và 12. (d) $\sqrt{37} - \sqrt{15}$ và 2.
- 13 ([Bin23], 5., p. 8). (a) Cho 1 ví dụ để chứng tỏ khẳng định $\sqrt{a} \leq a$ với mọi số a không âm là sai. (b) Cho $a > 0$. Với giá trị nào của a thì $\sqrt{a} > a$?
- 14 ([Bin23], 6*, pp. 8–9). (a) Chỉ ra 1 số thực x mà $x - \frac{1}{x}$ là số nguyên ($x \neq \pm 1$). (b) Chứng minh nếu $x - \frac{1}{x}$ là số nguyên và $x \neq \pm 1$ thì x và $x + \frac{1}{x}$ là số vô tỷ. Khi đó $\left(x + \frac{1}{x}\right)^{2n}$ và $\left(x + \frac{1}{x}\right)^{2n+1}$ là số hữu tỷ hay số vô tỷ?

2 Căn Thức Bậc 2 & Hằng Đẳng Thức $\sqrt{A^2} = |A|$

[Thá+24, Chap. III, §2, pp. 55–60]: HD1. LT1. HD2. LT2. HD3. LT3. HD4. LT4. HD5. LT5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

15 ([BBN23], Ví dụ 1, p. 9). Trên 1 khúc sông, dòng chảy của nước ở bề mặt sông lớn hơn dòng chảy của nước ở đáy sông. Gọi v km/h là vận tốc dòng chảy ở bề mặt sông, f km/h là vận tốc dòng chảy ở đáy sông, các nhà vật lý (physicists) đã tính được $\sqrt{f} = \sqrt{v} - 1.3$. (a) Nếu vận tốc dòng chảy ở bề mặt sông là 9 km/h thì vận tốc dòng chảy ở đáy sông là bao nhiêu? (b) Tính vận tốc dòng chảy ở bề mặt sông khi vận tốc dòng chảy ở đáy sông là 20.25 km/h.

16 ([BBN23], Ví dụ 2, p. 9). Tìm $x \in \mathbb{R}$ thỏa: (a) $x^2 = 10$. (b) $\sqrt{2x + 1} = 5$. (c) $\sqrt{2x + 1} = \sqrt{3x - 1}$.

17. Giải và biện luận phương trình theo các tham số $a, b, c, d \in \mathbb{R}$: (a) $x^2 = a$. (b) $\sqrt{ax + b} = c$. (c) $\sqrt{ax + b} = \sqrt{cx + d}$.

18 ([BBN23], Ví dụ 3, p. 10). So sánh: (a) 6 và $\sqrt{32}$. (b) $\sqrt{17} + \sqrt{10}$ và $\sqrt{48}$. (c) $\sqrt{4 + \sqrt{5 + \sqrt{6}}}$ và 3.

19 ([BBN23], Ví dụ 4, p. 10). Rút gọn biểu thức: (a) $\sqrt{(a - 3)^2}$ với $a \leq 3$. (b) $2\sqrt{a^2 - 10a + 25}$ với $a \geq 5$.

20 ([BBN23], Ví dụ 5, p. 10). Tìm $x \in \mathbb{R}$ thỏa: (a) $\sqrt{4x^2 - 28x + 49} = 7$. (b) $\sqrt{x - 10\sqrt{x + 25}} = 3$.

21 ([BBN23], Ví dụ 6, p. 11). Nguyên biện toán học: “Bất kỳ 2 số nào cũng bằng nhau”: Với 2 số a, b tùy ý, ta luôn có: $a^2 - 2ab + b^2 = b^2 - 2ba + a^2 \Leftrightarrow (a - b)^2 = (b - a)^2$. Khai căn bậc 2 2 vế, ta được: $a - b = b - a$, suy ra $2a = 2b \Leftrightarrow a = b$. Vậy bất kỳ 2 số nào cũng bằng nhau. Tìm điểm sai.

22 ([BBN23], Ví dụ 7, p. 11). (a) Tìm GTNN của biểu thức $A = \sqrt{x^2 - 8x + 20} - 12$. (b) Tìm GTLN của biểu thức $B = 5 + \sqrt{-4x^2 - 4x + 6}$.

Lưu ý 1. (a) Để tìm GTNN của 1 biểu thức A có dạng $A = \sqrt{ax^2 + bx + c} + d$, ta cần biến đổi biểu thức dưới dấu căn của A về dạng $f^2(x) + C$ ($C \geq 0$ là hằng số) rồi nhận xét $\sqrt{f^2(x) + C} \geq \sqrt{C}$. Dấu “=” xảy ra $\Leftrightarrow f(x) = 0$. (b) Để tìm GTLN của 1 biểu thức B có dạng $B = \sqrt{ax^2 + bx + c} + d$, ta cần biến đổi biểu thức dưới dấu căn của B về dạng $-f^2(x) + C$ ($C \geq 0$ là hằng số) rồi nhận xét $\sqrt{-f^2(x) + C} \leq \sqrt{C}$. Dấu “=” xảy ra $\Leftrightarrow f(x) = 0$.

23 ([BBN23], 1.1., p. 12). Cho $\triangle ABC$ vuông tại A . Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng:

AB	7 cm	0.3 m	
AC	24 cm		12 dm
BC		0.5 m	15 dm

³Không cần yêu cầu số vô tỷ khác 0 vì 0 là số hữu tỷ nên hiển nhiên 1 số vô tỷ bất kỳ luôn khác 0.

24 ([BBN23], 1.2., p. 12). Tìm $x \in \mathbb{R}$ thỏa: (a) $3\sqrt{x+1} = 18$. (b) $(2x)^2 = 64$. (c) $\sqrt{4x^2 - 4x + 1} = 7$.

25 ([BBN23], 1.3., p. 12). Tìm ĐKXD: (a) $\sqrt{15-3x}$. (b) $\sqrt{\frac{x^2+1}{x-1}}$. (c) $\sqrt{2x+10} + \frac{1}{x^2-4}$.

26 ([BBN23], 1.4., p. 12). Tính: (a) $\sqrt{0.09} \cdot \sqrt{25} - \sqrt{49} + \sqrt{\frac{121}{100}}$. (b) $\sqrt{8^2+6^2} + 2\sqrt{\sqrt{625}}$.

27 ([BBN23], 1.5., p. 12). Cho 6 số: $\sqrt{21}, 5, \sqrt{38}, -\sqrt{50}, 7, -\sqrt{37}$. Sắp xếp 6 số trên theo thứ tự tăng dần & tìm số dương nhỏ nhất.

28 ([BBN23], 1.6., p. 12). Tính cạnh của hình vuông, biết diện tích của hình vuông đó bằng diện tích hình tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông là 12.8 m, 40 m.

29 ([BBN23], 1.7., p. 12). Rút gọn biểu thức: (a) $\sqrt{(\sqrt{3}-4)^2}$. (b) $\sqrt{6-2\sqrt{5}}$. (c) $\sqrt{4a^2-5a}$ với $a > 0$. (d) $\sqrt{a^2-6a+9} - 2\sqrt{a^2+8a+16}$ với $-4 \leq a < 3$.

30 ([BBN23], 1.8., p. 12). Để tính giá trị của biểu thức $A = 3a + \sqrt{1-6a+9a^2}$ tại $a = 2$, Việt làm như sau: $A = 3a + \sqrt{(1-3a)^2} = 3a + (1-3a) = 1$. Nam lại tính: $A = 3 \cdot 2 + \sqrt{1-6 \cdot 2 + 9 \cdot 2^2} = 6 + \sqrt{25} = 6 + 5 = 11$. Ai đúng ai sai? Sai ở đâu?


31 ([BBN23], 1.9., p. 12). Tìm $x \in \mathbb{R}$ thỏa: (a) $\sqrt{25x^2} = |-3|$. (b) $\sqrt{x^2-4x+4} = \sqrt{x^2+4x+4}$.

32 ([BBN23], 1.10., p. 12). Tìm GTLN của biểu thức: (a) $A = \sqrt{7-2x^2}$. (b) $B = 7 + \sqrt{-4x^2+2x}$.

33 ([BBN23], 1.11., p. 13). Tìm GTNN của biểu thức: (a) $A = 2\sqrt{x^2+3x+5}$. (b) $B = \frac{3}{1+\sqrt{2x-x^2+8}}$.

34 ([BBN23], 1.12., p. 13). Cho $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$ thỏa $a+b+c+d=0$. Chứng minh $\sqrt{(ab-cd)(bc-ad)(ca-bd)} \in \mathbb{Q}$.

35 ([BBN23], 1.13., p. 13). Cho hình vẽ:



với $OA = AB = BC = CD = DE = EF = 1$ cm. (a) Tính độ dài 5 đoạn thẳng OB, OC, OD, OE, OF . (b) Vẽ đoạn thẳng có độ dài $\sqrt{10}$ cm. (c) Nêu cách vẽ đoạn thẳng có độ dài \sqrt{n} cm với $n \in \mathbb{N}$ bằng thước thẳng & compa.

36 ([BBN23], 1.14., p. 13). Tìm $n \in \mathbb{N}$ sao cho $\sqrt{4n+1} \in \mathbb{N}$.

37 ([BBN23], 1.15., p. 13). Cho $A = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}}$ gồm 2015 dấu căn bậc 2. Chứng minh $A \notin \mathbb{N}$.

38 ([BBN23], p. 14). Chứng minh đồng nhất thức: $\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)^2 = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} + \frac{2(a+b+c)}{abc}$, $\forall a, b, c \in \mathbb{R}^*$.

39 ([BBN23], p. 14). Chứng minh: $\sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}} = \left|\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right|$, $\forall a, b, c \in \mathbb{R}^*$ sao cho $a+b+c=0$.

40 ([BBN23], p. 14). Chứng minh: $\sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{(a+b)^2}} = \left|\frac{1}{a} + \frac{1}{b} - \frac{1}{a+b}\right|$, $\forall a, b \in \mathbb{R}^*, a \neq -b$.

41 ([BBN23], p. 14). Chứng minh: $\sqrt{a^2 + \frac{1}{b^2} + \frac{a^2}{(ab+1)^2}} = \left|a + \frac{1}{b} - \frac{a}{ab+1}\right|$, $\forall a, b \in \mathbb{R}, b \neq 0, ab \neq -1$.

42 ([BBN23], p. 14). Chứng minh: $\sqrt{a^2 + b^2 + \frac{a^2b^2}{(a+b)^2}} = \left|a + b - \frac{ab}{a+b}\right|$, $\forall a, b \in \mathbb{R}, a \neq -b$.

43 ([BBN23], 1., p. 14). Chứng minh với $a, b, c \in \mathbb{R}$ đôi một khác nhau: $\sqrt{\frac{1}{(a-b)^2} + \frac{1}{(b-c)^2} + \frac{1}{(c-a)^2}} = \left|\frac{1}{a-b} + \frac{1}{b-c} + \frac{1}{c-a}\right|$.

44 ([BBN23], 2., p. 15). Đơn giản biểu thức $A = \sqrt{\frac{1}{a^2 + b^2} + \frac{1}{(a+b)^2} + \frac{1}{a^4} + \frac{1}{b^4} + \frac{1}{(a^2 + b^2)^2}}$, $\forall a, b \in \mathbb{R}^*$, $a \neq -b$.

45 ([BBN23], 3., p. 15). Tính $A = \sqrt{1 + 2015^2 + \frac{2015^2}{2016^2}} + \frac{2015}{2016}$.

46 ([BBN23], 4., p. 15). Tính $A = \sqrt{0.43^2 + 0.57^2 + 0.43^2 \cdot 0.57^2}$.

47. Tính $A = \sqrt{x^2 + (1-x)^2 + x^2 \cdot (1-x)^2}$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

48 ([BBN23], p. 15). (a) Tính $A = \sum_{i=2}^{2015} \sqrt{1 + \frac{1}{i^2} + \frac{1}{(i+1)^2}} = \sqrt{1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2}} + \dots + \sqrt{1 + \frac{1}{2015^2} + \frac{1}{2016^2}}$.

(b) Tính $A_n = \sum_{i=2}^n \sqrt{1 + \frac{1}{i^2} + \frac{1}{(i+1)^2}} = \sqrt{1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2}} + \dots + \sqrt{1 + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2}}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

49 ([BBN23], p. 15). (a) Tính $A = \sqrt{1 + \underbrace{99\dots9}_{2015}^2 + 0.\underbrace{99\dots9}_{2015}}$. (b) Tính $A_n = \sqrt{1 + \underbrace{99\dots9}_n^2 + 0.\underbrace{99\dots9}_n}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

50 ([Bin23], Ví dụ 5, p. 7). Cho biểu thức $A = \sqrt{x - \sqrt{x^2 - 4x + 4}}$. (a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức A . (b) Rút gọn biểu thức A .

51 ([Bin23], Ví dụ 6, p. 8). Tìm điều kiện xác định của các biểu thức: (a) $A = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 2x - 1}}$. (b) $B = \frac{1}{\sqrt{x - \sqrt{2x + 1}}}$.

52 ([Bin23], Ví dụ 7, p. 8). Tìm các giá trị của x sao cho $\sqrt{x+1} < x+3$.

53 ([Bin23], 7., p. 9). Tìm điều kiện xác định của các biểu thức: (a) $3 - \sqrt{1 - 16x^2}$. (b) $\frac{1}{1 - \sqrt{x^2 - 3}}$. (c) $\sqrt{8x - x^2 - 15}$. (d) $\frac{2}{\sqrt{x^2 - x + 1}}$. (e) $A = \frac{1}{\sqrt{x - \sqrt{2x - 1}}}$. (f) $B = \frac{\sqrt{16 - x^2}}{\sqrt{2x + 1}} + \sqrt{x^2 - 8x + 14}$.

54 ([Bin23], 8., p. 9). Cho biểu thức $A = \sqrt{x^2 - 6x + 9} - \sqrt{x^2 + 6x + 9}$. (a) Rút gọn biểu thức A . (b) Tìm các giá trị của x để $A = 1$.

55 ([Bin23], 9., p. 9). Tìm các giá trị của x sao cho: (a) $\sqrt{x^2 - 3} \leq x^2 - 3$. (b) $\sqrt{x^2 - 6x + 9} > x - 6$.

56 ([Bin23], 10., p. 9). Cho $a + b + c = 0$ & $abc \neq 0$. Chứng minh hằng đẳng thức: $\sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}} = \left| \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right|$.

3 Liên Hệ Giữa Phép Nhân, Phép Chia & Phép Khai Phương

57 ([BBN23], p. 16). Với A, B là 2 biểu thức đại số. Khi nào thì: $\sqrt{A+B} = \sqrt{A} + \sqrt{B}$. (b) $\sqrt{A-B} = \sqrt{A} - \sqrt{B}$?

58 ([BBN23], Ví dụ 1, p. 17). Tính: (a) $\sqrt{12.5 \cdot 10 \cdot 4500}$. (b) $\sqrt{685^2 - 684^2}$. (c) $\sqrt{\frac{27}{13}} : \sqrt{14\frac{10}{13}}$. (d) $\left(\sqrt{9 - \sqrt{17}} + \sqrt{9 + \sqrt{17}} \right)^2$.

59 ([BBN23], Ví dụ 2, p. 18). Tìm $x \in \mathbb{R}$ thỏa: (a) $\sqrt{8x} \cdot \sqrt{2} = 10$. (b) $\sqrt{x^2 - 9} - \sqrt{x+3} = 0$. (c) $\frac{\sqrt{9x^2 - 25}}{\sqrt{3x - 5}} = 4$.

60 ([BBN23], Ví dụ 3, p. 18). 2 bạn Việt & Nam cùng giải bài toán tìm $x \in \mathbb{R}$: $\frac{\sqrt{2x-5}}{\sqrt{x-2}} = 2$. Việt làm như sau: $\frac{\sqrt{2x-5}}{\sqrt{x-2}} = 2 \Leftrightarrow \sqrt{\frac{2x-5}{x-2}} = 2 \Leftrightarrow \frac{2x-5}{x-2} = 4 \Leftrightarrow 2x-5 = 4x-8 \Leftrightarrow 2x = 3 \Leftrightarrow x = 1.5$. Nam làm như sau: Điều kiện $2x-5 \geq 0$ & $x-2 > 0$, suy ra $x \geq 2.5$. Rồi cũng giải để tìm ra $x = 1.5$ như Việt. Đối chiếu với điều kiện $x \geq 2.5$, Nam kết luận phương trình vô nghiệm. Ai đúng ai sai? Giải thích.

61 ([BBN23], Ví dụ 4, p. 19). Rút gọn $(a+b)\sqrt{\frac{ab}{(a+b)^2}}$, $\forall a, b \in \mathbb{R}$, $a < 0$, $b < 0$.

62 ([BBN23], Ví dụ 5, p. 19). Rút gọn $A = \sqrt{2 + \sqrt{3}} \cdot \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{3}}} \cdot \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{3}}}} \cdot \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{3}}}}$.

63 ([BBN23], Ví dụ 6, p. 19). Tính giá trị của biểu thức $A = \frac{x + 4 + 2\sqrt{16 - x^2}}{8 - 2x + \sqrt{16 - x^2}}$ tại $x = \frac{8}{\sqrt{3} + \frac{1}{\sqrt{3}}}$.

64 ([BBN23], Ví dụ 7, p. 20). (a) Cho $a \geq b \geq 0$. Chứng minh: $\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}$, $\sqrt{a-b} \leq \sqrt{a} - \sqrt{b}$. (b) Áp dụng: Tìm GTNN của $A = \sqrt{x-5} + \sqrt{7-x}$ & GTLN của $B = \sqrt{2x-7} - \sqrt{2x-11}$.

Lưu ý 2. Khi chứng minh bất đẳng thức chứa căn thức ta thường bình phương 2 vế & sử dụng tính chất: Với $A \geq 0, B \geq 0$, $A^2 > B^2 \Rightarrow A > B$, $A^2 \geq B^2 \Rightarrow A \geq B$.

65 ([BBN23], 2.1., p. 20). Tính đường kính của 1 mặt ghế hình tròn, biết diện tích của nó bằng diện tích hình vuông có cạnh là 2.6 dm.

66 ([BBN23], 2.2., p. 20). Rút gọn $\left(\sqrt{xy} - 2\sqrt{\frac{y}{x}}\right)\sqrt{xy}$, $\forall x, y \in \mathbb{R}, x < 0, y < 0$.

67 ([BBN23], 2.3., p. 20). Tìm $x \in \mathbb{R}$ thỏa $\sqrt{4x^2 - 25} = \sqrt{4x + 10}$.

68 ([BBN23], 2.4., p. 20). Tính: (a) $\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}\right) : \left(\frac{4}{15}\sqrt{\frac{1}{8}}\right)$. (b) $\sqrt{27(1 - \sqrt{3})^2} : 3\sqrt{75}$.

69 ([BBN23], 2.5., p. 21). So sánh: (a) $x = \sqrt{16} + \sqrt{28}$, $y = \sqrt{14} + \sqrt{30}$. (b) $x = \frac{\sqrt{319^2 - 306^2}}{\sqrt{67^2 - 54^2}}$, $y = \sqrt{23 - 8\sqrt{7}}(4 + \sqrt{7}) : (3\sqrt{3})$.

70 ([BBN23], 2.6., p. 21). Tính: $A = \sqrt{2 + \sqrt{2}} \cdot \sqrt{3 + \sqrt{7 + \sqrt{2}}} \cdot \sqrt{3 + \sqrt{6 + \sqrt{7 + \sqrt{2}}}} \cdot \sqrt{3 - \sqrt{6 + \sqrt{7 + \sqrt{2}}}}$.

71 ([BBN23], 2.7., p. 21). Cho 6 số thực dương $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$ thỏa mãn điều kiện $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$. Chứng minh:

$$\sqrt{(a_1 + b_1 + c_1)(a_2 + b_2 + c_2)} = \sqrt{a_1 a_2} + \sqrt{b_1 b_2} + \sqrt{c_1 c_2}.$$

72 ([BBN23], 2.8., p. 21). Tìm GTLN: (a) $A = \sqrt{3x - 5} - \sqrt{3x - 10}$. (b) $B = \sqrt{4x + 1} - \sqrt{16x - 12}$.

73 ([BBN23], 2.9., p. 21). Chứng minh: nếu 3 đoạn thẳng có độ dài $a, b, c \in \mathbb{R}$ lập thành 1 tam giác thì 3 đoạn thẳng có độ dài $\sqrt{a}, \sqrt{b}, \sqrt{c}$ cũng lập thành 1 tam giác.


74 ([BBN23], 2.10., p. 21). Cho $x = \sqrt{4 + \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}} + \sqrt{4 - \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}}$. (a) Chứng minh $x^2 - 2x = 4$. (b) Tính giá trị của biểu thức $f(x) = \frac{x^4 - 4x^3 - x^2 + 10x + 4}{x^3 - 3x + 5}$.

75 ([BBN23], p. 21, Vận tốc của máy thăm dò vũ trụ). Vận tốc tối thiểu của máy thăm dò vũ trụ để thắng sức hút của Trái Đất là $v = 1.15 \cdot 10^{-5} \sqrt{\frac{m}{r}}$, trong đó m là khối lượng của Trái Đất tính theo kg, r là bán kính Trái Đất tính theo m, v là vận tốc máy thăm dò tính theo m/s. Biết $m \approx 5.98 \cdot 10^{24}$ kg, $r \approx 6.38 \cdot 10^6$ m. Tính vận tốc tối thiểu của máy thăm dò vũ trụ.

Định nghĩa 1 (Trung bình cộng, trung bình nhân, trung bình điều hòa). Cho $a, b \in \mathbb{R}, a, b > 0$. $m := \frac{a+b}{2}$ được gọi là trung bình cộng của a, b . $n := \sqrt{ab}$ được gọi là trung bình nhân của a, b . $p := \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$ được gọi là trung bình điều hòa của a, b .

76 ([BBN23], p. 22). Cho $a, b \in \mathbb{R}, a, b > 0$. Gọi m, n, p lần lượt là trung bình cộng, trung bình nhân, trung bình điều hòa của a, b . Chứng minh $p \leq n \leq m$. Đẳng thức xảy ra khi nào?

77 ([BBN23], p. 22). Vẽ $\triangle ABC$ vuông tại A, đường cao AH, trung tuyến AM sao cho $BH = a, CH = b$. Hạ $HD \perp AM$ tại D. Chứng minh $AD \leq AH \leq AO$. Từ đó suy ra bất đẳng thức $p \leq n \leq m$ với m, n, p lần lượt là trung bình cộng, trung bình nhân, trung bình điều hòa của a, b .



Định nghĩa 2 (Căn thức đồng dạng). 2 căn thức bậc 2 được gọi là đồng dạng nếu chúng có cùng biểu thức dưới dấu căn.

Ví dụ 1 ([BBN23], p. 22). (a) 3 biểu thức $\sqrt{7}, 2\sqrt{7}, -5\sqrt{7}$ được gọi là đồng dạng với nhau. (b) 3 biểu thức $\frac{1}{2}\sqrt{x}, 5\sqrt{x}, -\frac{4}{7}\sqrt{x}$, $x \in \mathbb{R}, x \geq 0$, được gọi là đồng dạng với nhau.

Muốn cộng trừ các căn thức bậc 2 ta thu gọn các căn thức đồng dạng.

78 ([BBN23], p. 23, Công thức căn phức tạp). Chứng minh:

$$\sqrt{a \pm \sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 - b}}{2}} \pm \sqrt{\frac{a - \sqrt{a^2 - b}}{2}}, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}, a, b > 0, a^2 \geq b. \quad (1)$$

Công thức (1) được gọi là công thức căn phức tạp. Nhờ công thức này, biểu thức $a \pm \sqrt{b}$ có thể dễ dàng viết được thành bình phương của 1 tổng hoặc hiệu, do đó tính được $a \pm \sqrt{b}$.

79 ([BBN23], p. 23). Tính: (a) $A = 2\sqrt{3 + \sqrt{5 - \sqrt{13 + \sqrt{48}}}}$. (b) $B = \sqrt{4 + \sqrt{5\sqrt{3} + 5\sqrt{48 - 10\sqrt{7} + 4\sqrt{2}}}}$.

4 Biến Đổi Đơn Giản Biểu Thức Chứa Căn Thức Bậc 2

[Thá+24, Chap. III, §3, pp. 61–71]: HD1. LT1. LT2. HD2. LT3. HD3. LT4. LT5. HD4. LT6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

80 ([BBN23], 1., p. 25). *Đưa thừa số ra ngoài dấu căn của biểu thức $\sqrt{25(-a)^{2b^3}}$ với $b \geq 0$.*

81 ([BBN23], 2., p. 25). *Đưa thừa số vào trong dấu căn của biểu thức $(1-x)\sqrt{\frac{x}{x-1}}$ với $x > 1$.*

82 ([BBN23], 3–4., p. 21). (a) *Khử mẫu của biểu thức $\sqrt{\frac{15}{24}}$.* (b) *Trục căn thức ở mẫu của biểu thức $\frac{2}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$.*

83 ([BBN23], 5., p. 25). Đ/S? (a) $-3\sqrt{\frac{1}{2}} = \sqrt{(-3)^2 \cdot \frac{1}{2}}$. (b) $\frac{3-\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}} = \sqrt{3}$. (c) $-4\sqrt{3} < -3\sqrt{4}$. (d) $\frac{\sqrt{7}+2}{\sqrt{7}-2} = \frac{9-4\sqrt{7}}{3}$.

84 ([BBN23], Ví dụ 1, p. 25). *Rút gọn biểu thức: (a) $A = \sqrt{12} + 3\sqrt{27} - 5\sqrt{48}$. (b) $B = 3\sqrt{a^2+2} - 3\sqrt{16a^2+32} + 4\sqrt{25a^2+50}$.*

85 ([BBN23], Ví dụ 2, p. 26). *Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: $5\sqrt{2}, \sqrt{39}, 3\sqrt{8}, 2\sqrt{15}$.*

86 ([BBN23], Ví dụ 3, p. 26). *Viết số nghịch đảo của mỗi số sau dưới dạng không chứa dấu căn ở mẫu: $4\sqrt{3}, 3\sqrt{5}+5\sqrt{3}, \frac{3+\sqrt{3}}{3\sqrt{2}}$.*

87 ([BBN23], p. 26). *Chứng minh: $\frac{A}{a\sqrt{b}+c\sqrt{d}} = \frac{A(a\sqrt{b}-c\sqrt{d})}{a^2b-c^2d}, \forall A, a, b, c, d \in \mathbb{R}, b, d \geq 0, a^2b \neq c^2d$.*

88 ([BBN23], Ví dụ 4, p. 27). *Tìm $x \in \mathbb{R}$ & viết kết quả không chứa dấu căn ở mẫu: (a) $4(5-x\sqrt{3})+6=10-x\sqrt{12}$. (b) $x\sqrt{2}+\sqrt{5}=\sqrt{3}(1+x)-\sqrt{20}$.*

89 ([BBN23], Ví dụ 5, p. 27). *Cho $x = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{\sqrt{3}-1}} - \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{\sqrt{3}+1}}$. Tính $B = (x^4 - 2x^3 - x^2 + 2x - 1)^{2015}$.*

Lưu ý 3. *Căn thức liên hợp của $\sqrt{\sqrt{a}+b} \pm c$ là $\sqrt{\sqrt{a}+b} \mp c$.*

90 ([BBN23], Ví dụ 6, p. 27). *Cho $A = \frac{x\sqrt{x}-1}{x-\sqrt{x}} - \frac{x\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}} + \frac{x+1}{\sqrt{x}}$. Tìm $x \in \mathbb{R}$ để $A = \frac{9}{2}$.*

91 ([BBN23], Ví dụ 7, p. 28). *Trục căn thức ở mẫu của biểu thức $\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{6}}$.*

Lưu ý 4. *Nếu mẫu số/mẫu thức là tổng/hiệu của n căn thức với $n \in \mathbb{N}^*, n \geq 3$, ta phải thực hiện nhân biểu thức căn liên hợp khoảng $n-1$ lần.*

92 ([BBN23], Ví dụ 8, p. 28). *Tính $A = \frac{3+\sqrt{5}}{2\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}} + \frac{3-\sqrt{5}}{2\sqrt{2}-\sqrt{3}-\sqrt{5}}$*

93 ([BBN23], 3.1., p. 29). *Sắp xếp theo thứ tự giảm dần: $3\sqrt{10}, 5\sqrt{3}, \frac{20}{\sqrt{5}}, 12\sqrt{\frac{2}{3}}$.*

94 ([BBN23], 3.2., p. 29). *Rút gọn: (a) $\frac{2}{2a-1}\sqrt{3a^2(4a^2-4a+1)}$ với $0 < a < \frac{1}{2}$. (b) $\left(a\sqrt{\frac{10}{a}} + \sqrt{\frac{2a}{5}} + \sqrt{10a}\right) : \sqrt{10a}$ với $a > 0$.*

95 ([BBN23], 3.3., p. 29). *Tìm $x \in \mathbb{R}$ thỏa: $\frac{2}{3}\sqrt{9x-27} + \sqrt{x-3} = 6 - \sqrt{4x-12}$.*

96 ([BBN23], 3.4., p. 29). *Cho $x = \frac{\sqrt{5}+\sqrt{8}}{\sqrt{5}-\sqrt{8}}$. Tính $x + \frac{1}{x}$.*

97 ([BBN23], 3.5., p. 29). *Biết bình phương của 1 số bằng 3 lần số đó cộng với 1. (a) Viết đẳng thức diễn tả mối quan hệ đó. (b) Chứng tỏ 2 số $\frac{3 \pm \sqrt{13}}{2}$ là 2 số thỏa mãn bài toán.*

98 ([BBN23], 3.6., p. 29). *Tính $A = \frac{4+\sqrt{7}}{3\sqrt{2}+\sqrt{4+\sqrt{7}}} + \frac{4-\sqrt{7}}{3\sqrt{2}-\sqrt{4-\sqrt{7}}}$.*

99 ([BBN23], 3.7., p. 29). *Cho $A = (4x^5 + 4x^4 - 5x^3 + 2x - 2)^{2016} + 2015$. Tính giá trị của A tại $x = \frac{-1-\sqrt{5}}{2}$.*

100 ([BBN23], 3.8., p. 29). *Viết số nghịch đảo của mỗi số sau dưới dạng không chứa dấu căn ở mẫu: (a) $\sqrt{13+4\sqrt{3}}$. (b) $\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5}$.*

101 ([BBN23], 3.9., p. 29). Rút gọn biểu thức $A = 2\sqrt{45\sqrt{3}} + 2\sqrt{20\sqrt{3}} - 3\sqrt{\sqrt{75}} - \sqrt{245\sqrt{3}}$.

102 ([BBN23], Ví dụ 1, p. 30). Tính tổng: (a) $S(2014) = \sum_{i=1}^{2014} \frac{1}{\sqrt{i} + \sqrt{i+1}} = \frac{1}{1 + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2014} + \sqrt{2015}}$.
(b) $S(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{i} + \sqrt{i+1}} = \frac{1}{1 + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}}, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

103 ([BBN23], p. 30). Tính $S(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2i-1} + \sqrt{2i+1}} = \frac{1}{1 + \sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{5}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2n-1} + \sqrt{2n+1}}$. Tính $S(1006)$.

104 ([BBN23], p. 30). Tính $S = \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{6}} + \frac{1}{\sqrt{6} + \sqrt{10}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2014} + \sqrt{2018}}$. Tìm công thức tổng quát.

105 ([BBN23], Ví dụ 2, p. 30). Tính tổng $S = \frac{1}{2\sqrt{1} + \sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{2015\sqrt{2014} + 2014\sqrt{2015}}$. Tìm công thức tổng quát.

106 ([BBN23], Ví dụ 3, p. 31). Chứng minh $S = \frac{1}{2\sqrt{1}} + \frac{1}{3\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{2016\sqrt{2015}} < 2$.

Lưu ý 5. Để tính tổng chứa căn thức có quy luật, ta thường biến đổi mỗi số hạng của tổng thành hiệu của 2 số có quy luật rồi giản ước liên tiếp chỉ còn lại số hạng đầu & số hạng cuối. Tương tự, để ước lượng tổng chứa căn thức có quy luật, ta thường làm trội/làm giảm mỗi số hạng của tổng bởi hiệu của 2 số có quy luật rồi giản ước liên tiếp chỉ còn lại số hạng đầu & số hạng cuối.

5 Rút Gọn Biểu Thức Có Chứa Căn Thức Bậc 2

[Thá+24, Chap. III, §4, pp. 67–66]: HD1. LT1. HD2. LT2. HD3. LT3. HD4. LT4. LT5. LT6. 1. 2. 3. 4. 5.

107 ([BBN23], 1., p. 33). Tìm ĐKXD của biểu thức $\frac{\sqrt{1-4x^2}}{1+2x}$.

108 ([BBN23], 2., p. 33). Rút gọn biểu thức $\sqrt{45(-x)^3y^4} : \sqrt{5(-x)y^2}$ với $x, y \in \mathbb{R}, x < 0, y \neq 0$.

109 ([BBN23], 3., p. 33). Tính $(\sqrt{27} - 2\sqrt{3})\sqrt{7} - \sqrt{7}$.

110 ([BBN23], 4., p. 33). Rút gọn biểu thức $\frac{x\sqrt{y} - y\sqrt{x}}{\sqrt{xy}} : \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{y}}$ với $x, y \in \mathbb{R}, x, y > 0$.

111 ([BBN23], Ví dụ 1, p. 33). Rút gọn biểu thức: (a) $\frac{(\sqrt{5}+1)^3}{\sqrt{125}+10}$. (b) $\frac{\sqrt{4+\sqrt{15}}}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}-1}$.

112 ([BBN23], Ví dụ 2, p. 34). Chứng minh đẳng thức: $\left(\frac{a\sqrt{a}-b\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} + \sqrt{ab}\right) \cdot \left(\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b}\right)^2 = 1, \forall a, b \in \mathbb{R}, a, b > 0, a \neq b$.

113 ([BBN23], Ví dụ 3, p. 34). Chứng minh biểu thức $A = \frac{-15\sqrt{a}+3}{a+2\sqrt{a}-3} + \frac{5\sqrt{a}-2}{\sqrt{a}-1} - \frac{5\sqrt{a}+3}{\sqrt{a}+3}$ với $a \in \mathbb{R}, a \geq 0, a \neq 1$, không phụ thuộc vào biến a .

114 ([BBN23], Ví dụ 4, p. 34). Cho biểu thức $A = \left(\frac{x\sqrt{x}-1}{x-\sqrt{x}} - \frac{x\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}}\right) + \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right) \left(\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}\right)$ với $x \in \mathbb{R}$. (a) Tìm ĐKXD rồi rút gọn biểu thức A . (b) Tìm giá trị của A khi $x = 7 - 2\sqrt{6}$. (c) Tìm giá trị của x để $A = \frac{62}{5}$. (d) Tìm GTNN của A .

Định lý 1 (Nguyên tắc Dirichlet). Nếu đem nhốt $n+1$ con chim bồ câu vào n chiếc lồng thì tồn tại 1 lồng nhốt ít nhất 2 con chim bồ câu.

115 ([BBN23], Ví dụ 5, p. 35). Cho tập hợp $= \{\sqrt{1}, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \dots, \sqrt{2015}\}$. Chứng minh trong 45 số khác nhau tùy ý được lấy từ tập A luôn tồn tại ít nhất 2 số có hiệu nhỏ hơn 1.

116 ([BBN23], 4.1., p. 36). Tính: (a) $\left(a\sqrt{\frac{6}{a}} + \sqrt{\frac{2a}{3}} + \sqrt{6a}\right) : \sqrt{6a}, \forall a \in \mathbb{R}, a > 0$. (b) $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} - \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}, \forall a, b \in \mathbb{R}, a, b \geq 0, a \neq b$.

117 ([BBN23], 4.2., p. 36). Chứng minh đẳng thức: (a) $\sqrt{23+8\sqrt{7}} - \sqrt{7} = 4$. (b) $\left(\frac{\sqrt{14}-\sqrt{7}}{1-\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{15}-\sqrt{5}}{1-\sqrt{3}}\right) : \frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{5}} = -2$.

118 ([BBN23], 4.3., p. 36). Cho hình vuông có độ dài cạnh bằng 1. Chứng minh độ dài đường chéo của nó bằng $m = \frac{2 + \sqrt{3}}{\sqrt{2} + \sqrt{2 + \sqrt{3}}} + \frac{2 - \sqrt{3}}{\sqrt{2} - \sqrt{2 - \sqrt{3}}}$.

119 ([BBN23], 4.4., p. 36). Cho tam giác đều có độ dài cạnh bằng 1. Chứng minh độ dài đường cao của nó bằng $h = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}} + \sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2\sqrt{2}}$.

120 ([BBN23], 4.5., p. 36). Cho biểu thức $A = \left(\frac{\sqrt{a} + 3}{\sqrt{a} + 2} + \frac{4a\sqrt{a} + 3a + 9}{a - \sqrt{a} - 6} \right) : \left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a} + 3} + \frac{2\sqrt{a} + 3}{a + 5\sqrt{a} + 6} \right)$. (a) Tìm ĐKXD rồi rút gọn A. (b) Tìm $a \in \mathbb{R}$ để $A = 48$.

121 ([BBN23], 4.6., p. 36). Cho biểu thức $A = \frac{x\sqrt{x} - 4x - \sqrt{x} + 4}{2x\sqrt{x} - 14x + 28\sqrt{x} - 16}$. (a) Tìm x để A có nghĩa. (b) Rút gọn A. (c) Tìm tất cả $x \in \mathbb{N}$ sao cho A nhận giá trị nguyên.

122 ([BBN23], 4.7., p. 36). Số Fibonacci là số có dạng $F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$, $\forall n \in \mathbb{N}$. (a) Tính F_0, F_1, F_2, F_3 . (b) Chứng minh công thức truy hồi $F_{n+2} = F_n + F_{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

123 ([BBN23], 4.8., p. 36). Tìm $n \in \mathbb{N}$ nhỏ nhất sao cho: (a) $S(n) = \frac{1}{1 + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} \geq 2015$. (b) $S(n) \geq a$ với $a \in \mathbb{R}$ cho trước.

124 ([BBN23], 4.9., p. 36, Trò chơi toán học). Trên bảng viết 4 số $\sqrt{3} + 1, \sqrt{3} - 1, \sqrt{3}, \frac{1}{\sqrt{3}}$. Ta thực hiện trò chơi như sau: Mỗi lần chơi, ta xóa 2 số nào đó trong 4 số trên (giả sử là a, b) rồi thay vào 2 số mới $\frac{a+b}{\sqrt{2}}$ và $\frac{|a-b|}{\sqrt{2}}$ đồng thời giữa nguyên 2 số còn lại. Như vậy sau mỗi lần chơi trên bảng vẫn luôn có 4 số. Hỏi có bao giờ trên bảng có ghi 4 số $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}, \sqrt{3} + \sqrt{2}, \sqrt{3} - \sqrt{2}, 3$ không?

125 ([BBN23], p. 36). Công thức của Heron để khai phương 1 số mà không dùng bảng số hoặc máy tính: $\sqrt{a^2 + b} \approx a + \frac{b}{2a}$. (a) Tìm điều kiện của a, b $\in \mathbb{R}$ để công thức này có nghĩa. (b) Tính sai số của công thức khai phương xấp xỉ của Heron. (c) Áp dụng công thức của Heron để xấp xỉ $\sqrt{85}, \sqrt{154}, \sqrt{99}, \sqrt{2015}$.

6 Phương Trình Vô Tỷ

Định nghĩa 3 (Phương trình vô tỷ). Phương trình vô tỷ là phương trình đại số chứa ẩn số trong biểu thức dưới dấu căn.

2 dạng cơ bản của phương trình vô tỷ:

$$\sqrt{f(x)} = g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) \geq 0, \\ f(x) = g^2(x), \end{cases} \quad \sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)} \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0, \\ f(x) = g(x), \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) \geq 0, \\ f(x) = g(x). \end{cases}$$

Phương trình vô tỷ có nhiều cách giải, e.g., phương pháp nâng lên lũy thừa, phương pháp vận dụng căn liên hợp, phương pháp đưa về phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, phương pháp sử dụng bất đẳng thức hoặc đánh giá 2 vế của phương trình.

126 ([BBN23], Ví dụ 1, p. 38). Giải phương trình $\sqrt{x+7} - 1 = x$.

127 ([BBN23], Ví dụ 2, p. 38). Giải phương trình $\sqrt{x+1} + \sqrt{2x+3} = \sqrt{3x} + \sqrt{2x-2}$.

128 ([BBN23], Ví dụ 3, p. 38). Giải phương trình $\sqrt{6x+5} + x = \sqrt{3x+11} + 2$.

129 ([BBN23], Ví dụ 4, p. 39). Giải phương trình $\sqrt{x+2\sqrt{x-1}} + \sqrt{x-2\sqrt{x-1}} = 2$.

130 ([BBN23], Ví dụ 5, p. 39). Giải phương trình $\sqrt{2x-3} + \sqrt{5-2x} = 3x^2 - 12x + 14$.

131 ([BBN23], p. 39). Giải phương trình $\sqrt{x-4} + \sqrt{6-x} = x^2 - 10x + 27$.

132 ([BBN23], p. 39). Giải phương trình $x + y + z - 2\sqrt{x} - 2\sqrt{y+1} - 2\sqrt{z-1} + 3 = 0$.

133 ([BBN23], p. 39). Giải phương trình $\sqrt{4x+7} + x = \sqrt{2x+1} - 3$.

134 ([BBN23], p. 39). Giải phương trình $\sqrt{x+2+3\sqrt{2x-5}} + \sqrt{x-2-3\sqrt{2x-5}} = 2\sqrt{2}$.

7 Cube Root – Căn Bậc 3

135 ([BBN23], 2., p. 41). Rút gọn biểu thức $\sqrt[3]{125} - \sqrt[3]{-27} - \sqrt[3]{512}$.

136 ([BBN23], 3., p. 41). Đưa thừa số vào trong dấu căn của biểu thức $(2-x)^3 \sqrt{\frac{x}{x-2}}$.

137 ([BBN23], 4., p. 41). Khử căn thức ở mẫu của $\sqrt[3]{\frac{5}{12}}$.

138 ([BBN23], 5., p. 41). Trục căn thức ở mẫu của $\frac{2}{1+\sqrt[3]{2}}$.

139 ([BBN23], Ví dụ 1, p. 41). Tính cạnh của hình lập phương, biết thể tích của nó bằng thể tích của hình hộp chữ nhật có 3 kích thước là 4.8 m, 3 m, 15 m.

140 ([BBN23], Ví dụ 2, p. 42). Tính: (a) $\sqrt[3]{\sqrt{10}+\sqrt{2}} \cdot \sqrt[3]{\sqrt{2}-\sqrt{10}}$. (b) $\frac{\sqrt[3]{-54}}{\sqrt[3]{16}}$. (c) $\sqrt[3]{128} + \sqrt[3]{-250} - 7\sqrt[3]{16}$. (d) $\sqrt[3]{8x^8y^5} - 4xy\sqrt[3]{x^5y^2}$.

141 ([BBN23], Ví dụ 3, p. 42). So sánh: (a) $5\sqrt[3]{6}$ & $6\sqrt[3]{5}$. (b) $\sqrt[3]{-7} : \sqrt[3]{49}$ & -8 .

142 ([BBN23], Ví dụ 4, p. 43). Tìm $x \in \mathbb{R}$ thỏa: (a) $\sqrt[3]{2x+1} = 5$. (b) $\sqrt[3]{x+1} - 1 = x$.

143 ([BBN23], Ví dụ 5, p. 43). Cho $A = \sqrt[3]{20+14\sqrt{2}} + \sqrt[3]{20-14\sqrt{2}}$. Tính giá trị của biểu thức $A^3 - 6A$.

144 ([BBN23], Ví dụ 6, p. 43). Cho biểu thức $A = \frac{8-x}{2+\sqrt[3]{x}} : \left(2 + \frac{\sqrt[3]{x^2}}{2+\sqrt[3]{x}}\right) + \left(\sqrt[3]{x} + \frac{2\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x}-2}\right) \cdot \frac{\sqrt[3]{x^2}-4}{\sqrt[3]{x^2}+2\sqrt[3]{x}}$. (a) Tìm ĐKXD. (b) Chứng minh giá trị của B không phụ thuộc vào x.

145 ([BBN23], 5.1., p. 44). Tính: (a) $(\sqrt[3]{9} + \sqrt[3]{6} + \sqrt[3]{4})(\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{2})$. (b) $\sqrt[3]{38+17\sqrt{5}}$. (c) $\sqrt{\sqrt[3]{729}}$.

146 ([BBN23], 5.2., p. 44). So sánh: (a) 5 & $\sqrt[3]{130}$. (b) $\sqrt{122-22\sqrt{2}} + \sqrt[3]{77\sqrt{2}-155}$ & 6.

147 ([BBN23], 5.3., p. 44). Tìm $x \in \mathbb{R}$ thỏa: (a) $\sqrt[3]{x+1} = -5$. (b) $\sqrt[3]{x+3} - x = 3$.

148 ([BBN23], 5.4., p. 44). Trục căn thức ở mẫu: (a) $\frac{1}{\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{3}}$. (b) $\frac{1}{\sqrt[3]{9}+\sqrt[3]{6}+\sqrt[3]{4}}$.

149 ([BBN23], 5.5., p. 44). Cho $a = \sqrt[3]{7+5\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt[3]{7+5\sqrt{2}}}$. Tính $a^3 + 3a$.

150 ([BBN23], 5.6., p. 44). Chứng minh $b = \sqrt[3]{1+\frac{\sqrt{84}}{9}} + \sqrt[3]{1-\frac{\sqrt{84}}{9}}$ là 1 số nguyên.

151 ([BBN23], 5.7., p. 44). Cho $ax^3 = by^3 = cz^3$ & $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1$. Chứng minh $\sqrt[3]{ax^2+by^2+cz^2} = \sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b} + \sqrt[3]{c}$.

152 ([BBN23], 5.8., p. 44). Cho $x = \frac{2}{2\sqrt[3]{2}+2+\sqrt[3]{4}}$ & $y = \frac{6}{2\sqrt[3]{2}-2+\sqrt[3]{4}}$. Tính giá trị của $T = xy^3 - x^3y$.

8 nth Root – Căn Bậc n

153 ([BBN23], Ví dụ 1, p. 46). So sánh $3\sqrt[4]{3}$ & $4\sqrt{2}$.

154 ([BBN23], Ví dụ 2, p. 46). Chứng minh $\sqrt[4]{\frac{3+2\sqrt[4]{5}}{3-2\sqrt[4]{5}}} = \frac{\sqrt[4]{5}+1}{\sqrt[4]{5}-1}$.

9 Miscellaneous

[Thá+24, BTCCIII, pp. 72–73]: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Tài liệu

- [BBN23] Vũ Hữu Bình, Nguyễn Xuân Bình, and Phạm Thị Bạch Ngọc. *Bồi Dưỡng Toán 9 Tập 1*. Tái bản lần thứ 7. Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, 2023, p. 176.
- [Bìn23] Vũ Hữu Bình. *Nâng Cao & Phát Triển Toán 9 Tập 1*. Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, 2023, p. 275.
- [Thá+23] Đỗ Đức Thái, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, and Phạm Đức Quang. *Toán 7 Tập 1*. Tái bản lần thứ 1. Cánh Diều. Nhà Xuất Bản Đại Học Sư Phạm, 2023, p. 111.
- [Thá+24] Đỗ Đức Thái, Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, and Phạm Đức Quang. *Toán 9 Cánh Diều Tập 1*. Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, 2024, p. 127.