

# Problem: 1st-Order Function – Bài Tập: Hàm Số Bậc Nhất $y = ax + b$ , $a \neq 0$

Nguyễn Quân Bá Hồng\*

Ngày 2 tháng 10 năm 2023

## Mục lục

1	Khái Niệm Hàm Số	1
2	1st-Order Function & Its Graph – Hàm Số Bậc Nhất & Đồ Thị Của Nó	2
3	Đường Thẳng Song Song & Đường Thẳng Cắt Nhau. Hệ Số Góc Của Đường Thẳng $y = ax + b$ , $a \neq 0$	4
4	Miscellaneous	5
	Tài liệu	5


## 1 Khái Niệm Hàm Số

- 1 ([BBN23], H3, p. 49). Tìm  $a \in \mathbb{R}$  để điểm  $A(-1, 3)$  thuộc đồ thị hàm số  $y = ax^2$ .
- 2 ([BBN23], H4, p. 49). Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định trên  $\mathbb{R}$ . (a) Nếu giá trị của biến  $x$  tăng lên mà giá trị tương ứng  $f(x)$  cũng tăng lên thì hàm số  $y = f(x)$  được gọi là ... trên  $\mathbb{R}$ . (b) Nếu giá trị của biến  $x$  tăng lên mà giá trị tương ứng  $f(x)$  ... thì hàm số  $y = f(x)$  được gọi là nghịch biến trên  $\mathbb{R}$ .
- 3 ([BBN23], H5, p. 49). (a) Tìm TXĐ của hàm số  $y = \frac{1}{\sqrt{2-x}}$ . (b) Tìm TXĐ của hàm số  $y = \frac{2x+1}{x^2-3x+2}$ .
- 4 ([BBN23], VD1, p. 49). Ở bưu điện, giá tiền cước gửi thư trong nước được niêm yết như sau (chưa tính VAT):

Nặng khối lượng (g)	Mức cước (đồng)
Đến 20 g	2000
Trên 20 g đến 100 g	3000
Trên 100 g đến 250 g	4500
Mỗi 250 g tiếp theo đến 2000 g	2000

- Nếu gọi khối lượng lá thư là  $x$  g, số tiền cước phải trả là  $y$  đồng. (a)  $y$  có là hàm số của  $x$  không? Vì sao? (b) Tìm TXĐ của hàm số  $y$ . (c) 1 lá thư nặng 300 g cần phải trả tiền cước là bao nhiêu? (d) Hỏi  $x$  có là hàm số của  $y$  không? Vì sao?
- 5 ([BBN23], VD2, p. 50). 1 ô tô có bình chứa xăng đựng được 40 L xăng. Cứ chạy 100 km thì ô tô tiêu thụ hết 8 L xăng. (a) Khi ô tô chạy  $x$  km thì số L xăng  $y$  tiêu thụ là bao nhiêu? (b) Hỏi  $y$  có là 1 hàm số của  $x$  không? (c) Hỏi  $x$  có là 1 hàm số của  $y$  không? (d) Khi ô tô chạy được 200 km thì số L xăng còn lại trong bình là bao nhiêu nếu lúc đầu bình đầy?
- 6 ([BBN23], VD3, p. 51). Vẽ trên mặt phẳng tọa độ Oxy các điểm  $A(0, 5)$ ,  $B(4, 5)$ ,  $C(4, 0)$ ,  $M(x, 0)$  với  $x > 4$ ,  $N(0, 2)$ . (a) Tính diện tích  $S$  của tứ giác  $OABC$ . (b) Tính diện tích  $P$  của  $\triangle BMN$  theo  $x$ . Chứng minh  $P$  là hàm số của  $x$ . (c) Tìm TXĐ của  $P$ . Hàm số  $P$  đồng biến hay nghịch biến trên TXĐ của nó? (d) Với giá trị nào của  $x$  thì  $S = P$ ?
- 7 ([BBN23], VD4, p. 51). Cho hình chữ nhật  $ABCD$  với  $AB = 36$ ,  $BC = 15$ . Trên cạnh  $AB$  lấy điểm  $M$ . Gọi  $AM = x$ ,  $0 < x < 36$ . Qua  $M$  kẻ  $MN \parallel BD$  với  $N \in AD$ . Qua  $M$  kẻ  $MP \parallel AC$  với  $P \in BC$ . (a) Chứng minh độ dài  $MN$ ,  $MP$  là 2 hàm số của  $x$ . (b) Trên cạnh  $CD$  lấy điểm  $Q$  sao cho  $DQ = 36 - x$ . Chứng minh chu vi tứ giác  $MNQP$  là 1 hàm hằng.
- 8 ([BBN23], VD5, p. 52). Đồ thị hàm số  $y = f(x)$  trên mặt phẳng tọa độ:  $A(-3, 3)$ ,  $B(-1, -3)$ ,  $C(2, -3)$ ,  $D(4, 0)$ .

\*Independent Researcher, Ben Tre City, Vietnam  
e-mail: [nguyenquanbahong@gmail.com](mailto:nguyenquanbahong@gmail.com); website: <https://nqbh.github.io>.



(a) Tìm TXĐ của hàm số  $y$ . (b) Tính  $f(-3), f(-1), f(1), f(2), f(3), f(4)$ . (c) Hàm số  $y = f(x)$  đồng biến & nghịch biến trong khoảng nào? (d) Đ/S? Khi xét  $x_1 = 2, f(x_1) = f(2) = -3, x_2 = -3, f(x_2) = f(-3) = 3$ , ta thấy  $x_2 < x_1, f(x_2) > f(x_1)$  nên hàm số nghịch biến trong khoảng  $[-3, 2]$ .

9 ([BBN23], 6.1., p. 53). Bảng sau ghi các giá trị tương ứng của 2 đại lượng  $x, y$  phụ thuộc nhau.

$x$	1	2	3	4	5	1	6	7	8
$y$	0	2	-1	5	4	-4	3	-2	-6

(a)  $y$  có là hàm số của  $x$  không? (b)  $x$  có là hàm số của  $y$  không? (c) Trường hợp là hàm số, nêu TXĐ.

10 ([BBN23], 6.2., p. 53). Cho hàm số  $y = f(x) = 3x^2 + 1$ . (a) Tính  $f(-1), f(0), f(1)$ . (b) Tìm  $x$  để  $f(x) = 4$ . (c) Trong 3 điểm  $A(0, 1), B(2, 3), C(3, 4)$ , điểm nào không thuộc đồ thị hàm số đã cho?

11 ([BBN23], 6.3., p. 53). Bảng giá bán lẻ điện cho các hộ gia đình (chưa tính VAT) (theo QĐ số 2256/QĐ-BCT 12.3.2015 của Bộ Công thương):

Mức độ sử dụng của mỗi hộ trong tháng	Giá bán điện (đồng/kwh)
Bậc 1: cho kwh từ 0–50	1484
Bậc 2: cho kwh từ 51–100	1533
Bậc 3: cho kwh từ 101–200	1786
Bậc 4: cho kwh từ 201–300	2242
Bậc 5: cho kwh từ 301–400	2503
Bậc 6: cho kwh từ 401 trở lên	2587

Gọi số điện sử dụng của hộ gia đình là  $x$  kwh, số tiền phải trả là  $y$  đồng. (a)  $y$  có phải là hàm số của  $x$  không? (b) Nếu dùng hết 310 kwh điện thì phải trả bao nhiêu tiền?

12 ([BBN23], 6.4., p. 53). Chứng minh: (a) Hàm số  $y = 2x + 3$  đồng biến trên  $\mathbb{R}$ . (b) Hàm số  $y = -2x + 7$  nghịch biến trên  $\mathbb{R}$ .

13 ([BBN23], 6.5., p. 53). Cho  $\triangle ABC$  đều có độ dài cạnh bằng  $a$ . Lấy  $M \in AB$  sao cho  $AM = x$  với  $0 < x < a$ . Vẽ hình chữ nhật  $MNPQ$  với  $N \in AC, P, Q \in BC$ . (a) Chứng minh diện tích hình chữ nhật  $MNPQ$  là hàm số của  $x$ . (b) Xác định  $x$  để diện tích hình chữ nhật  $MNPQ$  lớn nhất.

14 ([BBN23], p. 53, Công thức Lorentz cho số cân nặng lý tưởng tương ứng với chiều cao). Cách đây hơn 1 thế kỷ, nhà khoa học người Hà Lan Hendrick Lorentz (1853–1928) đưa ra công thức tính số cân nặng lý tưởng của con người theo chiều cao:

$$M = T - 100 - \frac{T - 150}{N}$$

trong đó  $M$ : số cân nặng kg,  $T$ : chiều cao cm,  $N = 4$  với nam giới &  $N = 2$  với nữ giới. (a) Kiểm chứng công thức với cân nặng & chiều cao của bản thân. (b) Viết công thức tính số cân nặng lý tưởng của nam giới (ký hiệu là  $P_1$ ) & số cân nặng lý tưởng của nữ giới (ký hiệu là  $P_2$ ) theo chiều cao. (c) Vẽ đồ thị hàm  $M$  theo  $T$ . (d)  $P_1, P_2$  có phải là hàm số của  $T$  không? (e) Với  $T$  bằng bao nhiêu thì  $P_1 = P_2$ ?

## 2 1st-Order Function & Its Graph – Hàm Số Bậc Nhất & Đồ Thị Của Nó

15 ([BBN23], H1, p. 55).  $y$  là hàm số bậc nhất của  $x \Leftrightarrow$  A.  $y = ax + b, a, b \in \mathbb{R}$ . B.  $y = ax + b, a, b \in \mathbb{R}, ab \neq 0$ . C.  $y = ax + b, a, b \in \mathbb{R}, b \neq 0$ . D.  $y = ax + b, a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$ .

16 ([BBN23], H2, p. 55). Phân loại hàm số: (a)  $y = \sqrt{2}(x - 1)$ . (b)  $y = \sqrt{2x} - 1$ . (c)  $y = \frac{x^2}{x} + 4$ . (d)  $y = \frac{2}{x} + 1$ .

17 ([BBN23], H3, p. 56). Cho hàm số  $y = (m + 1)x + 3m$ . Khi đó: A.  $y$  là hàm số bậc nhất của biến  $x$ . B.  $y$  là hàm số bậc nhất của biến  $m$ . C.  $y$  là hàm số bậc nhất. D. Với  $m \neq -1$ ,  $y$  là hàm số bậc nhất của biến  $x$ .

- 18 ([BBN23], H4, p. 56). Tìm điều kiện của  $m$  để hàm số  $y = (3m - 6)x + 8$  đồng biến trên  $\mathbb{R}$ .
- 19 ([BBN23], H5, p. 56). Vẽ đồ thị hàm số  $y = -\frac{1}{2}x + 1$ .
- 20 ([BBN23], VD1, p. 56). Với các giá trị nào của  $m$  thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất? (a)  $y = \sqrt{4 - m}(x - 1)$ . (b)  $y = \frac{m + 2}{m - 2}x + 3.5 + x$ .
- 21 ([BBN23], VD2, p. 57). 1 hình chữ nhật có 2 kích thước là 10 cm, 15 cm. Bớt mỗi kích thước của hình chữ nhật đi  $x$  cm với  $0 < x < 10$ . Gọi chu vi của hình chữ nhật mới là  $y$  cm. (a) Lập công thức tính chu vi  $y$  của hình chữ nhật mới theo  $x$ . (b) Chứng minh  $y$  là hàm số bậc nhất của  $x$  & vẽ đồ thị hàm số đó.
- 22 ([BBN23], VD3, p. 57). (a) Vẽ đồ thị 2 hàm số  $y = x - 2$  &  $y = -x - 1$  trên cùng 1 mặt phẳng tọa độ. (a) 2 đường thẳng  $y = -x - 1$  &  $y = x - 2$  cắt nhau tại  $C$  & cắt trục  $Ox$  theo thứ tự  $A, B$ . Tìm tọa độ của 3 điểm  $A, B, C$ . (c) Chứng minh  $\triangle ABC$  vuông cân. (d) Tính chu vi & diện tích  $\triangle ABC$ .
- 23 ([BBN23], VD4, p. 58). Cho hàm số  $y = (2m + 1)x + m - 1$  với  $m \neq -\frac{1}{2}$ . (a) Xác định  $m$  trong mỗi trường hợp: (i) Đồ thị hàm số đi qua  $M(1, 1)$ . (ii) Đồ thị cắt trục tung, trục hoành lần lượt tại  $A, B$  sao cho  $\triangle OAB$  cân. (iii) Đồ thị cắt trục tung, trục hoành lần lượt tại  $A, B$  sao cho  $\triangle OAB$  có diện tích bằng  $\frac{1}{2}$ . (b) Tìm giá trị nguyên của  $m$  để đồ thị cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là số nguyên. (c) Tìm các điểm cố định mà đồ thị hàm số luôn đi qua với mọi giá trị của  $m$ .
- 24 ([BBN23], 7.1., p. 60). Cho 3 hàm số  $y = 2x + 1$ ,  $y = 4x$ ,  $y = -2x + 5$  theo thứ tự có đồ thị là 3 đường thẳng  $(d_1), (d_2), (d_3)$ . (a) Trong 3 hàm số này, hàm số nào đồng biến, hàm số nào nghịch biến? (b) Vẽ  $(d_1), (d_2), (d_3)$  trên cùng 1 mặt phẳng tọa độ. (c) Trong 4 điểm  $A(1, 3), B(0, 4), C(-1, -4), D(-2, 9)$  có điểm nào nằm trên  $(d_1)$  hoặc  $(d_2)$  hoặc  $(d_3)$  không?
- 25 ([BBN23], 7.2., p. 61). Lập công thức biểu thị  $y$  theo  $x$ . Cho biết công thức nào là hàm số bậc nhất (chỉ rõ  $a, b$ ). (a) Diện tích tam giác  $y \text{ cm}^2$  có đáy là  $x \text{ cm}$  & chiều cao tương ứng là 6 cm. (b) Chu vi hình thoi  $y \text{ cm}$  với cạnh là  $x \text{ cm}$ . (c) Chu vi đường tròn  $y \text{ cm}$  với bán kính là  $x \text{ cm}$ . (d) Diện tích hình tròn  $y \text{ cm}^2$  với bán kính là  $x \text{ cm}$ .
- 26 ([BBN23], 7.3., p. 61). Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$  cho 3 điểm  $A(2, -1), B(-1, -7), C(3, 1)$ . (a) Viết phương trình đường thẳng  $BC$ . (b) Chứng minh 3 điểm  $A, B, C$  thẳng hàng.
- 27 ([BBN23], 7.4., p. 61). Cho hàm số  $y = (m - 2)x + 3$ . (a) Với giá trị nào của  $m$  thì hàm số đồng biến, nghịch biến, hàm hằng? (b) Xác định giá trị của  $m$  để đồ thị hàm số đi qua điểm  $A(1, 4)$ . (c) Vẽ đồ thị hàm số ứng với giá trị của  $m$  tìm được ở (b).
- 28 ([BBN23], 7.5., p. 61). Cho 6 đường thẳng chứa 4 cạnh & 2 đường chéo của 1 hình chữ nhật có tâm trùng với gốc tọa độ. Tìm số đường thẳng là đồ thị của 1 hàm số bậc nhất?
- 29 ([BBN23], 7.6., p. 61). Lập phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm  $A, B$  với: (a)  $A(2, 3), B(2, 5)$ . (b)  $A(1, 4), B(-5, 4)$ . (c)  $A(2, 2), B(-4, 3)$ . Từ đó đưa ra công thức tổng quát phương trình đường thẳng đi qua  $A(x_1, y_1)$  &  $B(x_2, y_2)$ .
- 30 ([BBN23], 7.7., p. 61). Cho 3 đường thẳng  $(d_1) : y = 1 - x$ ,  $(d_2) : x - y = 3$ ,  $(d_3) : (m + 1)x + (m - 1)y = 1 + 2m$ . (a) Xác định  $m$  để 3 đường thẳng cùng đi qua 1 điểm. (b) Chứng minh khi  $m$  thay đổi, đường thẳng  $(d_3)$  luôn đi qua 1 điểm cố định.
- 31 ([BBN23], 7.8., p. 61). Cho hàm số  $y = (m^2 + m + 1)x + 6$  có đồ thị  $(d)$ . (a) Chứng minh:  $\forall m \in \mathbb{R}$ ,  $y$  luôn là hàm số bậc nhất đồng biến. (b) Tìm  $m$  để  $(d)$  cắt  $Ox$  tại  $A$ , cắt  $Oy$  tại  $B$  sao cho: (i) Diện tích  $\triangle AOB$  bằng 4. (ii) Diện tích  $\triangle AOB$  lớn nhất.
- 32 ([BBN23], p. 62, Mối quan hệ giữa độ F & độ C). Độ Fahrenheit (độ F hay  $^{\circ}\text{F}$ ) là thang nhiệt được đặt theo tên nhà Vật lý người Đức Gabriel Fahrenheit (1686–1736) – người đã đề xuất ra nó năm 1724. Theo đó, nước đóng băng ở  $32^{\circ}\text{F}$  & sôi ở  $212^{\circ}\text{F}$  (2 trạng thái này chênh lệch  $180^{\circ}\text{F}$ ). Độ Celsius (độ C hay  $^{\circ}\text{C}$ ) là thang nhiệt được đặt theo tên nhà thiên văn học người Thụy Điển Anders Celsius (1701–1744) – người đầu tiên đề nghị hệ thống đo nhiệt độ C năm 1742 & đến năm 1750, độ C còn được gọi là độ bách phân. Theo đó, nước đóng băng ở  $0^{\circ}\text{C}$  & sôi ở  $100^{\circ}\text{C}$ . Do đó, mỗi độ thuộc thang đo Celcius bằng  $\frac{212 - 32}{100 - 0} = \frac{180}{100} = \frac{9}{5}$  độ thuộc thang đo Fahrenheit. Ngày nay, đa số các nước sử dụng thang nhiệt độ là độ C, tuy nhiên 1 số nước, e.g., Mỹ, vẫn sử dụng nhiệt kế chia mức độ nhiệt độ theo độ F. Mối quan hệ giữa số đo độ F, ký hiệu là  $T_F$ , & số đo độ C, ký hiệu là  $T_C$ :  $T_F = 1.8T_C + 32$ . (a)  $T_F, T_C$  có là hàm số bậc nhất có nhau không. (b) Xét tính đồng biến, nghịch biến của 2 hàm số này.
- 33 ([BBN23], VD1, p. 63). Xét sự biến thiên & vẽ đồ thị hàm số  $y = |2x + 3|$ .
- 34 ([BBN23], VD2, p. 63). Cho hàm số  $y = |x - 1| + |x - 5|$ . (a) Vẽ đồ thị hàm số. (b) Xác định GTNN của hàm số.
- 35 ([BBN23], p. 64). Xét sự biến thiên & vẽ đồ thị hàm số: (a)  $y = |-3x + 1|$ . (b)  $y = |x + 1| + |2x - 3|$ .

### 3 Đường Thẳng Song Song & Đường Thẳng Cắt Nhau. Hệ Số Góc Của Đường Thẳng $y = ax + b, a \neq 0$

36 ([BBN23], H1, p. 66). Đồ thị hàm số  $y = (\sqrt{5} - 2)x + 3$  cắt đồ thị hàm số: A.  $y = \sqrt{5}x - 2x$ . B.  $y = (\sqrt{5} - 1)x + 4 - x$ . C.  $y = -2x + \sqrt{5}$ . D.  $y = -2x + \sqrt{5}x + 2$ .

37 ([BBN23], H2, p. 66). Cho 4 đường thẳng:  $(d_1) : y = 1 - 5x$ ,  $(d_2) : y = -5x + 2$ ,  $(d_3) : y = \frac{1}{5}x + \frac{1}{2}$ ,  $(d_4) : y = 3x + \frac{1}{3}$ . D/S?  
(a)  $(d_1) \perp (d_3)$ . (b)  $(d_1) \parallel (d_2)$ . (c)  $(d_1) \parallel (d_4)$ . (d)  $(d_2)$  cắt  $(d_4)$ .

38 ([BBN23], H3, p. 66). Tìm  $m$  để 2 đường thẳng  $(d_1) : y = m^2x - 5$  &  $(d_2) : y = 9x + 2m + 1$  song song với nhau.

39 ([BBN23], H4, p. 66). Tìm hệ số góc của đường thẳng  $5x + 2y = 3$ .

40 ([BBN23], VD1, p. 67). Cho 2 đường thẳng:  $(d_1) : y = (2m - 1)x + 2m - 3$ ,  $(d_2) : y = (m + 1)x + m$ . Xác định  $m$  để: (a)  $(d_1)$  cắt  $(d_2)$ . (b)  $(d_1) \parallel (d_2)$ . (c)  $(d_1) \perp (d_2)$ .

41 ([BBN23], VD2, p. 67). Cho 2 đường thẳng  $(d_1) : y = x - 7$ ,  $(d_2) : y = -2x - 1$ . Viết phương trình đường thẳng  $(d)$  đi qua giao điểm của  $(d_1)$  &  $(d_2)$  đồng thời song song với đường thẳng  $(d_3) : x - 2y + 1 = 0$ .

42 ([BBN23], VD3, p. 68). Cho hàm số  $y = (m - 1)x + m + 3$ ,  $m$ : tham số. Tìm giá trị của  $m$  để đồ thị hàm số tạo với trục  $Ox$  1 góc bằng: (a)  $60^\circ$ . (b)  $120^\circ$ . (c)  $\alpha^\circ$ .

43 ([BBN23], VD4, p. 68). Cho 2 đường thẳng  $(d_1) : y = 3x + 2$ ,  $(d_2) : y = (2m^2 + 1)x + m + 1$ . Xác định  $m$  để  $(d_1)$  song song với  $(d_2)$ . Khi đó xác định khoảng cách giữa chúng.

44 ([BBN23], VD5, p. 69). Cho  $\Delta ABC$  vuông tại  $A$ ,  $AB = 3$  cm,  $AC = 4$  cm. Trên cạnh  $BC$  lấy điểm  $M$  & ký hiệu  $BM = x$  cm,  $0 < x < 5$ . Gọi  $f(x)$  là diện tích của  $\Delta ABM$ ,  $g(x)$  là diện tích của  $\Delta ACM$ . (a) Chứng minh  $f(x), g(x)$  là 2 hàm số bậc nhất của  $x$ . (b) Vẽ đồ thị 2 hàm số trên cùng 1 mặt phẳng tọa độ. (c) Gọi  $I$  là giao điểm của 2 đồ thị. Xác định tọa độ điểm  $I$ . Hoành độ biết & tung độ của điểm  $I$  cho ta biết điều gì?

45 ([BBN23], VD6, p. 70). Trên mặt phẳng tọa độ  $Oxy$  cho 3 điểm  $A(-1, 1), B(0, 2), C(3, 1)$ . (a) Xác định tọa độ điểm  $D$  sao cho tứ giác  $ABCD$  là hình bình hành. (b) Chứng minh tứ giác  $ABCD$  là hình vuông.

46 ([BBN23], 8.1., p. 71). Nêu điều kiện để 3 đường thẳng  $(d_1) : y = a_1x + b_1$ ,  $(d_2) : y = a_2x + b_2$ ,  $(d_3) : y = a_3x + b_3$ . (a) Song song với nhau. (b) Đôi một cắt nhau. (c) Đồng quy tại 1 điểm.

47 ([BBN23], 8.2., p. 71). Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm  $A(2, -3)$  &: (a) Song song với đường thẳng  $(d_1) : y = 2x + 5$ . (b) Vuông góc với đường thẳng  $(d_2) : y = -\frac{1}{3}x + 7$ . (c) Đồng quy với 2 đường thẳng  $(d_3) : y = x - 1$  &  $(d_4) : y = 3x + 5$ .

48 ([BBN23], 8.3., p. 71). 2 đường thẳng  $(d) : 4mx + 3y = -2$  &  $(d') : 2my = nx - 2$  cắt nhau tại điểm  $M(1, -2)$ . Tìm hệ số góc của mỗi đường thẳng  $(d), (d')$ .

49 ([BBN23], 8.4., p. 71). (a) Viết phương trình đường thẳng  $(d)$  đi qua 2 điểm  $A(2, -1), B\left(\frac{1}{2}, 2\right)$ . (b) Chứng minh 3 điểm  $A, B, C(5, -7)$  thẳng hàng. (c) Với giá trị nào của  $m$  thì đồ thị của 2 hàm số  $y = mx + 5$ ,  $y = 3x - 7$ , & đường thẳng  $(d)$  đồng quy?

50 ([BBN23], 8.5., p. 71). (a) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm  $A(-3, 2)$  & song song với đường thẳng  $y = 3x - 5$ . (b) Tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng song song đó.

51 ([BBN23], 8.6., p. 71). Trên mặt phẳng tọa độ  $Oxy$  cho 3 điểm  $A(-3, 2), B(-1, -1), C(2, 0)$ . (a) Viết phương trình đường thẳng chứa 3 cạnh của  $\Delta ABC$ . (b) Viết phương trình đường cao  $AD, BE, CF$  của  $\Delta ABC$ . (c) Tìm tọa độ trực tâm  $H$  của  $\Delta ABC$ .

52 ([BBN23], 8.7., p. 71). Cho 2 hàm số bậc nhất với  $m$ : tham số,  $y = (m + 1)x + 2m - 1$ ,  $y = (2m - 3)x + 3m - 6$ . (a) Xác định giá trị của  $m$  để đồ thị của chúng: (i) Song song với nhau. (ii) Cắt nhau tại 1 điểm trên trục tung. (iii) Cắt nhau tại 1 điểm nằm ở bên phải tung. (b) Chứng minh khi  $m$  thay đổi thì đồ thị của mỗi hàm số trên đều đi qua 1 điểm cố định.

53 ([BBN23], 8.8., p. 71). Cho 3 đường thẳng  $(d_1) : y = 4x$ ,  $(d_2) : y = x + 3$ ,  $(d_3) : y = -x + 5$ . (a) Chứng minh  $(d_1), (d_2), (d_3)$  cắt nhau tại 1 điểm  $A$ . Xác định tọa độ điểm  $A$ . (b) Gọi  $B$  là giao điểm của  $(d_2)$  với trục hoành,  $C$  là giao điểm của  $(d_3)$  với trục hoành. Chứng minh  $\Delta ABC$  vuông cân.

54 ([BBN23], p. 72, Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cho trước). Cho 2 điểm  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ . Chứng minh: (a) Nếu  $x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2$  thì đường thẳng  $AB$  cắt 2 trục tọa độ & có phương trình  $\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$ . (b) Nếu  $x_1 = x_2, y_1 \neq y_2$  thì đường thẳng  $AB \perp Ox$ , cắt trục  $Ox$  tại điểm có hoành độ  $x_1$  & có phương trình  $x = x_1$  ( $= x_2$ ). (c) Nếu  $x_1 \neq x_2, y_1 = y_2$  thì đường thẳng  $AB \perp Oy$ , cắt trục  $Ox$  tại điểm có tung độ  $y_1$  & có phương trình  $y = y_1$  ( $= y_2$ ).

## 4 Miscellaneous

### Tài liệu

[BBN23] Vũ Hữu Bình, Nguyễn Xuân Bình, and Phạm Thị Bạch Ngọc. *Bồi Dưỡng Toán 9 Tập 1*. Tái bản lần thứ 7. Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, 2023, p. 176.