

# Some Topics in Elementary Mathematics/Grade 11

Nguyễn Quân Bá Hồng<sup>1</sup>

Ngày 3 tháng 8 năm 2022

<sup>1</sup>Independent Researcher, Ben Tre City, Vietnam  
e-mail: [nguyenquanbahong@gmail.com](mailto:nguyenquanbahong@gmail.com); website: <https://nqbh.github.io>.

# Mục lục

<b>I</b>	<b>Đại Số &amp; Giải Tích – Algebra &amp; Analysis</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Hàm Số Lượng Giác &amp; Phương Trình Lượng Giác – Trigonometric Function &amp; Trigonometric Equation</b>	<b>2</b>
1.1	Các Hàm Số Lượng Giác – Trigonometric Functions . . . . .	2
1.1.1	Các hàm số $y = \sin x$ & $y = \cos x$ . . . . .	2
1.1.1.1	Khái niệm . . . . .	2
1.1.1.2	Tính chất tuần hoàn của các hàm số $y = \sin x$ & $y = \cos x$ . . . . .	2
1.1.1.3	Sự biến thiên & đồ thị của hàm số $y = \sin x$ . . . . .	3
1.1.1.4	Sự biến thiên & đồ thị của hàm số $y = \cos x$ . . . . .	4
1.1.2	Các hàm số $y = \tan x$ & $y = \cot x$ . . . . .	4
1.1.2.1	Định nghĩa . . . . .	4
1.2	Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản . . . . .	4
1.3	1 Số Dạng Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản . . . . .	4
<b>2</b>	<b>Tổ Hợp &amp; Xác Suất</b>	<b>5</b>
2.1	2 Quy Tắc Đếm Cơ Bản . . . . .	5
2.2	Hoán Vị, Chỉnh Hợp & Tổ Hợp . . . . .	5
2.3	Nhị Thức Newton . . . . .	5
2.4	Biến Cố & Xác Suất của Biến Cố . . . . .	5
2.5	Các Quy Tắc Tính Xác Suất . . . . .	5
2.6	Biến Ngẫu Nhiên Rời Rạc . . . . .	5
<b>3</b>	<b>Dãy Số. Cấp Số Cộng &amp; Cấp Số Nhân</b>	<b>6</b>
3.1	Phương Pháp Quy Nạp Toán Học . . . . .	6
3.2	Dãy Số . . . . .	6
3.3	Cấp Số Cộng . . . . .	6
3.4	Cấp Số Nhân . . . . .	6
<b>4</b>	<b>Giới Hạn</b>	<b>7</b>
4.1	Dãy Số Có Giới Hạn 0 . . . . .	7
4.2	Dãy Số Có Giới Hạn Hữu Hạn . . . . .	7
4.3	Dãy Số Có Giới Hạn Vô Cực . . . . .	7
4.4	Định Nghĩa & 1 Số Định Lý về Giới Hạn của Hàm Số . . . . .	7
4.5	Giới Hạn 1 Bên . . . . .	7
4.6	1 Vài Quy Tắc Tìm Giới Hạn Vô Cực . . . . .	7
4.7	Các Dạng Vô Hình . . . . .	7
4.8	Hàm Số Liên Tục . . . . .	7
<b>5</b>	<b>Đạo Hàm</b>	<b>8</b>
5.1	Khái Niệm Đạo Hàm . . . . .	8
5.2	Các Quy Tắc Tính Đạo Hàm . . . . .	8
5.3	Đạo Hàm của Các Hàm Số Lượng Giác . . . . .	8
5.4	Vì Phân . . . . .	8
5.5	Đạo Hàm Cấp Cao . . . . .	8
<b>II</b>	<b>Hình Học – Geometry</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>Phép Dời Hình &amp; Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng</b>	<b>10</b>

6.1	Mở Đầu về Phép Biến Hình	10
6.2	Phép Tịnh Tiến & Phép Dời Hình	10
6.3	Phép Đối Xứng Trục	10
6.4	Phép Quay & Phép Đối Xứng Tâm	10
6.5	2 Hình bằng Nhau	10
6.6	Phép Vị Tự	10
6.7	Phép Đồng Dạng	10
6.8	Hình Tự Đồng Dạng & Hình Học Fractal	10
<b>7</b>	<b>Đường Thẳng &amp; Mặt Phẳng Trong Không Gian</b>	<b>11</b>
7.1	Đại Cương về Đường Thẳng & Mặt Phẳng	11
7.2	2 Đường Thẳng Song Song	11
7.3	Đường Thẳng Song Song với Mặt Phẳng	11
7.4	2 Mặt Phẳng Song Song	11
7.5	Phép Chiếu Song Song	11
7.6	Phương Pháp Tiên Dề Trong Hình Học	11
<b>8</b>	<b>Vector Trong Không Gian. Quan Hệ Vuông Góc</b>	<b>12</b>
8.1	Vector Trong Không Gian. Sự Đồng Phẳng của Các Vector	12
8.2	2 Đường Thẳng Vuông Góc	12
8.3	Đường Thẳng Vuông Góc với Mặt Phẳng	12
8.4	2 Mặt Phẳng Vuông Góc	12
8.5	Khoảng Cách	12
<b>A</b>	<b>Phụ Lục – Appendices</b>	<b>13</b>
A.1	Hàm Số Chẵn & Hàm Số Lẻ – Even & Odd Functions	13
A.1.1	Hàm số chẵn – Even function	13
A.1.2	Hàm số lẻ – Odd function	13
A.1.3	Các tính chất cơ bản	13
A.1.3.1	Tính duy nhất	13
A.1.3.2	Cộng & trừ hàm số chẵn lẻ	13
A.1.3.3	Nhân & chia hàm số chẵn lẻ	14
A.1.3.4	Hàm hợp (tích ánh xạ)	14
A.1.4	Phân tích chẵn-lẻ	14
	<b>Tài liệu tham khảo</b>	<b>16</b>

## Phần I

# Đại Số & Giải Tích – Algebra & Analysis

# Chương 1

## Hàm Số Lượng Giác & Phương Trình Lượng Giác – Trigonometric Function & Trigonometric Equation

“Nhiều hiện tượng tuần hoàn đơn giản trong thực tế được mô tả bởi những hàm số lượng giác. Chương này cung cấp những kiến thức cơ bản về các *hàm số lượng giác* & cách giải các *phương trình lượng giác* đơn giản.” – Quỳnh et al., 2020, p. 3

**Nội dung.** *Tính chất tuần hoàn của các hàm số lượng giác & phương pháp sử dụng đường tròn lượng giác để tìm nghiệm của các phương trình lượng giác cơ bản, kỹ năng biến đổi lượng giác & kỹ năng giải các dạng phương trình lượng giác.*

### 1.1 Các Hàm Số Lượng Giác – Trigonometric Functions

“Các hàm số lượng giác/trigonometric<sup>1 2</sup> functions thường được dùng để mô tả những hiện tượng thay đổi 1 cách tuần hoàn hay gặp trong thực tiễn, khoa học & kỹ thuật.” – Quỳnh et al., 2020, p. 4

#### 1.1.1 Các hàm số $y = \sin x$ & $y = \cos x$

##### 1.1.1.1 Khái niệm

**Định nghĩa 1.1.1** (Hàm số  $\sin, \cos$ ). *Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực  $x \in \mathbb{R}$  với  $\sin$  của góc lượng giác có số đo radian bằng  $x$  được gọi là hàm số  $\sin$ , ký hiệu là  $y = \sin x$ . Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực  $x \in \mathbb{R}$  với  $\cos$  của góc lượng giác có số đo radian bằng  $x$  được gọi là hàm số  $\cos$ , ký hiệu là  $y = \cos x$ .*

“Tập xác định của các hàm số  $y = \sin x$ ,  $y = \cos x$  là  $\mathbb{R}$ . Do đó các hàm số  $\sin$  &  $\cos$  được viết là:

$$\begin{array}{ll} \sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} & \cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \sin x & x \mapsto \cos x \end{array}$$

Hàm số  $y = \sin x$  là 1 *hàm số lẻ* vì  $\sin(-x) = -\sin(x)$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}$ , trong khi hàm số  $y = \cos x$  là 1 *hàm số chẵn* vì  $\cos(-x) = \cos x$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}$ . – Quỳnh et al., 2020, p. 4. Về định nghĩa & tính chất của hàm số chẵn & hàm số lẻ, xem Sect. A.1. Có thể xem thêm [Wikipedia/hàm số chẵn & lẻ](#) & [Wikipedia/even & odd functions](#).

##### 1.1.1.2 Tính chất tuần hoàn của các hàm số $y = \sin x$ & $y = \cos x$

“Với mỗi  $k \in \mathbb{Z}$ , số  $k2\pi$  thỏa mãn:  $\sin(x + k2\pi) = \sin x$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  $\forall k \in \mathbb{Z}$ . Ngược lại, có thể chứng minh rằng số  $T$  sao cho  $\sin(x + T) = \sin x$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}$  phải có dạng  $T = k2\pi$ , với  $k \in \mathbb{Z}$ . Rõ ràng, trong các số dạng  $k2\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ), số dương nhỏ nhất là  $2\pi$ . Vậy đối với hàm số  $y = \sin x$ , số  $T = 2\pi$  là số dương nhỏ nhất thỏa mãn  $\sin(x + T) = \sin x$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}$ . Hàm số  $y = \cos x$  cũng có tính chất tương tự. Ta nói 2 hàm số đó là *những hàm số tuần hoàn với chu kỳ  $2\pi$* .

Từ tính chất tuần hoàn với chu kỳ  $2\pi$ , ta thấy khi biết giá trị các hàm số  $y = \sin x$  &  $y = \cos x$  trên 1 đoạn có độ dài  $2\pi$  (e.g., đoạn  $[0; 2\pi]$  hay đoạn  $[-\pi; \pi]$ ) thì ta tính được giá trị của chúng tại mọi  $x \in \mathbb{R}$ . (Cứ mỗi khi biến số được cộng thêm  $2\pi$  thì giá trị của các hàm số đó lại trở về như cũ; điều này giải thích từ “tuần hoàn”). – Quỳnh et al., 2020, p. 4-5

<sup>1</sup>**trigonometric** [a] (also **trigonometrical**) (*mathematics*) connected with the types of mathematics that deals with the relationship between the sides & angles of triangles.

<sup>2</sup>**trigonometry** [n] [uncountable] the type of mathematics that deals with the relationship between the sides & angles of triangles.

### 1.1.1.3 Sự biến thiên & đồ thị của hàm số $y = \sin x$


“Do hàm số  $y = \sin x$  là hàm số tuần hoàn với chu kỳ  $2\pi$  nên ta chỉ cần khảo sát hàm số đó trên 1 đoạn có độ dài  $2\pi$ , e.g., trên đoạn  $[-\pi; \pi]$ .”

- **Chiều biến thiên.** *Bảng biến thiên của hàm số  $y = \sin x$  trên đoạn  $[-\pi; \pi]$ :*

$x$	$-\pi$	$-\frac{\pi}{2}$	$0$	$\frac{\pi}{2}$	$\pi$
$y = \sin x$	0	$\searrow$ -1	$\nearrow$ 0	$\nearrow$ 1	$\searrow$ 0

Hình 1.1: Bảng biến thiên của hàm số  $y = \sin x$  trên đoạn  $[-\pi; \pi]$ .

- **Đồ thị.** “Khi vẽ đồ thị của hàm số  $y = \sin x$  trên đoạn  $[-\pi; \pi]$ , ta nên để ý rằng: Hàm số  $y = \sin x$  là 1 hàm số lẻ, do đó đồ thị của nó nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng. Vì vậy, đầu tiên ta vẽ đồ thị của hàm số  $y = \sin x$  trên đoạn  $[0; \pi]$ .




Hình 1.2: Đồ thị của hàm số  $y = \sin x$  trên đoạn  $[0, \pi]$ .

Trên đoạn  $[0; \pi]$ , đồ thị của hàm số  $y = \sin x$  (Fig. 1.2) đi qua các điểm có tọa độ  $(x; y)$  trong bảng sau:

$x$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\pi$
$y = \sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

Bảng 1.1: Các giá trị của hàm  $y = \sin x$  tại 1 số điểm  $\in [0; \pi]$ .

Phần đồ thị của hàm số  $y = \sin x$  trên đoạn  $[0; \pi]$  cùng với hình đối xứng của nó qua gốc  $O$  lập thành đồ thị của hàm số  $y = \sin x$  trên đoạn  $[-\pi; \pi]$  (Fig. 1.3).



Hình 1.3: Đồ thị của hàm số  $y = \sin x$  trên  $\mathbb{R}$  – đường hình sin.


Tính tiến phần đồ thị vừa vẽ sang trái, sang phải những đoạn có độ dài  $2\pi, 4\pi, 6\pi, \dots$  thì được toàn bộ đồ thị hàm số  $y = \sin x$ . Đồ thị đó được gọi là 1 *đường hình sin* (Fig. 1.3).” – Quỳnh et al., 2020, pp. 6–7

**Nhận xét 1.1.1.** 1. “Khi  $x$  thay đổi, hàm số  $y = \sin x$  nhận mọi giá trị thuộc đoạn  $[-1; 1]$ . Ta nói tập giá trị của hàm số  $y = \sin x$  là đoạn  $[-1; 1]$ .”

2. Hàm số  $y = \sin x$  đồng biến trên khoảng  $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$ . Từ đó, do tính chất tuần hoàn với chu kỳ  $2\pi$ , hàm số  $y = \sin x$  đồng biến trên mỗi khoảng  $(-\frac{\pi}{2} + k2\pi; \frac{\pi}{2} + k2\pi)$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ .” – Quỳnh et al., 2020, p. 7

#### 1.1.1.4 Sự biến thiên & đồ thị của hàm số $y = \cos x$

“Ta có thể tiến hành khảo sát sự biến thiên & vẽ đồ thị của hàm số  $y = \cos x$  tương tự như đã làm đối với hàm số  $y = \sin x$  trên đây. Tuy nhiên, ta nhận thấy  $\cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2})$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}$ , nên bằng cách tịnh tiến đồ thị hàm số  $y = \sin x$  sang trái 1 đoạn có độ dài  $\frac{\pi}{2}$ , ta được đồ thị hàm số  $y = \cos x$  (nó cùng được gọi là 1 *đường hình sin*) (Fig. 1.4).



Hình 1.4: Đồ thị của hàm số  $y = \cos x$  trên  $\mathbb{R}$ .

Căn cứ vào đồ thị của hàm số  $y = \cos x$ , ta lập được bảng biến thiên của hàm số đó trên đoạn  $[-\pi; \pi]$  (Fig. 1.5):

$x$	$-\pi$	$0$	$\pi$
$y = \cos x$	$-1$	$1$	$-1$

Hình 1.5: Bảng biến thiên của hàm số  $y = \cos x$  trên đoạn  $[-\pi; \pi]$ .

**Nhận xét 1.1.2.** 1. Khi  $x$  thay đổi, hàm số  $y = \cos x$  nhận mọi giá trị thuộc đoạn  $[-1; 1]$ . Ta nói tập giá trị của hàm số  $y = \cos x$  là đoạn  $[-1; 1]$ .

2. Do hàm số  $y = \cos x$  là hàm số chẵn nên đồ thị của hàm số  $y = \cos x$  nhận trục tung làm trục đối xứng.

3. Hàm số  $y = \cos x$  đồng biến trên khoảng  $(-\pi; 0)$ . Từ đó do tính chất tuần hoàn với chu kỳ  $2\pi$ , hàm số  $y = \cos x$  đồng biến trên mỗi khoảng  $(-\pi + k2\pi; k2\pi)$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ .” – Quỳnh et al., 2020, pp. 8–9

Hàm số $y = \sin x$	Hàm số $y = \cos x$
Có tập xác định là $\mathbb{R}$	Có tập xác định là $\mathbb{R}$
Có tập giá trị là $[-1; 1]$	Có tập giá trị là $[-1; 1]$
Là hàm số lẻ	Là hàm số chẵn
Là hàm số tuần hoàn với chu kỳ $2\pi$	Là hàm số tuần hoàn với chu kỳ $2\pi$
Đồng biến trên mỗi khoảng $(-\frac{\pi}{2} + k2\pi; \frac{\pi}{2} + k2\pi)$ & nghịch biến trên mỗi khoảng $(\frac{\pi}{2} + k2\pi; \frac{3\pi}{2} + k2\pi)$ , $k \in \mathbb{Z}$	Đồng biến trên mỗi khoảng $(-\pi + k2\pi; k2\pi)$ & nghịch biến trên mỗi khoảng $(k2\pi; \pi + k2\pi)$ , $k \in \mathbb{Z}$
Có đồ thị là 1 đường hình sin	Có đồ thị là 1 đường hình sin

Bảng 1.2: So sánh tính chất của 2 hàm số  $y = \sin x$  &  $y = \cos x$ .

### 1.1.2 Các hàm số $y = \tan x$ & $y = \cot x$

#### 1.1.2.1 Định nghĩa

## 1.2 Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản

## 1.3 1 Số Dạng Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản

## Chương 2

# Tổ Hợp & Xác Suất

- 2.1 2 Quy Tắc Đếm Cơ Bản
- 2.2 Hoán Vị, Chỉnh Hợp & Tổ Hợp
- 2.3 Nhị Thức Newton
- 2.4 Biến Cố & Xác Suất của Biến Cố
- 2.5 Các Quy Tắc Tính Xác Suất
- 2.6 Biến Ngẫu Nhiên Rời Rạc



## Chương 3

# Dãy Số. Cấp Số Cộng & Cấp Số Nhân

3.1 Phương Pháp Quy Nạp Toán Học

3.2 Dây Số

3.3 Cấp Số Cộng

3.4 Cấp Số Nhân

## Chương 4

# Giới Hạn

4.1 Dãy Số Có Giới Hạn 0

4.2 Dãy Số Có Giới Hạn Hữu Hạn

4.3 Dãy Số Có Giới Hạn Vô Cực

4.4 Định Nghĩa & 1 Số Định Lý về Giới Hạn của Hàm Số

4.5 Giới Hạn 1 Bên

4.6 1 Vài Quy Tắc Tìm Giới Hạn Vô Cực

4.7 Các Dạng Vô Hình

4.8 Hàm Số Liên Tục

## Chương 5

# Đạo Hàm

5.1 Khái Niệm Đạo Hàm

5.2 Các Quy Tắc Tính Đạo Hàm

5.3 Đạo Hàm của Các Hàm Số Lượng Giác

5.4 Vi Phân

5.5 Đạo Hàm Cấp Cao

## Phần II

# Hình Học – Geometry

## Chương 6

# Phép Dời Hình & Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng

6.1 Mở Đầu về Phép Biến Hình

6.2 Phép Tịnh Tiến & Phép Dời Hình

6.3 Phép Đối Xứng Trục

6.4 Phép Quay & Phép Đối Xứng Tâm

6.5 2 Hình bằng Nhau

6.6 Phép Vị Tự

6.7 Phép Đồng Dạng

6.8 Hình Tự Đồng Dạng & Hình Học Fractal

## Chương 7

# Đường Thẳng & Mặt Phẳng Trong Không Gian

7.1 Đại Cương về Đường Thẳng & Mặt Phẳng

7.2 2 Đường Thẳng Song Song

7.3 Đường Thẳng Song Song với Mặt Phẳng

7.4 2 Mặt Phẳng Song Song

7.5 Phép Chiếu Song Song

7.6 Phương Pháp Tiên Đề Trong Hình Học

## Chương 8

# Vector Trong Không Gian. Quan Hệ Vuông Góc

8.1 Vector Trong Không Gian. Sự Đồng Phẳng của Các Vector

8.2 2 Đường Thẳng Vuông Góc

8.3 Đường Thẳng Vuông Góc với Mặt Phẳng

8.4 2 Mặt Phẳng Vuông Góc

8.5 Khoảng Cách

# Phụ lục A

## Phụ Lục – Appendices

### A.1 Hàm Số Chẵn & Hàm Số Lẻ – Even & Odd Functions

“Trong toán học, *hàm số chẵn & hàm số lẻ* là các **hàm số** thỏa mãn các quan hệ **đối xứng** nhất định khi lấy **nghịch đảo phép cộng**. Chúng rất quan trọng trong nhiều lĩnh vực của **giải tích toán**, đặc biệt trong lý thuyết chuỗi lũy thừa & **chuỗi Fourier**. Chúng được đặt tên theo **tính chẵn lẻ** của số mũ lũy thừa của **hàm lũy thừa** thỏa mãn từng điều kiện: hàm số  $f(x) = x^n$  là 1 hàm chẵn nếu  $n$  là 1 số nguyên chẵn, & nó là hàm lẻ nếu  $n$  là 1 số nguyên lẻ.” – [Wikipedia/hàm số chẵn & lẻ](#)

#### A.1.1 Hàm số chẵn – Even function

**Định nghĩa A.1.1** (Hàm số chẵn). “Cho  $f$  là 1 hàm số giá trị thực của 1 đối số thực,  $f$  là hàm số chẵn nếu điều kiện sau được thỏa mãn với mọi  $x$  sao cho cả  $x$  &  $-x$  đều thuộc miền xác định của  $f$ :  $f(x) = f(-x)$ ,  $\forall x \in \text{dom}(f)$ , với  $\text{dom}(f)$  ký hiệu miền xác định của  $f$ , hoặc phát biểu 1 cách tương đương, nếu phương trình sau thỏa mãn  $f(x) - f(-x) = 0$ ,  $\forall x \in \text{dom}(f)$ .”

Về mặt hình học, đồ thị của 1 hàm số chẵn **đối xứng** qua trục  $y$ , nghĩa là đồ thị của nó giữ không đổi sau phép **lấy đối xứng qua trục  $y$** .” – [Wikipedia/hàm số chẵn & lẻ](#)

**Ví dụ A.1.1** (Hàm chẵn). **Hàm trị tuyệt đối**  $x \mapsto |x|$ , các hàm đơn thức dạng  $x \mapsto x^{2n}$ , **hàm cosin**  $\cos$ , **hàm cosin hyperbolic**  $\cosh$ .

#### A.1.2 Hàm số lẻ – Odd function

**Định nghĩa A.1.2** (Hàm số lẻ). Cho  $f$  là 1 hàm số giá trị thực của 1 đối số (biến) thực,  $f$  là hàm số lẻ nếu điều kiện sau được thỏa mãn với mọi  $x$  sao cho cả  $x$  &  $-x$  đều thuộc miền xác định của  $f$ :  $f(-x) = -f(x)$ ,  $\forall x \in \text{dom}(f)$ , với  $\text{dom}(f)$  ký hiệu miền xác định của  $f$ , hoặc phát biểu 1 cách tương đương, nếu phương trình sau thỏa mãn  $f(x) + f(-x) = 0$ ,  $\forall x \in \text{dom}(f)$ .”

“Về mặt hình học, đồ thị của 1 hàm lẻ có tính đối xứng tâm quay qua gốc tọa độ, i.e., đồ thị của nó không đổi sau khi thực hiện phép quay  $180^\circ$  quanh điểm gốc.” – [Wikipedia/hàm số chẵn & lẻ](#)

**Ví dụ A.1.2** (Hàm số lẻ). **Hàm đồng nhất**  $x \mapsto x$ , các hàm đơn thức dạng  $x \mapsto x^{2n+1}$ , **hàm sin**  $\sin$ , **hàm sin hyperbol**  $\sinh$ , **hàm lỗi**  $\text{erf}$ .

#### A.1.3 Các tính chất cơ bản

##### A.1.3.1 Tính duy nhất

- “Nếu 1 hàm số vừa chẵn & vừa lẻ, nó bằng 0 ở mọi điểm mà nó được xác định.
- Nếu 1 hàm là lẻ thì **giá trị tuyệt đối** của hàm đó là 1 hàm chẵn.” – [Wikipedia/hàm số chẵn & lẻ](#)

##### A.1.3.2 Cộng & trừ hàm số chẵn lẻ

- Tổng & hiệu của 2 hàm số chẵn là 2 hàm số chẵn.
- Tổng & hiệu của 2 hàm lẻ là 2 hàm lẻ.
- Tổng của 1 hàm chẵn & 1 hàm lẻ thì không chẵn cũng không lẻ, trừ khi 1 trong các hàm ấy bằng 0 trên miền đã cho.



**A.1.3.3 Nhân & chia hàm số chẵn lẻ**

- Tích & thương của 2 hàm chẵn là 2 hàm chẵn.
- Tích & thương của 2 hàm lẻ là 2 hàm chẵn.
- Tích & thương của 1 hàm chẵn với 1 hàm lẻ là 2 hàm lẻ.

**A.1.3.4 Hàm hợp (tích ánh xạ)**

- Hàm hợp của 2 hàm chẵn là hàm chẵn.
- Hàm hợp của 2 hàm lẻ là hàm lẻ.
- 1 hàm chẵn hợp với 1 hàm lẻ là hàm chẵn.
- Hàm hợp của bất kỳ hàm số nào với 1 hàm chẵn là hàm chẵn (nhưng điều ngược lại không đúng).

**A.1.4 Phân tích chẵn–lẻ**

“Mọi hàm có thể được phân tích duy nhất thành tổng của 1 hàm chẵn & 1 hàm lẻ, được gọi tương ứng là *phần chẵn* & *phần lẻ* của 1 hàm số, nếu ta đặt như sau:

$$f_e(x) := \frac{f(x) + f(-x)}{2}, \quad f_o(x) := \frac{f(x) - f(-x)}{2},$$

sau đó  $f_e$  là hàm chẵn,  $f_o$  là hàm lẻ, &  $f(x) = f_e(x) + f_o(x)$ . Ngược lại nếu  $f(x) = g(x) + h(x)$ , trong đó  $g$  là chẵn &  $h$  là lẻ, thì  $g = f_e$  &  $h = f_o$ , bởi vì

$$\begin{aligned} 2f_e(x) &= f(x) + f(-x) = g(x) + g(-x) + h(x) + h(-x) = 2g(x), \\ 2f_o(x) &= f(x) - f(-x) = g(x) - g(-x) + h(x) - h(-x) = 2h(x). \end{aligned}$$

**Ví dụ A.1.3.** Hàm *cosin hyperbolic* & *sin hyperbolic* có thể được coi là các phần chẵn & phần lẻ của hàm số lũy thừa tự nhiên, bởi vì hàm thứ nhất là chẵn, hàm thứ 2 là lẻ, &  $e^x = \sinh x + \cosh x$ . – [Wikipedia/hàm số chẵn & lẻ](#)

# Tài liệu tham khảo

[NQBH/elementary math] Nguyễn Quân Bá Hồng. *Some Topics in Elementary Mathematics: Problems, Theories, Applications, & Bridges to Advanced Mathematics*. Mar 2022–now.

# Tài liệu tham khảo

Quỳnh, Đoàn et al. (2020). *Đại Số & Giải Tích 11 nâng cao*. Tái bản lần thứ 13. Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, p. 241.