

Some Topics in Elementary Mathematics/Grade 10

Nguyễn Quân Bá Hồng¹

Ngày 9 tháng 8 năm 2022

¹Independent Researcher, Ben Tre City, Vietnam
e-mail: nguyenquanbahong@gmail.com; website: <https://nqbh.github.io>.

Mục lục

1	Mệnh Đề Toán học. Tập Hợp	2
1.1	Mệnh Đề Toán Học	2
1.1.1	Mệnh đề toán học	2
1.1.2	Mệnh đề chứa biến	2
1.1.3	Phủ định của 1 mệnh đề	2
1.1.4	Mệnh đề kéo theo	2
1.1.5	Mệnh đề đảo. 2 mệnh đề tương đương	2
1.1.6	Ký hiệu \forall & \exists	3
1.2	Tập Hợp. Các Phép Toán Trên Tập Hợp	3
1.2.1	Tập hợp	3
1.2.2	Tập con & tập hợp bằng nhau	3
1.2.2.1	Tập con	3
1.2.2.2	Tập hợp bằng nhau	3
1.2.3	Giao của 2 tập hợp	3
1.2.4	Hợp của 2 tập hợp	3
1.2.5	Phần bù. Hiệu của 2 tập hợp	4
1.2.6	Các tập hợp số	4
1.2.6.1	Các tập hợp số đã học	4
1.2.6.2	1 số tập con thường dùng của tập hợp số thực	4
2	Bất Phương Trình & Hệ Bất Phương Trình Bậc Nhất 2 Ẩn	5
2.1	Bất Phương Trình Bậc Nhất 2 Ẩn	5
2.1.1	Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn	5
2.1.2	Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất 2 ẩn	5
2.1.2.1	Mô tả miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất 2 ẩn	5
2.1.2.2	Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất 2 ẩn	5
2.2	Hệ Bất Phương Trình Bậc Nhất 2 Ẩn	6
2.2.1	Hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn	6
2.2.2	Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn	6
3	Hàm Số & Đồ Thị	7
3.1	Hàm Số & Đồ Thị	7
3.1.1	Hàm số	7
3.1.1.1	Định nghĩa	7
3.1.1.2	Cách cho hàm số	7
3.1.2	Đồ thị của hàm số	7
3.1.3	Sự biến thiên của hàm số	8
3.1.3.1	Khái niệm	8
3.1.3.2	Mô tả hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến bằng đồ thị	8
3.2	Hàm Số Bậc 2. Đồ Thị Hàm Số Bậc 2 & Ứng Dụng	8
3.2.1	Hàm số bậc 2	8
3.2.2	Đồ thị hàm số bậc 2	8
3.2.3	Ứng dụng	9
3.3	Dấu của Tam Thức Bậc 2	9
3.3.1	Dấu của tam thức bậc 2	9
3.4	Bất Phương Trình Bậc 2 1 Ẩn	9
3.4.1	Bất phương trình bậc 2 1 ẩn	9

3.4.2	Giải bất phương trình bậc 2 1 ẩn	10
3.4.2.1	Giải bất phương trình bậc 2 1 ẩn bằng cách xét dấu của tam thức bậc 2	10
3.4.2.2	Giải bất phương trình bậc 2 1 ẩn bằng cách sử dụng đồ thị	10
3.4.3	Ứng dụng của bất phương trình bậc 2 1 ẩn	10
3.5	2 Dạng Phương Trình Quy về Phương Trình Bậc 2	11
3.5.1	Giải phương trình có dạng $\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$ (I) $f(x) = ax^2 + bx + c$ & $g(x) = mx^2 + nx + p$ với $a \neq m$	11
3.5.2	Giải phương trình có dạng $\sqrt{f(x)} = g(x)$ (II) $f(x) = ax^2 + bx + c$ & $g(x) = dx + e$ với $a \neq d^2$	11
4	Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác. Vector	12
4.1	Giá Trị Lượng Giác của 1 Góc $\in [0^\circ; 180^\circ]$. Định Lý Côsin & Định Lý Sin Trong Tam Giác	12
4.2	Giải Tam Giác	12
4.3	Khái Niệm Vector	12
4.4	Tổng & Hiệu của 2 Vector	12
4.5	Tích của 1 Số với 1 Vector	12
4.6	Tích Vô Hướng của 2 Vector	12
	Tài liệu tham khảo	14

Preface

Tóm tắt kiến thức Toán lớp 10 theo chương trình giáo dục của Việt Nam & một số chủ đề nâng cao.

Chương 1

Mệnh Đề Toán học. Tập Hợp

Nội dung. Mệnh đề toán học, tập hợp & các phép toán trên tập hợp.

1.1 Mệnh Đề Toán Học

1.1.1 Mệnh đề toán học

Định nghĩa 1.1.1 (Mệnh đề toán học). 1 mệnh đề khẳng định về 1 sự kiện trong toán học, gọi là mệnh đề toán học.

“Khi không sợ nhầm lẫn, ta thường gọi tắt mệnh đề toán học là *mệnh đề*.” – Thái et al., 2022, p. 5

Mệnh đề 1.1.1. Mỗi mệnh đề toán học phải hoặc đúng hoặc sai. 1 mệnh đề toán học không thể vừa đúng, vừa sai.

Định nghĩa 1.1.2 (Mệnh đề đúng/sai). Khi mệnh đề toán học là đúng, ta gọi mệnh đề đó là 1 mệnh đề đúng. Khi mệnh đề toán học là sai, ta gọi mệnh đề đó là 1 mệnh đề sai.

1.1.2 Mệnh đề chứa biến

Định nghĩa 1.1.3 (Mệnh đề chứa biến). Với mỗi bộ giá trị cụ thể của bộ biến (x_1, \dots, x_n) , $n \in \mathbb{N}^*$, mệnh đề $P(x_1, \dots, x_n)$ cho ta 1 mệnh đề toán học mà ta có thể khẳng định được tính đúng sai của mệnh đề đó. Khi đó, $P(x_1, \dots, x_n)$ được gọi là mệnh đề chứa biến.

“Ta thường ký hiệu mệnh đề chứa biến n là $P(n)$; mệnh đề chứa biến x, y là $P(x, y)$; ...” – Thái et al., 2022, p. 6

1.1.3 Phủ định của 1 mệnh đề

Định nghĩa 1.1.4 (Mệnh đề phủ định). Cho mệnh đề P . Mệnh đề “Không phải P ” được gọi là mệnh đề phủ định của mệnh đề P & ký hiệu là \bar{P} .

“Mệnh đề \bar{P} đúng khi P sai. Mệnh đề \bar{P} sai khi P đúng.” “Để phủ định 1 mệnh đề, ta chỉ cần thêm/bớt từ “không” (hoặc “không phải”) vào trước vị ngữ của mệnh đề đó.” – Thái et al., 2022, p. 7

1.1.4 Mệnh đề kéo theo

Định nghĩa 1.1.5 (Mệnh đề kéo theo). Cho 2 mệnh đề P & Q . Mệnh đề “Nếu P thì Q ” được gọi là mệnh đề kéo theo & ký hiệu là $P \Rightarrow Q$. mệnh đề $P \Rightarrow Q$ sai khi P đúng, Q sai & đúng trong các trường hợp còn lại.

“Tùy theo nội dung cụ thể, đôi khi người ta còn phát biểu mệnh đề $P \Rightarrow Q$ là “ P kéo theo Q ” hay “ P suy ra Q ” hay “Vì P nên Q ” ...” “Các định lý toán học là những mệnh đề đúng & thường phát biểu ở dạng mệnh đề kéo theo $P \Rightarrow Q$. Khi đó ta nói: P là giả thiết, Q là kết luận của định lý, hay P là điều kiện đủ để có Q , hoặc Q là điều kiện cần để có P .” – Thái et al., 2022, p. 7

1.1.5 Mệnh đề đảo. 2 mệnh đề tương đương

Định nghĩa 1.1.6 (Mệnh đề đảo, 2 mệnh đề tương đương). Mệnh đề $Q \Rightarrow P$ được gọi là mệnh đề đảo của mệnh đề $P \Rightarrow Q$. Nếu cả 2 mệnh đề $P \Rightarrow Q$ & $Q \Rightarrow P$ đều đúng thì ta nói P & Q là 2 mệnh đề tương đương, ký hiệu $P \Leftrightarrow Q$.

“Mệnh đề $P \Leftrightarrow Q$ có thể phát biểu ở những dạng như sau: “ P tương đương Q ”; “ P là điều kiện cần & đủ để có Q ”; “ P khi & chỉ khi Q ”; “ P nếu & chỉ nếu Q ”.” – Thái et al., 2022, p. 8

“Trong toán học, những câu khẳng định đúng phát biểu ở dạng “ $P \Leftrightarrow Q$ ” cũng được coi là 1 mệnh đề toán học, gọi là *mệnh đề tương đương*.” – Thái et al., 2022, p. 9

1.1.6 Ký hiệu \forall & \exists

\forall : “với mọi”, \exists : “tồn tại” hoặc “có 1” (tồn tại 1) hoặc “có ít nhất 1” (tồn tại ít nhất 1). Phương pháp chứng minh 1 mệnh đề có ký hiệu “ \forall ”, “ \exists ”, là đúng hoặc sai.

Mệnh đề 1.1.2. Cho mệnh đề “ $P(x), x \in X$ ”. Phủ định của mệnh đề $\forall x \in X, P(x)$ là mệnh đề “ $\exists x \in X, \overline{P(x)}$ ”. Phủ định của mệnh đề $\exists x \in X, P(x)$ là mệnh đề “ $\forall x \in X, \overline{P(x)}$ ”.

1.2 Tập Hợp. Các Phép Toán Trên Tập Hợp

1.2.1 Tập hợp

“Người ta còn minh họa tập hợp bằng 1 vòng kín, mỗi phần tử của tập hợp được biểu diễn bởi 1 chấm bên trong vòng kín, còn phần tử không thuộc tập hợp đó được biểu diễn bởi 1 chấm bên ngoài vòng kín. Cách minh họa tập hợp như vậy được gọi là biểu đồ Venn.” – Thái et al., 2022, p. 12

“Tập hợp không chứa phần tử nào được gọi là tập hợp rỗng, ký hiệu là \emptyset . 1 tập hợp có thể không có phần tử nào, cũng có thể có 1 phần tử, có nhiều phần tử, có vô số phần tử. Khi tập hợp C là tập hợp rỗng, ta viết $C = \emptyset$ & không được viết là $C = \{\emptyset\}$.” – Thái et al., 2022, p. 13

1.2.2 Tập con & tập hợp bằng nhau

1.2.2.1 Tập con

Định nghĩa 1.2.1. Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều là phần tử của tập hợp B thì ta nói A là 1 tập con của tập hợp B & viết là $A \subset B$. Ta còn đọc là A chứa trong B .

“Quy ước: Tập hợp rỗng được coi là tập con của mọi tập hợp.” “ $A \subset B \Leftrightarrow (\forall x, x \in A \Rightarrow x \in B)$. Khi $A \subset B$, ta cũng viết $B \supset A$ (đọc là B chứa A). Nếu A không phải là tập con của B , ta viết $A \not\subset B$.” – Thái et al., 2022, p. 13

Mệnh đề 1.2.1. $A \subset A$ với mọi tập hợp A . Nếu $A \subset B$ & $B \subset C$ thì $A \subset C$.

Tính chất $((A \subset B) \wedge (B \subset C)) \Rightarrow (A \subset C)$ được gọi là *tính chất bắc cầu*.

1.2.2.2 Tập hợp bằng nhau

Định nghĩa 1.2.2. Khi $A \subset B$ & $B \subset A$ thì ta nói 2 tập hợp A & B bằng nhau, viết là $A = B$.

1.2.3 Giao của 2 tập hợp

Định nghĩa 1.2.3 (Giao của 2 tập hợp). Tập hợp gồm tất cả các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B được gọi là giao của A & B , ký hiệu $A \cap B$.

“Vậy $A \cap B = \{x | x \in A \text{ & } x \in B\}$.” “ $x \in A \cap B$ khi & chỉ khi $x \in A$ & $x \in B$.” – Thái et al., 2022, p. 14, i.e., $(x \in A \cap B) \Leftrightarrow ((x \in A) \wedge (x \in B))$.

1.2.4 Hợp của 2 tập hợp

Định nghĩa 1.2.4 (Hợp của 2 tập hợp). Tập hợp gồm các phần tử thuộc A hoặc thuộc B được gọi là hợp của A & B , ký hiệu $A \cup B$.

“Vậy $A \cup B = \{x | x \in A \text{ hoặc } x \in B\}$.” “ $x \in A \cup B$ khi & chỉ khi $x \in A$ & $x \in B$.” – Thái et al., 2022, p. 15, i.e., $(x \in A \cup B) \Leftrightarrow ((x \in A) \vee (x \in B))$.

Ví dụ 1.2.1. Với tập hợp \mathbb{Q} các số hữu tỷ & tập hợp I các số vô tỷ. $\mathbb{Q} \cap I = \emptyset$, $\mathbb{Q} \cup I = \mathbb{R}$.

1.2.5 Phần bù. Hiệu của 2 tập hợp

“Tập hợp \mathbb{Q} các số hữu tỷ là phần bù của tập hợp I các số vô tỷ trong tập hợp \mathbb{R} .” – Thái et al., 2022, p. 15

Định nghĩa 1.2.5 (Phần bù). *Cho tập hợp A là tập con của tập hợp B . Tập hợp những phần tử B mà không phải là phần tử của A được gọi là phần bù của A trong B , ký hiệu $C_B A$.*

$$B = A \cup C_B A \text{ \& } C_B A \cap A = \emptyset, \forall \text{ tập hợp } A, B.$$

Định nghĩa 1.2.6 (Hiệu của 2 tập hợp). *Tập hợp gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B được gọi là hiệu của A & B , ký hiệu $A \setminus B$.*

“Vậy $A \setminus B = \{x | x \in A \text{ \& } x \notin B\}$.” “ $x \in A \setminus B$ khi & chỉ khi $x \in A \text{ \& } x \notin B$.” “Nếu $B \subset A$ thì $A \setminus B = C_A B$.” – Thái et al., 2022, p. 16

1.2.6 Các tập hợp số

1.2.6.1 Các tập hợp số đã học

“Ta đã biết $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ lần lượt là tập hợp số tự nhiên, tập hợp số nguyên, tập hợp số hữu tỷ, tập hợp số thực. Ta có quan hệ sau: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.” – Thái et al., 2022, p. 17

1.2.6.2 1 số tập con thường dùng của tập hợp số thực

“ \mathbb{R} : tập hợp số thực $(-\infty; +\infty)$. $\{x \in \mathbb{R} | a \leq x \leq b\}$: đoạn $[a; b]$. $\{x \in \mathbb{R} | a < x < b\}$: khoảng $(a; b)$. $\{x \in \mathbb{R} | x > a\}$: khoảng $(a; +\infty)$. $\{x \in \mathbb{R} | x < b\}$: khoảng $(-\infty; b)$. $\{x \in \mathbb{R} | a \leq x < b\}$: nửa khoảng $[a; b)$. $\{x \in \mathbb{R} | a < x \leq b\}$: nửa khoảng $(a; b]$. $\{x \in \mathbb{R} | x \geq a\}$: nửa khoảng $[a; +\infty)$. $\{x \in \mathbb{R} | x \leq b\}$: nửa khoảng $(-\infty; b]$. Ký hiệu $-\infty$ đọc là *âm vô cực*, ký hiệu $+\infty$ đọc là *dương vô cực*; a & b được gọi là *đầu mút* của các đoạn, khoảng, nửa khoảng. Ta cũng có thể biểu diễn tập hợp trên trục số bằng cách gạch bỏ phần không thuộc tập đó.” – Thái et al., 2022, p. 17

Chương 2

Bất Phương Trình & Hệ Bất Phương Trình Bậc Nhất 2 Ẩn

Nội dung. Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn; hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn & ứng dụng của chúng vào bài toán thực tiễn.

2.1 Bất Phương Trình Bậc Nhất 2 Ẩn

2.1.1 Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn

Định nghĩa 2.1.1 (Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn). Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn x, y là bất phương trình có 1 trong các dạng sau: $ax + by < c$, $ax + by > c$, $ax + by \leq c$, $ax + by \geq c$, trong đó a, b, c là những số cho trước với a, b không đồng thời bằng 0, x & y là các ẩn.

Cho bất phương trình bậc nhất 2 ẩn $ax + by < c$. Mỗi cặp số $(x_0; y_0)$ sao cho $ax_0 + by_0 < c$ (*) được gọi là 1 nghiệm của bất phương trình (*). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tập hợp các điểm có tọa độ là nghiệm của bất phương trình (*) được gọi là miền nghiệm của bất phương trình đó.

“Nghiệm & miền nghiệm của các bất phương trình dạng $ax + by > c$, $ax + by \leq c$ & $ax + by \geq c$ được định nghĩa tương tự.” – Thái et al., 2022, p. 21

2.1.2 Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất 2 ẩn

2.1.2.1 Mô tả miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất 2 ẩn

“Người ta chứng minh được định lý sau:

Định lý 2.1.1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , phương trình $ax + by = c$ (với a & b không đồng thời bằng 0) xác định 1 đường thẳng d như sau:

- d có phương trình là $x = \frac{c}{a}$ nếu $b = 0$;
- d có phương trình là $y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}$ nếu $b \neq 0$.

Ngoài ra, người ta cũng chứng minh được định lý sau:

Định lý 2.1.2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , đường thẳng $d : ax + by = c$ chia mặt phẳng thành 2 nửa mặt phẳng. 1 trong 2 nửa mặt phẳng (không kể d) là miền nghiệm của bất phương trình $ax + by < c$, nửa mặt phẳng còn lại (không kể d) là miền nghiệm của bất phương trình $ax + by > c$.

Đối với bất phương trình dạng $ax + by \leq c$ hoặc $ax + by \geq c$ thì miền nghiệm là nửa mặt phẳng kể cả đường thẳng d .” – Thái et al., 2022, p. 22

2.1.2.2 Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất 2 ẩn

“Quy tắc thực hành biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất 2 ẩn như sau:

Các bước biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $ax + by < c$ trong mặt phẳng tọa độ Oxy :

1. Vẽ đường thẳng $d : ax + by = c$. Đường thẳng d chia mặt phẳng tọa độ thành 2 nửa mặt phẳng.
2. Lấy 1 điểm $M(x_0; y_0)$ không nằm trên d (thường lấy gốc tọa độ O nếu $c \neq 0$). Tính $ax_0 + by_0$ & so sánh với c .
3. Kết luận:
 - Nếu $ax_0 + by_0 < c$ thì nửa mặt phẳng (không kể d) chứa điểm M là miền nghiệm của bất phương trình $ax + by < c$.
 - Nếu $ax_0 + by_0 > c$ thì nửa mặt phẳng (không kể d) không chứa điểm M là miền nghiệm của bất phương trình $ax + by < c$.

Thông thường khi sử dụng phần mềm toán học để biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất 2 ẩn, miền nghiệm của bất phương trình đó được tô màu.” –Thái et al., 2022, pp. 23–24

2.2 Hệ Bất Phương Trình Bậc Nhất 2 Ẩn

2.2.1 Hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn

Định nghĩa 2.2.1 (Hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn). Hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn x, y là 1 hệ gồm 1 số bất phương trình bậc nhất 2 ẩn x, y . Mỗi nghiệm chung của các bất phương trình trong hệ được gọi là 1 nghiệm của hệ bất phương trình đó.

2.2.2 Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn

“Cũng như bất phương trình bậc nhất 2 ẩn, ta có thể biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn trên mặt phẳng tọa độ.” –Thái et al., 2022, p. 26

Định nghĩa 2.2.2 (Miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn). Miền nghiệm của hệ bất phương trình là giao các miền nghiệm của các bất phương trình trong hệ.

“Để biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn, ta làm như sau:

- Trong cùng mặt phẳng tọa độ, biểu diễn miền nghiệm của mỗi bất phương trình trong hệ bằng cách gạch bỏ phần không thuộc miền nghiệm của nó.
- Phần không bị gạch là miền nghiệm cần tìm.” – Thái et al., 2022, p. 27

Chương 3

Hàm Số & Đồ Thị

Nội dung. Hàm số & đồ thị, hàm số bậc 2 & ứng dụng, dấu của tam thức bậc 2, bất phương trình bậc 2 1 ẩn, cách giải 2 dạng phương trình vô tỷ.

3.1 Hàm Số & Đồ Thị

“Galileo Galilei (1564–1642), sinh tại thành phố Pisa (Italia), là nhà bác học vĩ đại của thời kỳ Phục Hưng. Ông được mệnh danh là “cha đẻ của khoa học hiện đại”. Trước Galileo, người ta tin rằng vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ, ông đã bác bỏ điều này bằng thí nghiệm nổi tiếng ở tháp nghiêng Pisa. Từ thí nghiệm của Galileo, các nhà khoa học sau này được truyền cảm hứng rằng chúng ta chỉ có thể rút ra tri thức khoa học từ các quy luật khách quan của tự nhiên, chứ không phải từ niềm tin.” – Thái et al., 2022, p. 31

3.1.1 Hàm số

3.1.1.1 Định nghĩa

Định nghĩa 3.1.1 (Hàm số). Cho tập hợp khác rỗng $D \subset \mathbb{R}$. Nếu với mỗi giá trị của x thuộc D có 1 & chỉ 1 giá trị tương ứng của y thuộc tập hợp số thực \mathbb{R} thì ta có 1 hàm số. Ta gọi x là biến số & y là hàm số của x . Tập hợp D được gọi là tập xác định của hàm số. Ký hiệu hàm số: $y = f(x)$, $x \in D$.

3.1.1.2 Cách cho hàm số

3.1.1.2.1 Hàm số cho bằng 1 công thức. “Cùng với cách nói hàm số cho bằng công thức, ta cũng nói hàm số cho bằng biểu thức.” – Thái et al., 2022, p. 32

Định nghĩa 3.1.2 (Tập xác định của hàm số). Tập xác định của hàm số $y = f(x)$ là tập hợp tất cả các số thực x sao cho biểu thức $f(x)$ có nghĩa.

3.1.1.2.2 Hàm số cho bằng nhiều công thức. “1 hàm số có thể được cho bằng nhiều công thức.” “Cho hàm số $y = f(x)$ với tập xác định là D . Khi biến số x thay đổi trong tập D thì tập hợp các giá trị y tương ứng được gọi là tập giá trị của hàm số đã cho.” – Thái et al., 2022, p. 33

3.1.1.2.3 Hàm số không cho bằng công thức. “Trong thực tiễn, có những tình huống dẫn tới những hàm số không thể cho bằng công thức (hoặc nhiều công thức).” – Thái et al., 2022, p. 33

3.1.2 Đồ thị của hàm số

“Với mỗi giá trị của biến số x , ta có thể xác định được điểm $M(x; y)$ với $y = f(x)$ trong mặt phẳng tọa độ. Khi biến số x thay đổi trên tập xác định, điểm $M(x; y)$ sẽ thay đổi theo trong mặt phẳng tọa độ Oxy & vạch nên 1 đường. Đường đó gọi là đồ thị của hàm số $y = f(x)$.” – Thái et al., 2022, p. 34

Định nghĩa 3.1.3 (Đồ thị của hàm số). Đồ thị của hàm số $y = f(x)$ xác định trên tập hợp D là tập hợp tất cả các điểm $M(x; f(x))$ trong mặt phẳng tọa độ Oxy với mọi x thuộc D .

“Điểm $M(a; b)$ trong mặt phẳng tọa độ \mathbb{R}^2 thuộc đồ thị hàm số $y = f(x)$, $x \in D$ khi & chỉ khi

$$\begin{cases} a \in D, \\ b = f(a). \end{cases}$$

Để chứng tỏ điểm $M(a; b)$ trong mặt phẳng tọa độ *không thuộc* đồ thị hàm số $y = f(x)$, $x \in D$, ta có thể kiểm tra 1 trong 2 khả năng sau:

- *Khả năng 1*: Chứng tỏ rằng $a \notin D$.
- *Khả năng 2*: Khi $a \in D$ thì chứng tỏ rằng $b \neq f(a)$. – Thái et al., 2022, pp. 34–35

3.1.3 Sự biến thiên của hàm số

3.1.3.1 Khái niệm

Định nghĩa 3.1.4 (Hàm số đồng biến/ng nghịch biến). Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên khoảng $(a; b)$. Hàm số $y = f(x)$ gọi là đồng biến trên khoảng $(a; b)$ nếu

$$\forall x_1, x_2 \in (a; b), x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2).$$

Hàm số $y = f(x)$ gọi là nghịch biến trên khoảng $(a; b)$ nếu

$$\forall x_1, x_2 \in (a; b), x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

“Xét sự biến thiên của 1 hàm số là tìm các khoảng hàm số đồng biến & các khoảng hàm số nghịch biến. Kết quả xét sự biến thiên được tổng kết trong 1 *bảng biến thiên*.” – Thái et al., 2022, p. 36

3.1.3.2 Mô tả hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến bằng đồ thị

“Hàm số đồng biến trên khoảng $(a; b)$ khi & chỉ khi đồ thị hàm số “đi lên” trên khoảng đó. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(a; b)$ khi & chỉ khi đồ thị hàm số “đi xuống” trên khoảng đó. Khi nói đồ thị “đi lên” hay “đi xuống”, ta luôn kể theo chiều tăng của biến số, i.e., kể từ trái qua phải.” – Thái et al., 2022, p. 37

3.2 Hàm Số Bậc 2. Đồ Thị Hàm Số Bậc 2 & Ứng Dụng

3.2.1 Hàm số bậc 2

Định nghĩa 3.2.1 (Hàm số bậc 2). Hàm số bậc 2 là hàm số được cho bằng biểu thức có dạng $y = ax^2 + bx + c$, trong đó a, b, c là những hằng số & $a \neq 0$. Tập xác định của hàm số là \mathbb{R} .

3.2.2 Đồ thị hàm số bậc 2

Định nghĩa 3.2.2. Đồ thị hàm số bậc 2 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) là 1 đường parabol có đỉnh là điểm với tọa độ $(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a})$ & trục đối xứng là đường thẳng $x = -\frac{b}{2a}$.

“Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), ta có: $-\frac{\Delta}{4a} = f(-\frac{b}{2a})$. Để vẽ đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), ta thực hiện các bước:

- Xác định tọa độ đỉnh: $(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a})$;
- Vẽ trục đối xứng $x = -\frac{b}{2a}$;
- Xác định 1 số điểm đặc biệt, e.g.: giao điểm với trục tung (có tọa độ $(0; c)$) & trục hoành (nếu có), điểm đối xứng với điểm có tọa độ $(0; c)$ qua trục đối xứng $x = -\frac{b}{2a}$.
- Vẽ đường parabol đi qua các điểm đã xác định ta nhận được đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + c$.

Nếu $a > 0$ thì parabol có bề lõm quay lên trên, nếu $a < 0$ thì parabol có bề lõm quay xuống dưới.” “Cho hàm số bậc 2 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$). Nếu $a > 0$ thì hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -\frac{b}{2a})$; đồng biến trên khoảng $(-\frac{b}{2a}; +\infty)$. Nếu $a < 0$ thì hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -\frac{b}{2a})$; nghịch biến trên khoảng $(-\frac{b}{2a}; +\infty)$. Ta có bảng biến thiên của hàm số bậc 2 như sau:

$a > 0$

x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
y	$+\infty$	$-\frac{\Delta}{4a}$	$+\infty$

$a < 0$

x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
y	$-\infty$	$-\frac{\Delta}{4a}$	$-\infty$

Hình 3.1: Bảng biến thiên của hàm số bậc 2 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$).

” – Thái et al., 2022, pp. 40–41

3.2.3 Ứng dụng

“Các hàm số bậc 2 có nhiều ứng dụng trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn.” – Thái et al., 2022, p. 42

3.3 Dấu của Tam Thức Bậc 2

“Đa thức $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) còn gọi là *tam thức bậc 2*.” – Thái et al., 2022, p. 44

3.3.1 Dấu của tam thức bậc 2

“Xét tam thức bậc 2 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$). Ta đã biết: $ax^2 + bx + c > 0$ ứng với phần parabol $y = ax^2 + bx + c$ nằm phía trên trục hoành. $ax^2 + bx + c < 0$ ứng với phần parabol $y = ax^2 + bx + c$ nằm phía dưới trục hoành. Như vậy, ta có thể nhận ra dấu của tam thức bậc 2 $f(x) = ax^2 + bx + c$ là “+” (hoặc “−”) thông qua việc nhận ra phần parabol $y = ax^2 + bx + c$ nằm phía trên (hoặc phía dưới) trục hoành.” – Thái et al., 2022, p. 44

Lưu ý 3.3.1 (Dấu của Δ). • “Nếu $\Delta < 0$ thì $f(x)$ cùng dấu với hệ số a với mọi $x \in \mathbb{R}$.

- Nếu $\Delta = 0$ thì $f(x)$ cùng dấu với hệ số a với mọi $x \in \mathbb{R} \setminus \{-\frac{b}{2a}\}$.
- Nếu $\Delta > 0$ thì $f(x)$ cùng dấu với hệ số a với mọi x thuộc các khoảng $(-\infty; x_1)$ & $(x_2; +\infty)$; $f(x)$ trái dấu với hệ số a với mọi x thuộc khoảng $(x_1; x_2)$, trong đó x_1, x_2 là 2 nghiệm của $f(x)$ & $x_1 < x_2$.” – Thái et al., 2022, pp. 44–45

“Người ta đã chứng minh được định lý về dấu tam thức bậc 2 sau:

Định lý 3.3.1. Cho tam thức bậc 2 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Nếu $\Delta < 0$ thì $f(x)$ cùng dấu với hệ số a với mọi $x \in \mathbb{R}$.
- Nếu $\Delta = 0$ thì $f(x)$ cùng dấu với hệ số a với mọi $x \in \mathbb{R} \setminus \{-\frac{b}{2a}\}$.
- Nếu $\Delta > 0$ thì $f(x)$ có 2 nghiệm x_1, x_2 ($x_1 < x_2$). Khi đó: $f(x)$ cùng dấu với hệ số a với mọi x thuộc các khoảng $(-\infty; x_1)$ & $(x_2; +\infty)$; $f(x)$ trái dấu với hệ số a với mọi x thuộc khoảng $(x_1; x_2)$.

Trong định lý, có thể thay biệt thức $\Delta = b^2 - 4ac$ bằng biệt thức thu gọn $\Delta' = (b')^2 - ac$ với $b = 2b'$.” – Thái et al., 2022, p. 46

3.4 Bất Phương Trình Bậc 2 1 Ẩn

3.4.1 Bất phương trình bậc 2 1 ẩn

Định nghĩa 3.4.1 (Bất phương trình bậc 2 1 ẩn). Bất phương trình bậc 2 ẩn x là bất phương trình có 1 trong các dạng sau: $ax^2 + bx + c < 0$, $ax^2 + bx + c \leq 0$, $ax^2 + bx + c > 0$, $ax^2 + bx + c \geq 0$, trong đó a, b, c là các số thực đã cho, $a \neq 0$. Đối với bất phương trình bậc 2 có dạng $ax^2 + bx + c < 0$, mỗi số $x_0 \in \mathbb{R}$ sao cho $ax_0^2 + bx_0 + c < 0$ được gọi là 1 nghiệm của bất phương trình đó. Tập hợp các nghiệm x_0 như thế còn được gọi là tập nghiệm của bất phương trình bậc 2 đã cho. Nghiệm & tập nghiệm của các dạng bất phương trình bậc 2 ẩn x còn lại được định nghĩa tương tự.

“Giải bất phương trình bậc 2 ẩn x là đi tìm tập nghiệm của bất phương trình đó.” – Thái et al., 2022, p. 49

3.4.2 Giải bất phương trình bậc 2 1 ẩn

3.4.2.1 Giải bất phương trình bậc 2 1 ẩn bằng cách xét dấu của tam thức bậc 2

“Để giải bất phương trình bậc 2 (1 ẩn) có dạng $f(x) > 0$ ($f(x) = ax^2 + bx + c$), ta chuyển việc giải bất phương trình đó về việc tìm tập hợp những giá trị của x sao cho $f(x)$ mang dấu “+”. Cụ thể, ta làm như sau:

1. Xác định dấu của hệ số a & tìm nghiệm của $f(x)$ (nếu có).
2. Sử dụng định lý về dấu của tam thức bậc 2 để tìm tập hợp những giá trị của x sao cho $f(x)$ mang dấu “+”.

Các bất phương trình bậc 2 có dạng $f(x) < 0$, $f(x) \geq 0$, $f(x) \leq 0$ được giải bằng cách tương tự.” – Thái et al., 2022, p. 50







3.4.2.2 Giải bất phương trình bậc 2 1 ẩn bằng cách sử dụng đồ thị

“Giải bất phương trình bậc 2 $ax^2 + bx + c > 0$ là tìm tập hợp những giá trị của x ứng với phần parabol $y = ax^2 + bx + c$ nằm phía trên trục hoành. Tương tự, giải bất phương trình bậc 2 $ax^2 + bx + c < 0$ là tìm tập hợp những giá trị của x ứng với phần parabol $y = ax^2 + bx + c$ nằm phía dưới trục hoành. Như vậy, để giải bất phương trình bậc 2 (1 ẩn) có dạng $f(x) > 0$ ($f(x) = ax^2 + bx + c$) bằng cách sử dụng đồ thị, ta có thể làm như sau: Dựa vào parabol $y = ax^2 + bx + c$, ta tìm tập hợp những giá trị của x ứng với phần parabol đó nằm phía trên trục hoành. Đối với các bất phương trình bậc 2 có dạng $f(x) < 0$, $f(x) \geq 0$, $f(x) \leq 0$, ta cũng làm tương tự.” – Thái et al., 2022, p. 51

3.4.3 Ứng dụng của bất phương trình bậc 2 1 ẩn

“Bất phương trình bậc 2 1 ẩn có nhiều ứng dụng, e.g.: giải 1 số hệ bất phương trình; ứng dụng vào tính toán lợi nhuận trong kinh doanh; tính toán điểm rơi trong pháo binh; ...” – Thái et al., 2022, p. 52

Xem Thái et al., 2022, p. 55 bảng tổng kết các trường hợp có thể xảy ra khi giải bất phương trình bậc 2 $ax^2 + bx + c > 0$ (*) ($a \neq 0$). Đặt $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Dấu của Δ \ Dấu của a	$a > 0$	$a < 0$
$\Delta > 0$ $f(x)$ có hai nghiệm x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)	$(*) \Leftrightarrow \begin{cases} x < x_1 \\ x > x_2 \end{cases}$ 	$(*) \Leftrightarrow x_1 < x < x_2$ 
$\Delta = 0$ $f(x)$ có nghiệm kép $x = -\frac{b}{2a}$	$(*) \Leftrightarrow x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{b}{2a} \right\}$ 	$(*)$ vô nghiệm 
$\Delta < 0$ $f(x)$ vô nghiệm	$(*) \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}$ 	$(*)$ vô nghiệm 

Hình 3.2: Các trường hợp có thể xảy ra khi giải bất phương trình bậc 2 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$).

Bảng tổng kết các trường hợp có thể xảy ra khi giải các bất phương trình bậc 2 $ax^2 + bx + c < 0$, $ax^2 + bx + c \geq 0$, $ax^2 + bx + c \leq 0$ ($a \neq 0$).

3.5 2 Dạng Phương Trình Quy về Phương Trình Bậc 2

3.5.1 Giải phương trình có dạng $\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$ (I) $f(x) = ax^2 + bx + c$ & $g(x) = mx^2 + nx + p$ với $a \neq m$

“Để giải phương trình (I), ta làm như sau:

1. Bình phương 2 vế của (I) dẫn đến phương trình $f(x) = g(x)$ rồi tìm nghiệm của phương trình này.
2. Thay từng nghiệm của phương trình $f(x) = g(x)$ vào bất phương trình $f(x) \geq 0$ (hoặc $g(x) \geq 0$). Nghiệm nào thỏa mãn bất phương trình đó thì giữ lại, nghiệm nào không thỏa mãn thì loại đi.
3. Trên cơ sở những nghiệm giữ lại ở Bước 2, ta kết luận nghiệm của phương trình (I).

Trong 2 bất phương trình $f(x) \geq 0$ & $g(x) \geq 0$, ta thường chọn bất phương trình có dạng đơn giản hơn để thực hiện Bước 2. Người ta chứng minh được rằng tập hợp (số thực) giữ lại ở Bước 2 chính là tập nghiệm của phương trình (I).” – Thái et al., 2022, p. 56

3.5.2 Giải phương trình có dạng $\sqrt{f(x)} = g(x)$ (II) $f(x) = ax^2 + bx + c$ & $g(x) = dx + e$ với $a \neq d^2$

“Để giải phương trình (II), ta làm như sau:

1. Giải bất phương trình $g(x) \geq 0$ để tìm tập nghiệm của bất phương trình đó.
2. Bình phương 2 vế của (II) dẫn đến phương trình $f(x) = [g(x)]^2$ rồi tìm tập nghiệm của phương trình đó.
3. Trong những nghiệm của phương trình $f(x) = [g(x)]^2$, ta chỉ giữ lại những nghiệm thuộc tập nghiệm của bất phương trình $g(x) \geq 0$. Tập nghiệm giữ lại đó chính là tập nghiệm của phương trình (II).” – Thái et al., 2022, p. 57

Chương 4

Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác. Vector

- 4.1 Giá Trị Lượng Giác của 1 Góc $\in [0^\circ; 180^\circ]$. Định Lý Côsin & Định Lý Sin Trong Tam Giác
- 4.2 Giải Tam Giác
- 4.3 Khái Niệm Vector
- 4.4 Tổng & Hiệu của 2 Vector
- 4.5 Tích của 1 Số với 1 Vector
- 4.6 Tích Vô Hướng của 2 Vector

Tài liệu tham khảo

[NQBH/elementary math] Nguyễn Quân Bá Hồng. *Some Topics in Elementary Mathematics: Problems, Theories, Applications, & Bridges to Advanced Mathematics*. Mar 2022–now.

Tài liệu tham khảo

Thái, Đỗ Đức et al. (2022). *Toán 10, tập 1*. Nhà Xuất Bản Đại Học Sư Phạm, p. 107.