

# Chemical Reaction – Phản Ứng Hóa Học

Nguyễn Quân Bá Hồng\*

Ngày 14 tháng 4 năm 2023

## Tóm tắt nội dung

[EN] This text is a collection of problems, from easy to advanced, about *chemical reaction*. This text is also a supplementary material for my lecture note on Elementary Chemistry, which is stored & downloadable at the following link: [GitHub/NQBH/hobby/elementary\\_chemistry/grade 8/lecture](https://github.com/NQBH/hobby/elementary_chemistry/grade_8/lecture)<sup>1</sup>. The latest version of this text has been stored & downloadable at the following link: [GitHub/NQBH/hobby/elementary\\_chemistry/grade 8/chemical reaction](https://github.com/NQBH/hobby/elementary_chemistry/grade_8/chemical_reaction)<sup>2</sup>.

[VI] Tài liệu này là 1 bộ sưu tập các bài tập chọn lọc từ cơ bản đến nâng cao về *phản ứng hóa học*. Tài liệu này là phần bài tập bổ sung cho tài liệu chính – bài giảng [GitHub/NQBH/hobby/elementary\\_chemistry/grade 8/lecture](https://github.com/NQBH/hobby/elementary_chemistry/grade_8/lecture) của tác giả viết cho Hóa Học Sơ Cấp. Phiên bản mới nhất của tài liệu này được lưu trữ & có thể tải xuống ở link sau: [GitHub/NQBH/hobby/elementary\\_chemistry/grade 8/chemical reaction](https://github.com/NQBH/hobby/elementary_chemistry/grade_8/chemical_reaction).

## Mục lục

<b>1 Physical- &amp; Chemical Transformations – Biến Đổi Vật Lý &amp; Biến Đổi Hóa Học</b>	<b>3</b>
1.1 Sự biến đổi chất	3
1.1.1 Sự biến đổi vật lý	3
1.1.2 Sự biến đổi hóa học	3
1.2 Phân biệt sự biến đổi vật lý & sự biến đổi hóa học	3
<b>2 Chemical Reactions &amp; Its Energy – Phản Ứng Hóa Học &amp; Năng Lượng của Phản Ứng Hóa Học</b>	<b>3</b>
2.1 Phản ứng hóa học	4
2.2 Diễn biến của phản ứng hóa học	4
2.3 Dấu hiệu có phản ứng hóa học xảy ra	5
2.4 Phản ứng thu/tỏa nhiệt	5
<b>3 Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng. Phương Trình Hóa Học</b>	<b>5</b>
<b>4 Mol &amp; Tỷ Khối của Chất Khí</b>	<b>5</b>
<b>5 Tính Theo Phương Trình Hóa Học</b>	<b>5</b>
<b>6 Nồng Độ Dung Dịch</b>	<b>6</b>
6.1 Dung dịch, chất tan, & dung môi	6
6.1.1 Dung dịch chưa bão hòa. Dung dịch bão hòa	6
6.2 Độ tan của 1 chất trong nước	6
6.2.1 Chất tan & chất không tan	6
6.2.2 Tính tan trong nước của 1 số acid, base, muối	7
6.2.3 Khái niệm độ tan của 1 chất trong nước	7
6.2.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan	7
6.2.5 Cách tính độ tan của 1 chất trong nước	7
6.3 Làm thế nào để quá trình hòa tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn?	8
6.3.1 Ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ tan của chất rắn trong nước	8
6.4 Nồng độ dung dịch	8
6.4.1 Nồng độ % của dung dịch	8
6.4.2 Nồng độ mol của dung dịch	9
6.5 Thực hành pha chế dung dịch theo 1 nồng độ cho trước	10
6.6 Problems	11
6.6.1 Dung dịch	11
6.6.2 Độ tan của 1 chất trong nước	11

\*Independent Researcher, Ben Tre City, Vietnam

e-mail: [nguyenquanbahong@gmail.com](mailto:nguyenquanbahong@gmail.com); website: <https://nqbh.github.io>.

<sup>1</sup>URL: [https://github.com/NQBH/hobby/blob/master/elementary\\_chemistry/grade\\_8/NQBH\\_elementary\\_chemistry\\_grade\\_8.pdf](https://github.com/NQBH/hobby/blob/master/elementary_chemistry/grade_8/NQBH_elementary_chemistry_grade_8.pdf).

<sup>2</sup>URL: [https://github.com/NQBH/hobby/blob/master/elementary\\_chemistry/chemical\\_reaction/NQBH\\_chemical\\_reaction.pdf](https://github.com/NQBH/hobby/blob/master/elementary_chemistry/chemical_reaction/NQBH_chemical_reaction.pdf).

6.6.3	Nồng độ dung dịch . . . . .	12
<b>7</b>	<b>Tốc Độ Phản Ứng &amp; Chất Xúc Tác . . . . .</b>	<b>14</b>
	<b>Tài liệu . . . . .</b>	<b>14</b>

# 1 Physical- & Chemical Transformations – Biến Đổi Vật Lý & Biến Đổi Hóa Học

**Nội dung.** Biến đổi vật lý, biến đổi hóa học.

**Bài toán 1** (Tuần et al., 2023, p. 12). *Các hiện tượng sau mô tả hiện tượng chất bị biến đổi thành chất khác hay chỉ mô tả sự thay đổi về tính chất vật lý (trạng thái, kích thước, hình dạng, ...)? (a) Xé mẫu giấy vụn. (b) Hòa tan đường vào nước. (c) Đinh sắt bị uốn cong. (d) Đốt mẫu giấy vụn. (e) Đun đường. (f) Đinh sắt bị gỉ.*

## 1.1 Sự biến đổi chất

### 1.1.1 Sự biến đổi vật lý

**Định nghĩa 1** (Biến đổi vật lý). *Biến đổi vật lý là hiện tượng chất có sự biến đổi về trạng thái, kích thước, ... nhưng vẫn giữ nguyên là chất ban đầu.*

**Ví dụ 1.** *Nước hoa khuếch tán trong không khí, hòa tan đường vào nước, làm đá trong tủ lạnh, ... là các biến đổi vật lý.*

**Bài toán 2** (Tuần et al., 2023, 1, p. 13). *Kể thêm vài hiện tượng xảy ra trong thực tế có sự biến đổi vật lý.*

### 1.1.2 Sự biến đổi hóa học

**Định nghĩa 2** (Biến đổi hóa học). *Biến đổi hóa học là hiện tượng chất có sự biến đổi tạo ra chất khác.*

**Ví dụ 2.** *Quá trình tiêu hóa thức ăn, trứng để lâu ngày bị thối, nung đá vôi tạo thành vôi sống, ... là các biến đổi hóa học.*

**Bài toán 3** (Tuần et al., 2023, 2, p. 14). *Kể thêm vài hiện tượng xảy ra trong thực tế có sự biến đổi hóa học.*

## 1.2 Phân biệt sự biến đổi vật lý & sự biến đổi hóa học

**Bài toán 4** (Tuần et al., 2023, p. 14). *Gắn cây nến (có thành phần chính là paraffin) trên đĩa sứ, đốt nến cháy trong khoảng 1 phút. Mô tả các hiện tượng xảy ra trong quá trình nến cháy, chỉ ra giai đoạn diễn ra sự biến đổi vật lý, giai đoạn diễn ra sự biến đổi hóa học. Biết nến cháy trong không khí chủ yếu tạo ra khí carbon dioxide & hơi nước.*

**Bài toán 5** (Tuần et al., 2023, 3, p. 14). *Quá trình nào diễn ra sự biến đổi vật lý, quá trình nào diễn ra sự biến đổi hóa học? (a) Quả táo khi vẫn còn tươi → Quả táo để lâu ngày bị hỏng. (b) Vỏ lon nước ngọt → Vỏ lon nước ngọt bị bóp méo. (c) Bánh mì trước khi nướng → Bánh mì bị nướng cháy. (d) Hạt gạo → Bột gạo.*

**Bài toán 6** (Tuần et al., 2023, 4, p. 14). *Nêu những điểm khác nhau giữa sự biến đổi vật lý & sự biến đổi hóa học.*

**Bài toán 7** (Tuần et al., 2023, 3, p. 15). *Trường hợp nào diễn ra sự biến đổi vật lý, trường hợp nào diễn ra sự biến đổi hóa học? (a) Khi có dòng điện đi qua, dây tóc bóng đèn (làm bằng kim loại tungsten) nóng & sáng lên. (b) Hiện tượng băng tan. (c) Thức ăn bị ôi thiu. (d) Đốt cháy khí methane  $\text{CH}_4$  thu được khí carbon dioxide  $\text{CO}_2$  & hơi nước  $\text{H}_2\text{O}$ .*

Động Phong Nha (Động nước) là động tiêu biểu nhất của hệ thống hang động thuộc quần thể danh thắng Phong Nha-Kẻ Bàng. Đặc trưng của nơi đây là có nhiều thạch nhũ với các hình dáng đẹp, độc đáo. Hiện tượng thạch nhũ được tạo thành chủ yếu là do sự biến đổi hóa học. Ở các vùng núi đá vôi (thành phần chủ yếu là  $\text{CaCO}_3$ ), khi trời mưa, nước mưa kết hợp với  $\text{CO}_2$  trong không khí tạo thành môi trường acid, làm tan được đá vôi ( $\text{CaCO}_3$  chuyển hóa thành  $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ ). Khi nước có chứa  $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$  chảy qua các khe đá vào trong các hang động (ở đây có sự thay đổi về nhiệt độ & áp suất),  $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$  chuyển thành  $\text{CaCO}_3$  rắn, không tan. Lớp  $\text{CaCO}_3$  dần dần tích lại ngày càng nhiều, qua hàng triệu triệu năm tạo thành thạch nhũ với những hình thù đa dạng, đẹp mắt.

**Kiến thức cốt lõi.** **1** *Biến đổi vật lý* là hiện tượng chất có sự biến đổi về trạng thái, kích thước, ... nhưng vẫn giữ nguyên là chất ban đầu. **2** *Biến đổi hóa học* là hiện tượng chất có sự biến đổi tạo ra chất khác.


# 2 Chemical Reactions & Its Energy – Phản Ứng Hóa Học & Năng Lượng của Phản Ứng Hóa Học

**Nội dung.** Phản ứng hóa học, chất đầu & sản phẩm, sự sắp xếp khác nhau của các nguyên tử trong phân tử chất đầu & sản phẩm, 1 số dấu hiệu chứng tỏ có phản ứng hóa học xảy ra, phản ứng thu/tỏa nhiệt, các ứng dụng phổ biến của phản ứng tỏa nhiệt (đốt cháy than, xăng, dầu).

## 2.1 Phản ứng hóa học

**Định nghĩa 3** (Phản ứng hóa học, chất tham gia phản ứng, sản phẩm). *Quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là phản ứng hóa học. Chất ban đầu bị biến đổi trong phản ứng được gọi là chất tham gia phản ứng, chất tạo thành sau phản ứng được gọi là chất sản phẩm.*

**Ví dụ 3** (Tạo  $H_2O$ ). *Đốt cháy khí hydrogen trong không khí tạo ra ngọn lửa màu xanh, sau đó đưa ngọn lửa của khí hydrogen đang cháy vào trong bình đựng khí oxygen thì thấy khí hydrogen cháy mạnh hơn, sáng hơn, & trên thành bình xuất hiện những giọt nước nhỏ. Ở đây đã diễn ra sự biến đổi hóa học, trong đó xảy ra quá trình biến đổi hydrogen & oxygen tạo thành nước. Quá trình này đã xảy ra phản ứng hóa học.*



Hình 1: Thí nghiệm điều chế & đốt cháy khí hydrogen trong khí oxygen.

Trong thí nghiệm này, chất tham gia phản ứng là hydrogen  $H_2$ ,  $O_2$  & chất sản phẩm là nước  $H_2O$ .

**Bài toán 8** (Tuấn et al., 2023, 1, p. 16). *Quan sát hình 1, có những quá trình biến đổi hóa học nào xảy ra?*

**Ví dụ 4** (Tuấn et al., 2023, Ví dụ 1, p. 17). *Khi đun nóng hỗn hợp bột sắt & bột lưu huỳnh ta được hợp chất iron(II) sulfide  $FeS$ . Chất tham gia phản ứng là sắt & lưu huỳnh. Chất sản phẩm là iron(II) sulfide.*

**Ví dụ 5** (Tuấn et al., 2023, Ví dụ 2, p. 17). *Nến cháy trong không khí tạo thành khí carbon dioxide & hơi nước. Chất tham gia phản ứng là paraffin & oxygen. Chất sản phẩm là carbon dioxide & nước.*

**Bài toán 9** (Tuấn et al., 2023, 2, p. 17). *Xác định chất tham gia phản ứng & chất sản phẩm trong 2 trường hợp sau: (a) Đốt cháy methane tạo thành khí carbon dioxide & nước. (b) Carbon (thành phần chính của than) cháy trong khí oxygen tạo thành khí carbon dioxide.*

## 2.2 Diễn biến của phản ứng hóa học

Phản ứng hóa học xảy ra trong thí nghiệm khí hydrogen cháy trong oxygen tạo thành nước, quá trình đó được mô tả theo sơ đồ sau:




Hình 2: Sơ đồ mô tả phản ứng hóa học giữa khí hydrogen & khí oxygen tạo thành nước.

Ứng với phương trình hóa học:  $2H_2 + O_2 \xrightarrow{t^\circ} 2H_2O$ . Trong sơ đồ 2, các liên kết trong phân tử  $H_2$ ,  $O_2$  bị phá vỡ & hình thành liên kết mới giữa 1 nguyên tử O & 2 nguyên tử H.

Các biến đổi hóa học xảy ra khi có sự phá vỡ liên kết trong các chất tham gia phản ứng & sự hình thành các liên kết mới để tạo ra các chất sản phẩm. Trong phản ứng hóa học, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác, kết quả là chất này biến đổi thành chất khác. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước & sau phản ứng không thay đổi.

**Bài toán 10** (Tuấn et al., 2023, 3, p. 17). *Quan sát sơ đồ 2: (a) Trước phản ứng, những nguyên tử nào liên kết với nhau? (b) Sau phản ứng, những nguyên tử nào liên kết với nhau? (c) So sánh số nguyên tử H & số nguyên tử O trước & sau phản ứng.*

**Bài toán 11** (Tuấn et al., 2023, 1, p. 18). *Đốt cháy khí methane  $CH_4$  trong không khí thu được carbon dioxide  $CO_2$  & nước  $H_2O$  theo sơ đồ sau:*



Hình 3: Sơ đồ mô tả phản ứng đốt cháy khí methane trong không khí.

Quan sát sơ đồ 3: (a) Trước phản ứng có các chất nào, những nguyên tử nào liên kết với nhau? (b) Sau phản ứng, có các chất nào được tạo thành, những nguyên tử nào liên kết với nhau? (c) So sánh số nguyên tử C, H, O trước & sau phản ứng.

## 2.3 Dấu hiệu có phản ứng hóa học xảy ra

Để nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra có thể dựa vào các dấu hiệu sau:

**1** Có sự thay đổi màu sắc, mùi, ... của các chất; tạo ra chất khí hoặc chất không tan (kết tủa), ...

**Ví dụ 6.** (a) Trong phản ứng giữa khí hydrogen với khí oxygen, nước tạo ra không còn tính chất của hydrogen & oxygen nữa (nước ở thể lỏng, không cháy được, ...). (b) Trong phản ứng của sắt tác dụng với hydrochloric acid, quan sát thấy có bọt khí bay lên.

**Bài toán 12** (Tuấn et al., 2023, 4, p. 18). Chỉ ra sự khác biệt về tính chất của nước với hydrogen & oxygen.

Dấu hiệu có phản ứng hóa học xảy ra trong phản ứng phân hủy đường:

**Bài toán 13** (Tuấn et al., 2023, p. 18). Cho khoảng 1 thìa cafe đường ăn vào ống nghiệm, sau đó đun trên ngọn lửa đèn cồn. Mô tả trạng thái (thể, màu sắc, ...) của đường trước & sau khi đun. Nêu dấu hiệu chứng tỏ có phản ứng hóa học xảy ra.

**Bài toán 14** (Tuấn et al., 2023, p. 19). Nước đường để trong không khí 1 thời gian có vị chua. Trong trường hợp này, dấu hiệu nào chứng tỏ có phản ứng hóa học xảy ra?

**2** Có sự tỏa nhiệt & phát sáng: Sự tỏa nhiệt & phát sáng cũng có thể là dấu hiệu của phản ứng hóa học xảy ra.

**Ví dụ 7** (Tuấn et al., 2023, p. 19). Khi đốt nến, nến cháy có sự tỏa nhiệt & phát sáng.

**Bài toán 15** (Tuấn et al., 2023, 1, p. 19). Những dấu hiệu nào thường dùng để nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra?

## 2.4 Phản ứng thu/tỏa nhiệt

**Kiến thức cốt lõi.** **1** Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác. **2** Trong phản ứng hóa học, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác, kết quả là chất này biến đổi thành chất khác. **3** Dấu hiệu thường dùng để nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra: có sự thay đổi màu sắc, mùi, ... của các chất; tạo ra chất khí hoặc chất không tan (kết tủa); có sự tỏa nhiệt & phát sáng; ... **4** Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng tỏa ra năng lượng dưới dạng nhiệt. **5** Phản ứng thu nhiệt là phản ứng thu vào năng lượng dưới dạng nhiệt.

## 3 Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng. Phương Trình Hóa Học

**Kiến thức cốt lõi.** **1** Định luật bảo toàn khối lượng: Trong 1 phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng. **2** Trong 1 phản ứng có  $n$  chất ( $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$ ) (bao gồm cả chất tham gia phản ứng & chất sản phẩm), nếu biết khối lượng của  $(n - 1)$  chất thì có thể tính được khối lượng của chất còn lại. **3** Phương trình hóa học (PTHH) biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học bằng ký hiệu & CTHH. **4** Các bước lập PTHH: *Bước 1*: Viết sơ đồ phản ứng. *Bước 2*: So sánh số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong phân tử của các chất tham gia phản ứng & các chất sản phẩm. *Bước 3*: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố. *Bước 4*: Kiểm tra & viết PTHH. **5** Phương trình hóa học cho biết chất tham gia phản ứng, chất sản phẩm & tỷ lệ về số nguyên tử hoặc số phân tử giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng.

## 4 Mol & Tỷ Khối của Chất Khí

**Kiến thức cốt lõi.** **1** Mol là lượng chất có chứa  $6.022 \cdot 10^{23}$  nguyên tử hoặc phân tử của chất đó. **2** Khối lượng mol. (ký hiệu là  $M$ ) của 1 chất là khối lượng tính bằng gam của  $N$  nguyên tử hoặc phân tử chất đó. **3** Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi  $N$  phân tử của chất khí đó. Ở điều kiện chuẩn (áp suất 1 bar, nhiệt độ  $25^\circ\text{C}$ ), thể tích mol của các chất khí đều bằng 24.79 lít. **4** Công thức chuyển đổi giữa số mol  $n$  & khối lượng  $m$  chất:  $n = \frac{m}{M}$  mol. **5** Công thức chuyển đổi giữa số mol  $n$  & thể tích  $V$  của chất khí ở điều kiện chuẩn:  $n = \frac{V}{24.79}$  mol. **6** Công thức tính tỷ khối của khí A đối với khí B:  $d_{A/B} = \frac{M_A}{M_B}$ .

## 5 Tính Theo Phương Trình Hóa Học

**Kiến thức cốt lõi.** **1** Các bước tính khối lượng & số mol của chất tham gia, chất sản phẩm trong phản ứng hóa học: *Bước 1*: Viết PTHH của phản ứng. *Bước 2*: Tính số mol chất đã biết dựa vào khối lượng hoặc thể tích. *Bước 3*: Dựa vào PTHH để tìm số mol chất tham gia hoặc chất sản phẩm. *Bước 4*: Tính khối lượng hoặc thể tích của chất cần tìm. **2** Hiệu suất phản ứng là tỷ lệ giữa lượng sản phẩm thu được theo thực tế & lượng sản phẩm thu được theo lý thuyết.

## 6 Nông Độ Dung Dịch

**Nội dung.** Dung dịch là hỗn hợp lỏng đồng nhất của các chất đã tan trong nhau, độ tan của 1 chất trong nước, nồng độ %, nồng độ mol, thí nghiệm pha 1 dung dịch theo 1 nồng độ cho trước.

Các dung dịch thường có ghi kèm theo nồng độ xác định như nước muối sinh lý 0.9%, sulfuric acid 1 mol/L, ...

Khi hòa chất rắn vào nước, có chất tan nhiều, có chất tan ít, có chất không tan trong nước. Làm thế nào để so sánh khả năng hòa tan trong nước của các chất & xác định khối lượng chất tan có trong 1 dung dịch?

### 6.1 Dung dịch, chất tan, & dung môi

**Định nghĩa 4** (Chất tan, dung dịch, dung môi). Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch. Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi. Dung dịch là hỗn hợp (lỏng) đồng nhất của chất tan & dung môi.

**Thí nghiệm 1** (Trọng, Cương, and Hiên, 2022, Thí nghiệm 1, p. 135). Cho 1 thìa nhỏ đường vào cốc nước, khuấy nhẹ. Đường tan trong nước tạo thành nước đường. Nước đường là chất lỏng đồng nhất, không phân biệt được đâu là đường, đâu là nước. Ta nói: Đường là chất tan, nước là dung môi của đường, nước đường là dung dịch.

**Thí nghiệm 2** (Trọng, Cương, and Hiên, 2022, Thí nghiệm 2, p. 135). Cho 1 thìa nhỏ dầu ăn hoặc mỡ ăn vào cốc thứ nhất đựng xăng hoặc dầu hỏa, vào cốc thứ 2 đựng nước, khuấy nhẹ. Xăng hòa tan được dầu ăn, tạo thành dung dịch. Nước không hòa tan được dầu ăn. Ta nói: Xăng là dung môi của dầu ăn, nước không là dung môi của dầu ăn.

**Thí nghiệm 3** (Tuân et al., 2023, p. 36). Khi cho 1 thìa muối ăn vào cốc nước & khuấy đều, ta được dung dịch muối ăn, trong đó các hạt muối ăn bị tan ra & phân bố đều trong nước tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Trong quá trình này, muối ăn là chất tan, nước là dung môi, & nước muối là dung dịch.

#### 6.1.1 Dung dịch chưa bão hòa. Dung dịch bão hòa

**Thí nghiệm 4** (Trọng, Cương, and Hiên, 2022, Thí nghiệm, p. 136). Cho dần dần & liên tục đường vào cốc nước, khuấy nhẹ. Ở giai đoạn đầu, ta được dung dịch đường, dung dịch này vẫn có thể hòa tan thêm đường. Ta có dung dịch đường chưa bão hòa. Ở giai đoạn sau ta được 1 dung dịch đường không thể hòa tan thêm đường. Ta có dung dịch đường bão hòa.

Trong thực tế, dung môi thường là nước ở thể lỏng, chất tan có thể ở thể rắn, lỏng hoặc khí.

**Định nghĩa 5** (Dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa). Ở nhiệt độ, áp suất nhất định, dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan được gọi là dung dịch chưa bão hòa, dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan được gọi là dung dịch bão hòa.

**Nhận xét 1.** Về định nghĩa dung dịch chưa bão hòa & dung dịch bão hòa, chương trình Hóa Học 8 cũ (Trọng, Cương, and Hiên, 2022, Hóa Học 8) chỉ xét ở 1 nhiệt độ xác định, trong khi chương trình Hóa Học 8 cải cách: Khoa Học Tự nhiên 8 Cánh Diều (Tuân et al., 2023) & Khoa Học Tự Nhiên 8 Kết Nối Tri Thức với Cuộc Sống (Hùng et al., 2023) xét thêm yếu tố áp suất.

**Bài toán 16** (Hùng et al., 2023, p. 20, Nhận biết dung dịch, chất tan, & dung môi). Chuẩn bị: nước, muối ăn, sữa bột (hoặc bột sắn, bột gạo, ...), copper(II) sulfate; cốc thủy tinh, thìa khuấy.

Tiến hành: Cho khoảng 20 mL nước vào 4 cốc thủy tinh, đánh số (1), (2), (3), & (4). Cho vào cốc (1) 1 thìa (khoảng 3 g) muối ăn hạt, cốc (2) 1 thìa copper(II) sulfate, cốc (3) 1 thìa sữa bột, cốc (4) 4 thìa muối ăn. Khuấy đều  $\approx 2$  phút, sau đó để yên. (a) Trong các cốc (1), (2), (3), cốc nào chứa dung dịch? Dựa vào dấu hiệu nào để nhận biết? Chỉ ra chất tan, dung môi trong dung dịch thu được. (b) Phần dung dịch ở cốc (4) có phải là dung dịch bão hòa ở nhiệt độ phòng không? Giải thích.

**Bài toán 17** (Hùng et al., 2023, p. 20). Nêu cách pha dung dịch bão hòa của sodium carbonate  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  trong nước.

### 6.2 Độ tan của 1 chất trong nước

Trong cùng điều kiện về nhiệt độ & áp suất, khả năng tan trong cùng 1 dung môi của các chất là khác nhau. Với cùng 1 lượng dung môi xác định, những chất tan tốt cần lượng lớn chất tan để tạo dung dịch bão hòa, còn những chất tan kém chỉ cần 1 lượng nhỏ chất tan đã thu được dung dịch bão hòa. Để đặc trưng cho khả năng tan của mỗi chất, người ta dùng khái niệm *độ tan*.

#### 6.2.1 Chất tan & chất không tan

**Thí nghiệm 5** (Trọng, Cương, and Hiên, 2022, Thí nghiệm 1, p. 139). Lấy 1 lượng nhỏ calcium carbonate sạch  $\text{CaCO}_3$  cho vào nước cất, lắc mạnh. Lọc lấy nước lọc. Nhỏ vài giọt nước lọc trên tấm kính sạch. Làm bay hơi nước từ từ cho đến hết. Quan sát: Sau khi bay hơi nước, trên tấm kính không để lại dấu vết. Kết luận: Calcium carbonate không tan trong nước.

**Thí nghiệm 6** (Trọng, Cương, and Hiên, 2022, Thí nghiệm 2, p. 139). Thay muối calcium carbonate bằng muối ăn sodium chloride  $\text{NaCl}$  rồi làm thí nghiệm như trên. Quan sát: Sau khi bay hết hơi nước, trên tấm kính có vết mờ. Kết luận: Sodium chloride tan được trong nước.

Có chất không tan & có chất tan trong nước. Có chất tan nhiều & có chất tan ít trong nước.



## 6.2.2 Tính tan trong nước của 1 số acid, base, muối

- *Acid*: Hầu hết acid tan được trong nước, trừ acid silicic  $\text{H}_2\text{SiO}_3$ .
- *Base*: Phần lớn các base không tan trong nước, trừ 1 số như:  $\text{KOH}$ ,  $\text{NaOH}$ ,  $\text{Ba}(\text{OH})_2$ , còn  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  ít tan.
- *Muối*: (a) Những muối sodium  $\text{Na}_x\text{X}$ , potassium  $\text{K}_x\text{X}$  (với  $x$  là hóa trị của phi kim X) đều tan. (b) Những muối nitrate  $\text{X}(\text{NO}_3)_x$  đều tan (với  $x$  là hóa trị của kim loại X). (c) Phần lớn các muối chloride, sulfate tan được. Nhưng phần lớn muối carbonate không tan.

Xem thêm bảng tính tan của acid, base, muối.

## 6.2.3 Khái niệm độ tan của 1 chất trong nước

**Định nghĩa 6** (Độ tan). Độ tan (ký hiệu là  $S$ ) của 1 chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100 g nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở 1 nhiệt độ, áp suất xác định.


Hiển nhiên, độ tan của chất không tan trong nước là  $S = \frac{0}{100} \text{ g} = 0$ . Các chất khác nhau có độ tan khác nhau.

**Ví dụ 8** (Độ tan của muối ăn). Cho dần muối ăn vào cốc chứa 200 mL nước, khuấy đều cho đến khi muối ăn không thể hòa tan thêm được nữa, tách bỏ chất rắn không tan, ta thu được dung dịch bão hòa. Lượng muối ăn hòa tan trong 100 gam nước tạo thành dung dịch bão hòa ở  $20^\circ\text{C}$  là 35.9 gam. Người ta nói độ tan của muối ăn là 35.9 gam trong 100 gam nước ở  $20^\circ\text{C}$ .

**Ví dụ 9** (Trọng, Cương, and Hiền, 2022, p. 140). Ở  $25^\circ\text{C}$ , độ tan của đường trong nước là 204 g/100 g  $\text{H}_2\text{O}$ , độ tan của  $\text{NaCl}$  trong nước là 36 g/100 g  $\text{H}_2\text{O}$ , ở độ tan của  $\text{AgNO}_3$  là 222 g/100 g  $\text{H}_2\text{O}$ .


## 6.2.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan

(a) Độ tan của chất rắn trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ  $T$  ( $^\circ$ ). Trong nhiều trường hợp, khi tăng nhiệt độ thì độ tan của chất rắn cũng tăng theo. Số ít trường hợp, khi tăng nhiệt độ thì độ tan lại giảm.



Hình 4: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ tan của chất rắn.

(b) Độ tan của chất khí trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ & áp suất. Độ tan của chất khí trong nước sẽ tăng, nếu ta giảm nhiệt độ  $T$  & tăng áp suất  $p$ .



Hình 5: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ tan của chất khí.

## 6.2.5 Cách tính độ tan của 1 chất trong nước

**Bài toán 18** (Tuấn et al., 2023, p. 37). Tính độ tan của muối potassium chloride  $\text{KCl}$  ở  $20^\circ\text{C}$ , biết 50 gam nước hòa tan tối đa 17 gam muối.

**Giải.** Ở  $20^\circ\text{C}$ , 50 g nước hòa tan tối đa 17 g  $\text{KCl}$ . Ở  $20^\circ\text{C}$ , 100 g nước hòa tan tối đa  $S$  g  $\text{KCl}$ .  $\Rightarrow S = \frac{17 \cdot 100}{50} = 17 \cdot 2 = 34$  g/100 g  $\text{H}_2\text{O}$ . Vậy độ tan của potassium chloride trong nước ở  $20^\circ\text{C}$  là 34 g/100 g  $\text{H}_2\text{O}$ .  $\square$

**Bài toán 19** (Tuấn et al., 2023, 1, p. 37). *Tính độ tan của muối sodium nitrate  $\text{NaNO}_3$  ở  $0^\circ\text{C}$ , biết để tạo ra dung dịch  $\text{NaNO}_3$  bão hòa người ta cần hòa tan 14.2 g muối trong 20 g nước.*

Công thức tính độ tan của 1 chất ở nhiệt độ xác định là  $S = \frac{m_{\text{ct}} \cdot 100}{m_{\text{nước}}} \text{ (g/100 g H}_2\text{O)}$ , trong đó:  $S$  là độ tan, đơn vị g/100 g nước;  $m_{\text{ct}}$  là khối lượng của chất tan được hòa tan trong nước để tạo thành dung dịch bão hòa, có đơn vị là gam;  $m_{\text{nước}}$  là khối lượng của nước, có đơn vị là gam.

### 6.3 Làm thế nào để quá trình hòa tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn?

Muốn quá trình hòa tan xảy ra nhanh hơn, ta thực hiện các biện pháp sau:

1. *Khuấy dung dịch*: Sự khuấy làm cho chất rắn bị hòa tan nhanh hơn, vì nó luôn luôn tạo ra sự tiếp xúc mới giữa chất rắn & các phân tử nước.
2. *Dun nóng dung dịch*: Dun nóng dung dịch làm cho chất rắn bị hòa tan nhanh hơn. Vì ở nhiệt độ càng cao, các phân tử nước chuyển động càng nhanh, làm tăng dần số lần va chạm giữa các phân tử nước với bề mặt chất rắn.
3. *Nghiền nhỏ chất rắn*: Kích thước của chất rắn càng nhỏ thì chất rắn bị hòa tan càng nhanh, vì gia tăng diện tích tiếp xúc giữa chất rắn với các phân tử nước.

#### 6.3.1 Ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ tan của chất rắn trong nước

Khi tăng nhiệt độ, độ tan của hầu hết các chất rắn như đường, muối ăn, ... đều tăng. Có 1 số chất khi tăng nhiệt độ, độ tan lại giảm.

**Ví dụ 10** (Độ tan của  $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ ). *Độ tan của đường ăn trong nước ở  $30^\circ$  là 216.7 g trong khi ở  $60^\circ$  là 288.8 g.*

**Bài toán 20** (Tuấn et al., 2023, 2, p. 37). (a) *Có thể hòa tan tối đa bao nhiêu gam đường ăn trong 250 g nước ở  $30^\circ\text{C}$ ?* (b) *Có thể hòa tan tối đa bao nhiêu gam đường ăn trong 250 g nước ở  $60^\circ\text{C}$ ?*

**Bài toán 21** (Hùng et al., 2023, 1, p. 21). *Ở nhiệt độ  $25^\circ\text{C}$ , khi cho 12 g muối X vào 20 g nước, khuấy kỹ thì còn lại 5 g muối không tan. Tính độ tan của muối X.*

**Bài toán 22** (Hùng et al., 2023, 2, p. 21). *Ở nhiệt độ  $18^\circ\text{C}$ , khi hòa tan hết 53 g  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  trong 250 g nước thì được dung dịch bão hòa. Tính độ tan của  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  trong nước ở nhiệt độ trên.*

**Ví dụ 11** (Hùng et al., 2023, p. 21). (a) *Ngày nóng, cá thường ngoi lên phía mặt nước để hô hấp vì độ tan của oxygen trong nước đã bị giảm đi khi nhiệt độ tăng.* (b) *Trong sản xuất nước ngọt có gas, người ta nén khí carbon dioxide ở áp suất cao để tăng độ tan của khí này trong nước.*

Nói chung, độ tan của hầu hết chất khí giảm khi nhiệt độ tăng hoặc áp suất giảm.

### 6.4 Nồng độ dung dịch

Để biểu thị lượng chất tan có trong 1 lượng dung môi hoặc lượng dung dịch cụ thể người ta dùng khái niệm *nồng độ dung dịch* (hay: để định lượng 1 dung dịch đặc hay loãng, người ta dùng đại lượng *nồng độ*). Có 2 loại nồng độ dung dịch thường được sử dụng là *nồng độ %* & *nồng độ mol*.

#### 6.4.1 Nồng độ % của dung dịch

**Định nghĩa 7** (Nồng độ %). *Nồng độ phần trăm (ký hiệu là  $C\%$ ) của 1 dung dịch là số gam chất tan có trong 100 g dung dịch.*

Công thức tính nồng độ % của dung dịch là:  $C\% = \frac{m_{\text{ct}}}{m_{\text{dd}}} \cdot 100\%$ , trong đó:  $C\%$  là nồng độ % của dung dịch, đơn vị %;  $m_{\text{ct}}$  là khối lượng chất tan, có đơn vị là gam;  $m_{\text{dd}}$  là khối lượng dung dịch, có đơn vị là gam. Khối lượng dung dịch bằng tổng khối lượng chất tan & khối lượng dung môi:  $m_{\text{dd}} = m_{\text{ct}} + m_{\text{dm}}$  với  $m_{\text{dm}}$  là khối lượng dung môi.

Khối lượng dung dịch = khối lượng chất tan + khối lượng dung môi.

**Bài toán 23** (Trọng, Cường, and Hiền, 2022, Thí dụ 1, p. 143). *Hòa tan 15 g  $\text{NaCl}$  (natri clorua/sodium chloride) vào 45 g nước. Tính nồng độ % của dung dịch.*

*Giải.* Khối lượng của dung dịch  $\text{NaCl}$ :  $m_{\text{dd}} = m_{\text{NaCl}} + m_{\text{H}_2\text{O}} = 15 + 45 = 60 \text{ g}$ . Nồng độ % của dung dịch  $\text{NaCl}$ :  $C\% = \frac{m_{\text{NaCl}}}{m_{\text{dd}}} \cdot 100\% = \frac{15}{60} \cdot 100\% = 25\%$ .  $\square$

**Bài toán 24** (Tuấn et al., 2023, Ví dụ 1, p. 38). *Hòa tan 20 g đường ăn trong 60 g nước thu được dung dịch đường. Tính  $C\%$  của dung dịch đường đó.*

*Giải.* Khối lượng dung dịch đường:  $m_{\text{dd}} = m_{\text{đường}} + m_{\text{nước}} = 20 + 60 = 80 \text{ g}$ . Nồng độ % của dung dịch:  $C\% = \frac{20 \cdot 100}{80} = 25\%$ .  $\square$



Nếu biết được nồng độ % của dung dịch thì ta có thể xác định được khối lượng chất tan & khối lượng dung dịch theo các biểu thức sau:

$$m_{ct} = \frac{m_{dd}C\%}{100}, m_{dd} = \frac{m_{ct} \cdot 100}{C\%} = \frac{100m_{ct}}{C\%}, m_{dm} = m_{dd} - m_{ct} = \frac{100m_{ct}}{C\%} - \frac{m_{dd}C\%}{100}.$$

**Bài toán 25** (Trọng, Cường, and Hiền, 2022, Thí dụ 2, p. 143). 1 dung dịch  $H_2SO_4$  có nồng độ 14%. Tính khối lượng  $H_2SO_4$  có trong 150 g dung dịch.

*Giải.* Khối lượng  $H_2SO_4$  có trong 150 g dung dịch 14%:  $m_{H_2SO_4} = \frac{m_{dd}C\%}{100} = \frac{150 \cdot 14}{100} = 21$  g. □

**Bài toán 26** (Trọng, Cường, and Hiền, 2022, Thí dụ 3, p. 144). Hòa tan 50 g đường vào nước, được dung dịch đường có nồng độ 25%. Tính: (a) Khối lượng dung dịch đường pha chế được. (b) Khối lượng nước cần dùng cho sự pha chế.

*Giải.* (a) Khối lượng dung dịch đường pha chế được:  $m_{dd} = m_{dd} = \frac{m_{đường} \cdot 100}{C\%} = \frac{50 \cdot 100}{25} = 200$  g. (b) Khối lượng nước cần dùng cho sự pha chế:  $m_{H_2O} = m_{dd} - m_{đường} = 200 - 50 = 150$  g. □

**Bài toán 27** (Tuấn et al., 2023, Ví dụ 2, p. 38). Muốn pha 300 g dung dịch muối  $CuSO_4$  10% cần dùng bao nhiêu g muối & bao nhiêu g nước?

*Giải.* Khối lượng chất tan cần dùng là:  $m_{muối} = \frac{m_{dd} \cdot C\%}{100} = \frac{300 \cdot 10}{100} = 30$  g. Khối lượng nước cần dùng là:  $m_{nước} = m_{dd} - m_{muối} = 300 - 30 = 270$  g. □

**Bài toán 28** (Tuấn et al., 2023, 1, p. 38). Dung dịch D-glucose 5% được sử dụng trong y tế làm dịch truyền, nhằm cung cấp nước & năng lượng cho bệnh nhân bị suy nhược cơ thể hoặc sau phẫu thuật. Biết trong 1 chai dịch truyền có chứa 25 g đường D-glucose. Tính lượng dung dịch & lượng nước có trong chai dịch truyền đó.

**Bài toán 29** (Tuấn et al., 2023, 2, p. 38). Từ muối ăn, nước, & những dụng cụ cần thiết, nêu cách pha 500 g dung dịch nước muối 0.9%.

**Thí nghiệm 7** (Pha chế 100 g dung dịch đường ăn (saccharose)  $C_{12}H_{22}O_{11}$  15%). Chuẩn bị: Dụng cụ: Cân điện tử, cốc thủy tinh (loại 250 mL), đĩa thủy tinh. Hóa chất: Đường ăn, nước cất.

Tiến hành: Bước 1: Cân chính xác 15 g đường ăn cho vào cốc dung tích 250 mL. Bước 2: Cân lấy 85 g nước cất, rồi cho dần vào cốc & khuấy nhẹ cho tới khi đường tan hết, thu được 100 g dung dịch đường nồng độ 15%.

**Bài toán 30** (Hùng et al., 2023, p. 21). Dung dịch nước oxy già chứa chất tan hydrogen peroxide  $H_2O_2$ . Tính khối lượng hydrogen peroxide có trong 20 g dung dịch nước oxy già 3%.

*Giải.* Khối lượng hydrogen peroxide có trong 20 g dung dịch nước oxy già 3%:  $m_{H_2O_2} = \frac{m_{dd} \cdot C\%}{100\%} = \frac{20 \cdot 3}{100} = 0.6$  g. □

#### 6.4.2 Nồng độ mol của dung dịch

**Định nghĩa 8** (Nồng độ mol). Nồng độ mol (ký hiệu là  $C_M$ ) của 1 dung dịch là số mol chất tan có trong 1 L dung dịch. Đơn vị của nồng độ mol là mol/L & thường được ký hiệu là M.

Công thức tính nồng độ mol của dung dịch:  $C_M = \frac{n}{V}$ , trong đó:  $C_M$  là nồng độ mol của dung dịch, có đơn vị là mol/L & thường được biểu diễn là M;  $n$  là số mol chất tan, có đơn vị là mol,  $V$  là thể tích dung dịch, có đơn vị là lít (L).

**Bài toán 31** (Trọng, Cường, and Hiền, 2022, Thí dụ 1, p. 144). Trong 200 mL dung dịch có hòa tan 16 g  $CuSO_4$ . Tính nồng độ mol của dung dịch.

*Giải.* Số mol  $CuSO_4$  có trong dung dịch:  $n_{CuSO_4} = \frac{m_{CuSO_4}}{M_{CuSO_4}} = \frac{16}{160} = 0.1$  mol. Nồng độ mol của dung dịch  $CuSO_4$ :  $C_M = \frac{n_{CuSO_4}}{V} = \frac{0.1}{0.2} = 0.5$  mol/L = 0.5M. □

**Bài toán 32** (Trọng, Cường, and Hiền, 2022, Thí dụ 2, p. 144). Trộn 2 L dung dịch đường 0.5M với 3 L dung dịch đường 1M. Tính nồng độ mol của dung dịch đường sau khi trộn.

*Giải.* Số mol đường có trong dung dịch 1:  $n_1 = C_{M1}V_1 = 0.5 \cdot 2 = 1$  mol. Số mol đường có trong dung dịch 2:  $n_2 = C_{M2}V_2 = 1 \cdot 3 = 3$  mol. Thể tích của dung dịch đường sau khi trộn:  $V = V_1 + V_2 = 2 + 3 = 5$  L. Nồng độ mol của dung dịch đường sau khi trộn:  $C_M = \frac{n}{V} = \frac{n_1 + n_2}{V} = \frac{3 + 1}{5} = \frac{4}{5} = 0.8$ M. □

**Bài toán 33** (Tuấn et al., 2023, Ví dụ 3, p. 39). Hòa tan hoàn toàn 4.2 g sodium hydrogencarbonate  $NaHCO_3$  trong nước thu được 500 mL dung dịch. Tính nồng độ của dung dịch này.

*Giải.* Số mol của  $NaHCO_3$  có trong dung dịch là:  $n_{NaHCO_3} = \frac{4.2}{84} = 0.05$  mol. Nồng độ mol của dung dịch  $NaHCO_3$  là:  $C_M = \frac{0.05}{0.5} = 0.1$ M. □

Nếu biết được nồng độ mol của dung dịch ta có thể xác định được số mol chất tan & thể tích dung dịch theo các biểu thức sau:

$$n = C_M V, \quad V = \frac{n}{C_M}.$$

**Bài toán 34** (Tuấn et al., 2023, 3, p. 39). Tính số g chất tan cần pha để pha chế 100 mL dung dịch  $\text{CuSO}_4$  0.1 M.

Có nhiều cách khác nhau để biểu thị nồng độ dung dịch. Để thuận tiện cho việc nghiên cứu, ngoài việc sử dụng nồng độ % & nồng độ mol, các nhà khoa học còn sử dụng thêm các loại nồng độ khác như nồng độ đương lượng & nồng độ molan.

**Thí nghiệm 8** (Pha chế dung dịch sodium bicarbonate 0.2 M). Sodium bicarbonate (hay còn gọi là sodium hydrogencarbonate,  $\text{NaHCO}_3$ ) là thành phần chính của thuốc muối được sử dụng nhiều trong chế biến thực phẩm, y tế, vệ sinh vật dụng trong gia đình, ... Để pha chế 100 mL dung dịch sodium bicarbonate 0.2 M có thể thực hiện theo thí nghiệm sau:

Chuẩn bị: Dụng cụ: Cân điện tử, phễu thủy tinh, ống đong, bình tam giác (loại 250 mL). Hóa chất:  $\text{NaHCO}_3$ , nước cất.

Tiến hành: Bước 1: Cân chính xác 1.68 g muối  $\text{NaHCO}_3$  cho vào bình tam giác. Bước 2: Thêm 100 mL nước cất vào bình tam giác, khuấy đều cho muối tan hết, thu được dung dịch  $\text{NaHCO}_3$  0.2 M (1 cách gần đúng có thể coi thể tích dung dịch muối  $\text{NaHCO}_3$  là 100 mL).

**Bài toán 35** (Tuấn et al., 2023, p. 40). Glucose được tạo ra từ các quá trình chuyển hóa thực phẩm & là 1 trong các nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể chúng ta. Với người bình thường, nồng độ glucose trong máu luôn được duy trì ổn định. Tìm hiểu & cho biết chỉ số nồng độ glucose trong máu của người bình thường nằm trong khoảng nào. Nếu chỉ số nồng độ glucose trong máu của 1 người lớn hơn mức bình thường thì người đó có nguy cơ mắc bệnh gì?

**Bài toán 36** (Hùng et al., 2023, p. 22). Hòa tan hoàn toàn 1.35 g copper(II) chloride vào nước, thu được 50 mL dung dịch. Tính nồng độ mol của dung dịch copper(II) chloride thu được.

Giải. Số mol chất tan:  $n_{\text{CuCl}_2} = \frac{m_{\text{CuCl}_2}}{M_{\text{CuCl}_2}} = \frac{1.35}{135} = 0.01$  mol. Đổi đơn vị: 50 mL = 0.05 L. Nồng độ mol dung dịch copper(II) chloride là:  $C_M(\text{CuCl}_2) = \frac{n_{\text{CuCl}_2}}{V} = \frac{0.01}{0.05} = 0.2$  mol/L.  $\square$

**Bài toán 37** (Hùng et al., 2023, 1, p. 22). Tính khối lượng  $\text{H}_2\text{SO}_4$  có trong 20 g dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  98%.

**Bài toán 38** (Hùng et al., 2023, 2, p. 22). Trộn lẫn 2 L dung dịch urea 0.02 M (dung dịch A) với 3 L dung dịch urea 0.1 M (dung dịch B), thu được 5 L dung dịch C. (a) Tính số mol urea trong dung dịch A, B, & C. (b) Tính nồng độ mol của dung dịch C. Nhận xét về giá trị nồng độ mol của dung dịch C so với nồng độ mol của dung dịch A, B.

## 6.5 Thực hành pha chế dung dịch theo 1 nồng độ cho trước

**Thí nghiệm 9** (Hùng et al., 2023, p. 23, Pha 100 g dung dịch muối ăn nồng độ 0.9%). Chuẩn bị: muối ăn khan, nước cất; cốc thủy tinh, cân, ống đong.

Tiến hành: Xác định khối lượng muối ăn  $m_1$  & nước  $m_2$  dựa vào công thức:  $C\% = \frac{m_{\text{ct}}}{m_{\text{dd}}} \cdot 100\%$ . Cân  $m_1$  g muối ăn rồi cho vào cốc thủy tinh. Cân  $m_2$  g nước cất, rót vào cốc, lắc đều cho muối tan hết.

(a) Tại sao phải dùng muối ăn khan để pha dung dịch? (b) Dung dịch muối ăn nồng độ 0.9% có thể được dùng để làm gì?

**Ví dụ 12** (Oresol). Oresol (abbr., Oral Rehydration Solution) là 1 loại dung dịch có tác dụng bù nước & điện giải. Trong Oresol có 1 số thành phần chính là: sodium chloride, sodium bicarbonate, potassium chloride, glucose. Nồng độ các chất trong 1 loại dung dịch Oresol được WHO & UNICEF khuyến dùng là ion sodium: 0.075 mol/L, ion chloride: 0.065 mol/L, ion potassium: 0.020 mol/L, ion citrate: 0.010 mol/L, glucose: 0.075 mol/L, ...

Có thể pha chế: (a) 1 dung dịch có nồng độ xác định để làm thí nghiệm. (b) Pha chế dung dịch nước muối 0.9% (có thể dùng thay nước muối sinh lý trong 1 số trường hợp).

**Kiến thức cốt lõi.** **1** Dung dịch là hỗn hợp lỏng đồng nhất của chất tan & dung môi. **2** Ở nhiệt độ & áp suất nhất định: Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan. Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan. **3** Độ tan (ký hiệu là  $S$ ) của 1 chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở 1 nhiệt độ, áp suất xác định:  $S = \frac{m_{\text{ct}}}{m_{\text{nước}}} \cdot 100$  ( $S$ : độ tan,  $m_{\text{ct}}$ : khối lượng chất tan,  $m_{\text{nước}}$ : khối lượng nước). Nói chung, độ tan của chất rắn sẽ tăng nếu tăng nhiệt độ. Độ tan của chất khí sẽ tăng nếu giảm nhiệt độ & tăng áp suất. **4** Nồng độ phần % (ký hiệu là  $C\%$ ) của 1 dung dịch là số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch:  $C\% = \frac{m_{\text{ct}} \cdot 100\%}{m_{\text{dd}}}$  ( $C\%$ : nồng độ %,  $m_{\text{ct}}$ : khối lượng chất tan,  $m_{\text{dd}}$ : khối lượng dung dịch). **5** Nồng độ mol (ký hiệu là  $C_M$ ) của 1 dung dịch là số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.  $C_M = \frac{n_{\text{ct}}}{V_{\text{dd}}}$  mol/L ( $C_M$ : nồng độ mol,  $n_{\text{ct}}$ : số mol chất tan,  $V_{\text{dd}}$ : thể tích dung dịch). **6** Muốn chất rắn tan nhanh trong nước, ta thực hiện 1, 2, hoặc cả 3 biện pháp: Khuấy dung dịch, đun nóng dung dịch, nghiền nhỏ chất rắn.

## 6.6 Problems

### 6.6.1 Dung dịch

**Bài toán 39** (Trọng, Cường, and Hiền, 2022, 1., p. 138). Thế nào là dung dịch, dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa? Cho ví dụ.

**Bài toán 40** (Trọng, Cường, and Hiền, 2022, 2., p. 138). Mô tả những thí nghiệm chứng minh rằng muốn hòa tan nhanh 1 chất rắn trong nước ta có thể chọn những biện pháp: nghiền nhỏ chất rắn, đun nóng, khuấy dung dịch.

**Bài toán 41** (Trọng, Cường, and Hiền, 2022, 3., p. 138). Mô tả cách tiến hành những thí nghiệm sau: (a) Chuyển đổi từ 1 dung dịch NaCl bão hòa thành 1 dung dịch chưa bão hòa (ở nhiệt độ phòng). (b) Chuyển đổi từ 1 dung dịch NaCl chưa bão hòa thành 1 dung dịch bão hòa (ở nhiệt độ phòng).

**Bài toán 42** (Trọng, Cường, and Hiền, 2022, 4., p. 138). Cho biết ở nhiệt độ phòng thí nghiệm ( $\approx 20^\circ \text{C}$ ), 10 g nước có thể hòa tan tối đa 20 g đường; 3.6 g muối ăn. (a) Dẫn ra những ví dụ về khối lượng của đường, muối ăn để tạo ra những dung dịch chưa bão hòa với 10 g nước. (b) Có nhận xét gì nếu người ta khuấy 25 g đường vào 10 g nước; 3.5 g muối ăn vào 10 g nước (nhiệt độ phòng thí nghiệm)?

**Bài toán 43** (Trọng, Cường, and Hiền, 2022, 5., p. 138). Trộn 1 ml rượu etylic (cồn) với 10 ml nước cất. Câu nào diễn đạt đúng? A. Chất tan là rượu etylic, dung môi là nước. B. Chất tan là nước, dung môi là rượu etylic. C. Nước hoặc rượu etylic có thể là chất tan hoặc là dung môi. D. Cả 2 chất nước & rượu etylic vừa là chất tan, vừa là dung môi.

**Bài toán 44** (Trọng, Cường, and Hiền, 2022, 6., p. 138). Đ/S? Dung dịch là hỗn hợp: A. Của chất rắn trong chất lỏng. B. Của chất khí trong chất lỏng. C. Đồng nhất của chất rắn & dung môi. D. Đồng nhất của dung môi & chất tan.

**Bài toán 45** (Cường et al., 2022, 40.1, p. 56). Trong phòng thí nghiệm có sẵn 1 dung dịch NaCl. Bằng phương pháp thực nghiệm, xác định dung dịch NaCl này là bão hòa hay chưa bão hòa. Trình bày cách làm.

**Giải.** Lấy khoảng 50 mL dung dịch NaCl cho vào bình tam giác. Cân 1 lượng muối tinh khiết NaCl (e.g., 1 g NaCl) cho vào bình đựng dung dịch NaCl, lắc kỹ 1 thời gian. Nếu: (a) Có hiện tượng 1 phần hoặc toàn lượng NaCl bị hòa tan, ta kết luận dung dịch NaCl ban đầu là chưa bão hòa ở nhiệt độ phòng. Không xảy ra hiện tượng gì (lượng NaCl thêm vào bình không bị hòa tan), ta kết luận dung dịch NaCl ban đầu là bão hòa ở nhiệt độ phòng.  $\square$

### 6.6.2 Độ tan của 1 chất trong nước

**Bài toán 46** (Trọng, Cường, and Hiền, 2022, 1., p. 142). Đ/S? Độ tan của 1 chất trong nước ở nhiệt độ xác định là: A. Số gam chất đó có thể tan trong 100 g dung dịch. B. Số gam chất đó có thể tan trong 100 g nước. C. Số gam chất đó có thể tan trong 100 g dung môi để tạo thành dung dịch bão hòa. D. Số gam chất đó có thể tan trong 100 g nước để tạo thành dung dịch bão hòa.


**Bài toán 47** (Trọng, Cường, and Hiền, 2022, 2., p. 142). Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của các chất rắn trong nước: A. Luôn tăng. B. Luôn giảm. C. Phần lớn là tăng. D. Phần lớn là giảm. E. Không tăng & cũng không giảm.

**Bài toán 48** (Trọng, Cường, and Hiền, 2022, 3., p. 142). Khi giảm nhiệt độ & tăng áp suất thì độ tan của chất khí trong nước: A. Luôn tăng. B. Luôn giảm. C. Có thể tăng & có thể giảm. D. Không tăng & cũng không giảm.

**Bài toán 49** (Trọng, Cường, and Hiền, 2022, 4., p. 142). Dựa vào đồ thị về độ tan của các chất rắn trong nước 6, cho biết độ tan của các muối  $\text{NaNO}_3$ ,  $\text{KBr}$ ,  $\text{KNO}_3$ ,  $\text{NH}_4\text{Cl}$ ,  $\text{NaCl}$ ,  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  ở nhiệt độ  $10^\circ\text{C}$  &  $60^\circ\text{C}$ .


**Bài toán 50** (Trọng, Cường, and Hiền, 2022, 5., p. 142). Xác định độ tan của muối  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  trong nước ở  $18^\circ\text{C}$ . Biết ở nhiệt độ này khi hòa tan hết 53 g  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  trong 250 g nước thì được dung dịch bão hòa.

**Bài toán 51** (Cường et al., 2022, 41.1, p. 56). Căn cứ vào đồ thị sau về độ tan của chất rắn trong nước, ước tính độ tan của các muối  $\text{NaNO}_3$ ,  $\text{KBr}$ ,  $\text{KNO}_3$ ,  $\text{NH}_4\text{Cl}$ ,  $\text{NaCl}$ ,  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  ở nhiệt độ: (a)  $20^\circ\text{C}$ . (b)  $40^\circ\text{C}$ .



Hình 6: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ tan của chất rắn.

**Bài toán 52** (Cương et al., 2022, 41.2, p. 56). Căn cứ vào đồ thị về độ tan của chất khí trong nước, ước lượng độ tan của các khí  $\text{NO}$ ,  $\text{O}_2$ ,  $\text{N}_2$  ở  $20^\circ\text{C}$ . Cho biết có bao nhiêu milliliter những khí trên tan trong 1 L nước. Biết ở  $20^\circ\text{C}$  & 1 atm, 1 mol chất khí có thể tích là 24 L & khối lượng riêng của nước là 1 g/mL.



Hình 7: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ tan của chất khí.

**Bài toán 53** (Cương et al., 2022, 41.3, p. 56). Tính khối lượng muối natri clorua  $\text{NaCl}$  có thể tan trong 750 g nước ở  $25^\circ\text{C}$ . Biết ở nhiệt độ này độ tan của  $\text{NaCl}$  là 36.2 g.

**Bài toán 54** (Cương et al., 2022, 41.4, p. 56). Tính khối lượng muối  $\text{AgNO}_3$  có thể tan trong 250 g nước ở  $25^\circ\text{C}$ . Biết độ tan của  $\text{AgNO}_3$  ở  $25^\circ\text{C}$  là 222 g.

**Bài toán 55** (Cương et al., 2022, 41.5\*, p. 56). Biết độ tan của muối  $\text{KCl}$  ở  $20^\circ\text{C}$  là 34 g. 1 dung dịch  $\text{KCl}$  nóng có chứa 50 g  $\text{KCl}$  trong 130 g  $\text{H}_2\text{O}$  được làm lạnh về nhiệt độ  $20^\circ\text{C}$ . Cho biết: (a) Có bao nhiêu g  $\text{KCl}$  tan trong dung dịch. (b) Có bao nhiêu g  $\text{KCl}$  tách ra khỏi dung dịch.

**Bài toán 56** (Cương et al., 2022, 41.6, p. 57). 1 dung dịch có chứa 26.5 g  $\text{NaCl}$  trong 75 g  $\text{H}_2\text{O}$  ở  $25^\circ\text{C}$ . Xác định dung dịch  $\text{NaCl}$  nói trên là chưa bão hòa hay bão hòa. Biết độ tan của  $\text{NaCl}$  trong nước ở  $25^\circ\text{C}$  là 36 g.

**Bài toán 57** (Cương et al., 2022, 41.7, p. 57). Có bao nhiêu g  $\text{NaNO}_3$  sẽ tách ra khỏi 200 g dung dịch bão hòa  $\text{NaNO}_3$  ở  $50^\circ\text{C}$ , nếu dung dịch này được làm lạnh đến  $20^\circ\text{C}$ ? Biết  $S_{\text{NaNO}_3(50^\circ\text{C})} = 114$  g,  $S_{\text{NaNO}_3(20^\circ\text{C})} = 88$  g.

### 6.6.3 Nồng độ dung dịch

**Bài toán 58** (Trọng, Cương, and Hiền, 2022, 1., p. 145). Bằng cách nào có được 200 g dung dịch  $\text{BaCl}_2$  5%? A. Hòa tan 190 g  $\text{BaCl}_2$  trong 10 g nước. B. Hòa tan 10 g  $\text{BaCl}_2$  trong 190 g nước. C. Hòa tan 100 g  $\text{BaCl}_2$  trong 100 g nước. D. Hòa tan 200 g  $\text{BaCl}_2$  trong 10 g nước. E. Hòa tan 10 g  $\text{BaCl}_2$  trong 200 g nước.

**Bài toán 59** (Trọng, Cương, and Hiền, 2022, 2., p. 145). Tính nồng độ mol của 850 mL dung dịch có hòa tan 20 g  $\text{KNO}_3$ . A. 0.233M. B. 23.3M. C. 2.33M. D. 233M.

**Bài toán 60** (Trọng, Cương, and Hiền, 2022, 3., p. 146). Tính nồng độ mol của mỗi dung dịch sau: (a) 1 mol  $\text{KCl}$  trong 750 mL dung dịch. (b) 0.5 mol  $\text{MgCl}_2$  trong 1.5 L dung dịch. (c) 400 g  $\text{CuSO}_4$  trong 4 L dung dịch. (d) 0.06 mol  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  trong 1500 mL dung dịch.

**Bài toán 61** (Trọng, Cương, and Hiền, 2022, 4., p. 146). Tính số mol & số gam chất tan trong mỗi dung dịch sau: (a) 1 L dung dịch  $\text{NaCl}$  0.5M. (b) 500 mL dung dịch  $\text{KNO}_3$  2M. (c) 250 mL dung dịch  $\text{CaCl}_2$  0.1M. (d) 2 L dung dịch  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  0.3M.

**Bài toán 62** (Trọng, Cương, and Hiền, 2022, 5., p. 146). Tính nồng độ % của những dung dịch sau: (a) 20 g  $\text{KCl}$  trong 600 g dung dịch. (b) 32 g  $\text{NaNO}_3$  trong 2 kg dung dịch. (c) 75 g  $\text{K}_2\text{SO}_4$  trong 1500 g dung dịch.

**Bài toán 63** (Trọng, Cương, and Hiền, 2022, 6., p. 146). Tính số gam chất tan cần dùng để pha chế mỗi dung dịch sau: (a) 2.5 L dung dịch  $\text{NaCl}$  0.9M. (b) 50 g dung dịch  $\text{MgCl}_2$  4%. (c) 250 mL dung dịch  $\text{MgSO}_4$  0.1M.

**Bài toán 64** (Trọng, Cương, and Hiền, 2022, 7., p. 146). Ở nhiệt độ  $25^\circ\text{C}$ , độ tan của muối ăn là 36 g, của đường là 204 g. Tính nồng độ % của các dung dịch bão hòa muối ăn & đường ở nhiệt độ trên.

**Bài toán 65** (Cương et al., 2022, 42.1, p. 57). Chọn câu trả lời đúng nhất & chỉ ra chỗ sai của câu trả lời không đúng sau: (a) Nồng độ % của dung dịch cho biết: 1. Số gam chất tan trong 100 g dung môi. 2. Số gam chất tan trong 100 g dung dịch. 3. Số gam chất tan trong 1 L dung dịch. 4. Số gam chất tan trong 1 L dung môi. 5. Số gam chất tan trong 1 lượng dung dịch xác định. (b) Nồng độ mol của dung dịch cho biết: 1. Số gam chất tan trong 1 L dung dịch. 2. Số mol chất tan trong 1 L dung dịch. 3. Số mol chất tan trong 1 L dung môi. 4. Số gam chất tan trong 1 L dung môi. 5. Số mol chất tan trong 1 thể tích xác định dung dịch.

**Bài toán 66** (Cương et al., 2022, 42.2, p. 57). Trong phòng thí nghiệm có các lọ đựng dung dịch  $\text{NaCl}$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{NaOH}$  có cùng nồng độ là 0.5M. (a) Lấy 1 ít mỗi dung dịch trên vào ống nghiệm riêng biệt. Hỏi phải lấy như thế nào để có số mol chất tan có trong mỗi ống nghiệm là bằng nhau? (b) Nếu thể tích dung dịch có trong mỗi ống nghiệm là 5 mL, tính số gam chất tan có trong mỗi ống nghiệm.



**Bài toán 67** (Cương et al., 2022, 42.3, p. 58). Để xác định độ tan của 1 muối trong nước bằng phương pháp thực nghiệm, người ta dựa vào những kết quả như sau: Nhiệt độ của dung dịch muối bão hòa đo được là 19°C. Chén nung rỗng có khối lượng là 47.1 g. Chén nung đựng dung dịch muối bão hòa có khối lượng là 69.6 g. Chén nung & muối kết tinh thu được sau khi làm bay hết hơi nước, có khối lượng là 49.6 g. Cho biết: (a) Khối lượng muối kết tinh thu được là bao nhiêu. (b) Độ tan của muối ở nhiệt độ 19°C. (c) Nồng độ % của dung dịch muối bão hòa ở nhiệt độ 19°C.

**Bài toán 68** (Cương et al., 2022, 42.4, p. 58). Làm bay hơi 300 g nước ra khỏi 700 g dung dịch muối 12%, nhận thấy có 5 g muối tách khỏi dung dịch bão hòa. Xác định nồng độ % của dung dịch muối bão hòa trong điều kiện thí nghiệm trên.

**Bài toán 69** (Cương et al., 2022, 42.5, p. 58). 1 dung dịch CuSO<sub>4</sub> có khối lượng riêng là 1.206 g/mL. Khi cô cạn 165.84 mL dung dịch này người ta thu được 36 g CuSO<sub>4</sub>. Xác định nồng độ % của dung dịch CuSO<sub>4</sub> đã dùng.

**Bài toán 70** (Cương et al., 2022, 42.6, p. 58). Điền vào ô trống của bảng các số liệu thích hợp của mỗi dung dịch glucose C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> trong nước:

Các dung dịch	Khối lượng C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub>	Số mol C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub>	Thể tích dung dịch	Nồng độ mol C <sub>M</sub>
Dung dịch 1	12.6 g		219 mL	
Dung dịch 2		1.08		0.519M
Dung dịch 3			1.62 L	1.08M

**Bài toán 71** (Cương et al., 2022, 42.7, p. 58). Trình bày phương pháp thực nghiệm để xác định nồng độ % & nồng độ mol của 1 mẫu dung dịch CuSO<sub>4</sub> có sẵn trong phòng thí nghiệm.

**Bài toán 72** (Cương et al., 2022, 43.1, p. 59). Từ dung dịch MgSO<sub>4</sub> 2M làm thế nào pha chế được 100 mL dung dịch MgSO<sub>4</sub> 0.4M?

**Bài toán 73** (Cương et al., 2022, 43.2, p. 59). Từ dung dịch NaCl 1M, trình bày cách pha chế 250 mL dung dịch NaCl 0.2M.

**Bài toán 74** (Cương et al., 2022, 43.3, p. 59). Trình bày cách pha chế 150 mL dung dịch HNO<sub>3</sub> 0.25M bằng cách pha loãng dung dịch HNO<sub>3</sub> 5M có sẵn.

**Bài toán 75** (Cương et al., 2022, 43.4, p. 59). Từ glucose C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> & nước cất, trình bày cách pha chế 200 g dung dịch glucose 2%.

**Bài toán 76** (Cương et al., 2022, 43.5, p. 59). Trình bày cách pha chế các dung dịch theo những yêu cầu sau: (a) 250 mL dung dịch có nồng độ 0.1M của những chất sau: NaCl, KNO<sub>3</sub>, CuSO<sub>4</sub>. (b) 200 g dung dịch có nồng độ 10% của mỗi chất nói trên.

**Bài toán 77** (Cương et al., 2022, 43.6, p. 59). Có những dung dịch ban đầu như sau: NaCl 2M, MgSO<sub>4</sub> 0.5M, KNO<sub>3</sub> 4M. Làm thế nào có thể pha chế được những dung dịch theo những yêu cầu sau: (a) 500 mL dung dịch NaCl 0.5M. (b) 2 L dung dịch MgSO<sub>4</sub> 0.2M. (c) 50 mL dung dịch KNO<sub>3</sub> 0.2M.

**Bài toán 78** (Cương et al., 2022, 43.7, p. 59). Từ các muối & nước cất, trình bày cách pha chế các dung dịch sau: (a) 2.5 kg dung dịch NaCl 0.9%. (b) 50 g dung dịch MgCl<sub>2</sub> 4%. (c) 250 g dung dịch MgSO<sub>4</sub> 0.1%.

**Bài toán 79** (Cương et al., 2022, 43.8\*, p. 60). Có 2 lọ đựng dung dịch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Lọ thứ nhất có nồng độ 1M, lọ thứ 2 có nồng độ 3M. Tính toán & trình bày cách pha chế 50 mL dung dịch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> có nồng độ 1.5M từ 2 dung dịch acid đã cho.

**Bài toán 80** (Cương et al., 2022, 43.9\*, p. 60). Cần dùng bao nhiêu milliliter dung dịch NaOH 3% có khối lượng riêng là 1.05 g/mL & bao nhiêu milliliter dung dịch NaOH 10% có khối lượng riêng là 1.12 g/mL để pha chế được 2 L dung dịch NaOH 8% có khối lượng riêng là 1.10 g/mL?

**Bài toán 81** (Cương et al., 2022, 44.1, p. 60). Cân 10.6 g muối Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> cho vào cốc chia độ. Rót vào cốc khoảng vài chục milliliter nước cất, khuấy cho muối tan hết. Sau đó rót thêm nước vào cốc cho đủ 200 mL. Ta được dung dịch Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> có khối lượng riêng là 1.05 g/mL. Tính nồng độ % & nồng độ mol của dung dịch vừa pha chế.

**Bài toán 82** (Cương et al., 2022, 44.2, p. 60). Có: CuSO<sub>4</sub> & nước cất. Tính toán & trình bày cách pha chế để có được những sản phẩm sau: (a) 50 mL dung dịch CuSO<sub>4</sub> có nồng độ 1M. (b) 50 g dung dịch CuSO<sub>4</sub> có nồng độ 10%.

**Bài toán 83** (Cương et al., 2022, 44.3, p. 60). Bảng dưới đây cho biết độ tan của 1 muối trong nước thay đổi theo nhiệt độ:

Nhiệt độ (°C)	20	30	40	50	60
Độ tan (g/100 g nước)	5	11	18	28	40

(a) Vẽ đồ thị biểu diễn độ tan của muối trong nước (trục tung biểu thị khối lượng chất tan, trục hoành biểu thị nhiệt độ). (b) Căn cứ vào đồ thị, ước lượng độ tan của muối ở 25°C & 55°C. (c) Tính số gam muối tan trong: 200 g nước để có dung dịch bão hòa ở nhiệt độ 20°C; 2 kg nước để có dung dịch bão hòa ở nhiệt độ 50°C.

**Bài toán 84** (Cương et al., 2022, 44.4, pp. 60–61). Người ta pha chế 1 dung dịch NaCl ở 20°C bằng cách hòa tan 23.5 g NaCl trong 75 g nước. Căn cứ vào độ tan của NaCl trong nước S<sub>NaCl(20°C)</sub> = 32 g, cho biết dung dịch NaCl đã pha chế là bão hòa hay chưa bão hòa. Nếu dung dịch NaCl là chưa bão hòa, làm thế nào để có được dung dịch NaCl bão hòa ở 20°C?

**Bài toán 85** (Cường et al., 2022, 44.5, p. 61). *Tính toán & trình bày cách pha chế 0.5 L dung dịch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> có nồng độ 1 M từ H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> có nồng độ 98%, khối lượng riêng là 1.84 g/mL.*

**Bài toán 86** (Cường et al., 2022, 44.6\*, p. 61). *A là dung dịch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> có nồng độ 0.2M. B là dung dịch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> có nồng độ 0.5M. (a) Nếu trộn A & B theo tỷ lệ thể tích  $V_A : V_B = 2 : 3$  được dung dịch C. Xác định nồng độ mol của dung dịch C. (b) Phải trộn A & B theo tỷ lệ nào về thể tích để được dung dịch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> có nồng độ 0.3M?*

**Bài toán 87** (Cường et al., 2022, 44.7\*, p. 61). *Có 200 g dung dịch NaOH 5% (dung dịch A). (a) Cần phải trộn thêm vào dung dịch A bao nhiêu gam dung dịch NaOH 10% để được dung dịch NaOH 8%? (b) Cần hòa tan bao nhiêu gam NaOH vào dung dịch A để có dung dịch NaOH 8%? (c) Làm bay hơi nước dung dịch A, người ta cũng thu được dung dịch NaOH 8%. Tính khối lượng nước đã bay hơi.*

## 7 Tốc Độ Phản Ứng & Chất Xúc Tác

**Kiến thức cốt lõi.** **1** *Tốc độ phản ứng* là đại lượng chỉ mức độ nhanh hay chậm của 1 phản ứng hóa học. **2** Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng: *Diện tích bề mặt tiếp xúc:* Diện tích bề mặt tiếp xúc càng lớn, tốc độ phản ứng càng nhanh. *Nhiệt độ:* Khi tăng nhiệt độ, phản ứng diễn ra với tốc độ nhanh hơn. *Nồng độ:* Nồng độ các chất phản ứng càng cao, tốc độ phản ứng càng nhanh. *Chất xúc tác* làm tăng tốc độ phản ứng nhưng không bị thay đổi cả về lượng & chất sau phản ứng. *Chất ức chế* làm giảm tốc độ phản ứng.

## Tài liệu

Cường, Nguyễn, Ngô Ngọc An, Đỗ Tất Hiển, and Lê Xuân Trọng (2022). *Bài Tập Hóa Học 8*. Tái bản lần thứ 15. Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, p. 168.

Hùng, Vũ Văn, Mai Văn Hưng, Lê Kim Long, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, Lê Trọng Huyền, Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Xuân Thành, Bùi Gia Thịnh, Nguyễn Thị Thuần, Mai Thị Tình, Vũ Thị Minh Tuyền, and Nguyễn Văn Vịnh (2023). *Khoa Học Tự Nhiên 8*. Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nhà Xuất Giáo Dục Việt Nam, p. 196.

Trọng, Lê Xuân, Nguyễn Cường, and Đỗ Tất Hiển (2022). *Hóa Học 8*. Tái bản lần thứ 15. Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, p. 160.

Tuấn, Mai Sỹ, Đinh Quang Báo, Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Lê Thị Phượng, Phạm Xuân Quế, Dương Xuân Quý, Đào Văn Toàn, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tuyết, and Ngô Văn Vự (2023). *Khoa Học Tự Nhiên 8*. Cánh Diều. Nhà Xuất Bản Đại Học Sư Phạm, p. 207.