

Problem & Solution: Set \mathbb{N} of Naturals

Bài Tập & Lời Giải: Tập Hợp \mathbb{N} Các Số Tự Nhiên

Nguyễn Quân Bá Hồng*

Ngày 31 tháng 7 năm 2023

Tóm tắt nội dung

Last updated version:

- Problem: [GitHub/NQBH/hobby/elementary mathematics/grade 6/natural/natural set \$\mathbb{N}\$ /problem: set \$\mathbb{N}\$ of naturals.](https://github.com/NQBH/hobby/elementary_mathematics/grade_6/natural/natural_set_N/problem/NQBH_natural_set_N/problem.pdf)¹
- Solution: [GitHub/NQBH/hobby/elementary mathematics/grade 6/natural/natural set \$\mathbb{N}\$ /problem & solution: set \$\mathbb{N}\$ of naturals.](https://github.com/NQBH/hobby/elementary_mathematics/grade_6/natural/natural_set_N/problem&solution:set_N_of_naturals.pdf)²

1 Set – Tập Hợp

1.1 Kiến thức cơ bản

1 Tập hợp là 1 khái niệm cơ bản của Toán học. Đặt tên cho các tập hợp bằng các chữ cái in hoa, e.g., A, B, C, \dots **2** Để viết 1 tập hợp, thường có 2 cách: (a) Liệt kê các phần tử của tập hợp; (b) Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó. **3** Khi liệt kê các phần tử của 1 tập hợp, mỗi phần tử *chỉ liệt kê đúng 1 lần, thứ tự liệt kê tùy ý*. **4** 1 tập hợp có thể có 1 phần tử, có nhiều phần tử, có vô số phần tử, cũng có thể không có phần tử nào, gọi là tập rỗng, ký hiệu là $\emptyset := \{\}$. **5** Cách viết tập hợp bằng phương pháp liệt kê các phần tử thích hợp cho các tập hợp có kích thước nhỏ, hoặc các tập hợp lớn nhưng có quy luật của các phần tử có thể nhận thấy 1 cách rõ ràng & dễ dàng (e.g., $A = \{0, 1, 2, \dots, 100\}$ có quy luật: các phần tử là các số tự nhiên liên tiếp, $B = \{1, 3, 5, \dots, 99\}$ có quy luật: các phần tử là các số tự nhiên lẻ liên tiếp) & có thể sử dụng dấu \dots để ám chỉ quy luật đó; còn cách viết tập hợp bằng phương pháp đặt trưng của các phần tử thích hợp với các tập hợp có kích thước lớn, có 1 hay nhiều quy luật, đặc biệt là các quy luật không dễ dàng mô tả bằng phương thức \dots như cách liệt kê.

1 ([Tuy23], Ví dụ 1, p. 4). Cho 2 tập hợp: $A = \{6; 7; 8; 9; 10\}$, $B = \{x; 9; 7; 10; y\}$. (a) Viết tập hợp A bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó. (b) Điền \in, \notin : $9 \square A$, $x \square A$, $y \square B$. (c) Tìm x, y để $A = B$.

Giải. (a) 2 cách viết: $A = \{x \in \mathbb{N} | 5 < x < 11\} = \{x \in \mathbb{N} | 6 \leq x \leq 10\}$. (b) $9 \in A$, $x \notin A$, $y \in B$. (c) $A = B \Leftrightarrow \{x, y\} = \{6, 8\} \Leftrightarrow (x = 6 \wedge y = 8) \vee (x = 8 \wedge y = 6)$. \square

Ký hiệu 1 (\wedge, \vee). Ký hiệu logical and \wedge nghĩa là “và”, “and”, còn ký hiệu logical or \vee nghĩa là “hoặc”, “or”.

Lưu ý 1. Trong lời giải (c), có 2 đáp số vì thứ tự liệt kê của 1 tập hợp không quan trọng. Hơn nữa, nếu sử dụng bộ sắp thứ tự (pair of numbers) thì cũng có thể lý luận $\{x, y\} = \{6, 8\} \Leftrightarrow (x, y) = (6, 8) \vee (x, y) = (8, 6)$. Tổng quát hơn, $\{x, y\} = \{a, b\} \Leftrightarrow (x, y) = (a, b) \vee (x, y) = (b, a)$, $\forall a, b \in \mathbb{N}$, $a \neq b$. Việc mở rộng lên n số tự nhiên hoàn toàn tương tự: $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \Leftrightarrow (x_1, x_2, \dots, x_n) = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ & các hoán vị (i.e., đổi chỗ), $\forall a_i \in \mathbb{N}$, $i = 1, 2, \dots, n$ là n số tự nhiên đôi một khác nhau (điều kiện khác nhau đảm bảo tập hợp $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ có đúng n phần tử chứ không bị “teo” lại nếu có chứa các phần tử bằng nhau.

2 ([Tuy23], 2., p. 5). (a) Viết tập hợp M các chữ cái của chữ “NGANG”. (b) Với tất cả các phần tử của tập hợp M , viết thành 1 chữ thuộc loại danh từ (không sử dụng thêm dấu).

Giải. (a) $M = \{N, G, A\}$. (b) NGA (nước Nga, Russia), GAN (lá gan – 1 bộ phận trong tiêu hóa của cơ thể động vật), GANG (gang, cast iron, là 1 nhóm vật liệu hợp kim sắt-carbon có hàm lượng carbon $> 2.14\%$, xem, e.g., [Wikipedia/gang](#)), NGAN (con ngan, 1 loại gia cầm, xem [Wikipedia/ngan nhà](#), [Wikipedia/ngan cỏ](#)). \square

3 ([Tuy23], 3., p. 5). Viết tập hợp P tên các tỉnh tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội.

Giải. $P = \{\text{Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hòa Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc}\}$. \square

4 ([Tuy23], 4., p. 5). Cho tập hợp $A = \{a; b\}$, $B = \{1; 2; 3\}$. Viết tất cả các tập hợp có 3 phần tử trong đó 1 phần tử thuộc tập hợp A , 2 phần tử thuộc tập hợp B .

*Independent Researcher, Ben Tre City, Vietnam
e-mail: nguyenquanbahong@gmail.com; website: <https://nqbh.github.io>.

¹URL: https://github.com/NQBH/hobby/blob/master/elementary_mathematics/grade_6/natural/natural_set_N/problem/NQBH_natural_set_N/problem.pdf.

²URL: https://github.com/NQBH/hobby/blob/master/elementary_mathematics/grade_6/natural/natural_set_N/solution/NQBH_natural_set_N/solution.pdf.

Giải. Có 6 tập hợp: $\{a, 1, 2\}, \{a, 1, 3\}, \{a, 2, 3\}, \{b, 1, 2\}, \{b, 1, 3\}, \{b, 2, 3\}$. □

5 ([Tuy23], 5., p. 5). Cho các tập hợp: P là tập hợp các số tự nhiên x mà $x + 3 \leq 10$, Q là tập hợp các số tự nhiên x mà $x \cdot 3 = 5$, R là tập hợp các số tự nhiên x mà $x \cdot 3 = 0$, S là tập hợp các số tự nhiên x mà $x \cdot 3 \leq 24$. (a) Tập hợp nào là tập hợp rỗng? (b) Tập hợp nào có đúng 1 phần tử? (c) 2 tập hợp nào bằng nhau?

Giải. $P = \{x \in \mathbb{N} | x + 3 \leq 10\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $Q = \{x \in \mathbb{N} | x \cdot 3 = 5\} = \emptyset$ (vì nghiệm duy nhất của phương trình $x \cdot 3 = 5$ là $x = \frac{5}{3} \notin \mathbb{N}$, nghiệm này là số hữu tỷ nhưng không phải là số nguyên hay số tự nhiên), $R = \{x \in \mathbb{N} | x \cdot 3 = 0\} = \{0\}$, $S = \{x \in \mathbb{N} | x \cdot 3 \leq 24\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. (a) Tập hợp Q là tập hợp rỗng. (b) Tập hợp R có 1 phần tử. (c) Không có 2 tập hợp nào bằng nhau. □

6. *Viết tập hợp:* (a) Tập các màu sắc của cầu vồng. (b) Tập hợp các huyện của tỉnh Bến Tre. (c) Tập hợp các châu lục trên Trái Đất. (d) Tập hợp các hành tinh trong Hệ Mặt Trời.

Giải. (a) $A = \{\text{đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh lam, chàm, tím}\}$. (b) Bến Tre có 09 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm các huyện: Ba Tri, Bình Đại, Châu Thành, Chợ Lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú & thành phố Bến Tre (xem, e.g., [Wikipedia/Bến Tre](#)), nên

$B = \{\text{Ba Tri, Bình Đại, Châu Thành, Chợ Lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú, thành phố Bến Tre}\}$.

(c) $C = \{\text{Á, Phi, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Âu, Úc, Nam Cực}\}$. (d) Xem, e.g., [Wikipedia/hệ Mặt Trời](#):
 $D = \{\text{Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương}\}$. □

2 Set \mathbb{N} of Natural Numbers – Tập hợp \mathbb{N} Các Số Tự Nhiên

7 ([Tuy23], Ví dụ 2, p. 6). Phố Hàng Ngang là 1 trong các phố cổ của Hà Nội. Các nhà được đánh số liên tục, dãy lẻ 1, 3, 5, 7, ..., 61; dãy chẵn 2, 4, 6, ..., 64. (a) Bên số nhà chẵn, trong 1 phòng gác nhỏ, chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi thảo bản Tuyên Ngôn Độc Lập khai sinh cho nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngõ nhà có căn phòng đó là nhà thứ 24 kể từ đầu phố (số 2). Hỏi ngôi nhà này có số nào? (b) Bên số nhà lẻ chữ số nào được dùng nhiều nhất? Chữ số nào chưa được dùng đến? (c) Phải dùng tất cả bao nhiêu chữ số để ghi số nhà của phố này?

Giải. (a) Ngôi nhà thứ 24 bên dãy số nhà chẵn có số $2 \cdot 24 = 48$. (b) (c) □

8 ([Tuy23], 6., p. 6). *Viết tập hợp 4 số tự nhiên liên tiếp lớn hơn 94 nhưng không quá 100.*

Giải. Có 3 tập hợp thỏa mãn: $\{95, 96, 97, 98\}, \{96, 97, 98, 99\}, \{97, 98, 99, 100\}$. □

9 ([Tuy23], 7., p. 6). (a) Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 20? (b) Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn $n \in \mathbb{N}$? (c) Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn nhỏ hơn $n \in \mathbb{N}$? (d) Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ nhỏ hơn $n \in \mathbb{N}$?

Giải. (a) Có 20 số tự nhiên nhỏ hơn 20: $0, 1, 2, \dots, 19$. (b) Có n số tự nhiên nhỏ hơn n : $0, 1, 2, \dots, n - 1$. (c) Xét 2 trường hợp: Nếu n chẵn thì có $\frac{n}{2}$ số tự nhiên chẵn nhỏ hơn n : $0, 2, \dots, n - 2$. Nếu n lẻ thì có $\frac{n+1}{2}$ số tự nhiên chẵn nhỏ hơn n : $0, 2, \dots, n - 1$. (d) Xét 2 trường hợp: Nếu n chẵn thì có $\frac{n}{2}$ số tự nhiên lẻ nhỏ hơn n : $1, 3, \dots, n - 1$. Nếu n lẻ thì có $\frac{n+1}{2}$ số tự nhiên lẻ nhỏ hơn n : $1, 3, \dots, n - 2$. □

10 ([Tuy23], 8., p. 7). (a) Có bao nhiêu số có 4 chữ số mà cả 4 chữ số đều giống nhau? (b) Có bao nhiêu số có 4 chữ số? (c) Có bao nhiêu số có n chữ số, với $n \in \mathbb{N}$?

1st giải. (a) Có 9 số: 1111, 2222, ..., 9999. (b) Có $9999 - 1000 + 1 = 9000$ số có 4 chữ số: 1000, 1001, ..., 9999. (c) Có $\underbrace{99 \dots 9}_n - \underbrace{100 \dots 0}_{n-1} + 1 = \underbrace{900 \dots 0}_{n-1}$ số có n chữ số: $\underbrace{100 \dots 0}_{n-1}, \underbrace{100 \dots 01}_{n-2}, \dots, \underbrace{99 \dots 9}_n$. □

2nd giải. (c) Các số có n chữ số: $10^{n-1}, 10^{n-1} + 1, \dots, 10^n - 1$. Suy ra có $10^n - 1 - 10^{n-1} + 1 = 10^n - 10^{n-1}$ số có n chữ số. □

11 ([Tuy23], 9., p. 7). Đèn hướng dẫn giao thông liên tục sáng màu xanh hoặc đỏ kế tiếp nhau. Bảng hiện số của đèn có 2 chữ số liên tục thay đổi theo từng giây. Hỏi trong 1 phút xe bị dừng vì đèn đỏ thì đèn có: (a) Bao nhiêu lần thay đổi các số? (b) Bao nhiêu lần thay đổi các chữ số?

Giải. (a) Trong 1 phút = 60 giây có 60 lần thay đổi số. (b) Hàng đơn vị thay đổi 60 lần, hàng chục thay đổi 6 lần ($6 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0$) nên tổng cộng có $60 + 6 = 66$ lần thay đổi chữ số. □

12 ([Tuy23], 10., p. 7). Tìm 3 số tự nhiên a, b, c biết chúng thỏa mãn đồng thời 3 điều kiện: $a < b < c$, $101 \leq a \leq 103$, $101 < c < 104$.

1st giải. Từ điều kiện $101 \leq a \leq 103$ & $a \in \mathbb{N}$, suy ra $a \in \{101, 102, 103\}$. Từ điều kiện $101 < c < 104$ & $c \in \mathbb{N}$, suy ra $c \in \{102, 103\}$. Mặt khác, kết hợp 2 điều vừa tập giá trị vừa thu được với điều kiện $a < b < c$, suy ra $a = 101$, $b = 102$, $c = 103$. □

2nd giải. Vì $a < b < c$ & $a, b, c \in \mathbb{N}$ nên $c \geq b + 1 \geq a + 2$ (1). Kết hợp (1) với điều kiện $101 \leq a$, suy ra $c \geq a + 2 \geq 101 + 2 = 103$ (2). Kết hợp (2) với điều kiện $c < 104$, suy ra $c = 103$. Dấu “=” xảy ra $\Leftrightarrow c = b + 1 = a + 2 \Leftrightarrow (a, b, c) = (101, 102, 103)$. \square

13 ([Tuy23], 11., p. 7). Cho số 4321. Viết thêm chữ số 9 xen giữa các chữ số của nó để được 1 số: (a) Lớn nhất có thể được. (b) Nhỏ nhất có thể được.

Giải. (a) 49321. (b) 43291. \square

14 ([Tuy23], 12., p. 7). Với 9 que diêm, sắp xếp thành 1 số La Mã: (a) Có giá trị lớn nhất. (b) Có giá trị nhỏ nhất.

Giải. (a) MMI: 2001. (b) XXVIII: 28. \square

15 ([Tuy23], 13., p. 7). Có 13 que diêm sắp xếp như sau: XII – V = VII. (a) Đẳng thức trên đúng hay sai? (b) Đổi chỗ chỉ 1 que diêm để được 1 đẳng thức đúng.

Giải. (a) Đẳng thức XII – V = VII đúng vì $12 - 5 = 7$. (b) XI – IV = VII: $11 - 4 = 7$, hoặc XII – VI = VI: $12 - 6 = 6$. \square

16 ([Bin22], Ví dụ 1, p. 4). Viết các tập hợp sau rồi tìm số phần tử của mỗi tập hợp đó: (a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà $8 : x = 2$. (b) Tập hợp B các số tự nhiên x mà $x + 3 < 5$. (c) Tập hợp C các số tự nhiên x mà $x - 2 = x + 2$. (d) Tập hợp D các số tự nhiên x mà $x : 2 = x : 4$. (e) Tập hợp E các số tự nhiên x mà $x + 0 = x$.

Giải. (a) $A = \{4\}$ có 1 phần tử. (b) $B = \{0, 1\}$ có 2 phần tử. (c) $C = \emptyset$ không có phần tử nào. (d) $D = \{0\}$ có 1 phần tử. (e) $E = \{0, 1, 2, \dots\} = \mathbb{N}$ có vô hạn đếm được số phần tử. \square

17 ([Bin22], Ví dụ 2, p. 5). Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của nó: (a) Tập hợp A các số tự nhiên có 2 chữ số, trong đó chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2. (b) Tập hợp B các số tự nhiên có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 3.

Giải. (a) $A = \{20, 31, 42, 53, 64, 75, 86, 97\}$. (b) $B = \{300, 201, 210, 102, 111, 120\}$. \square

18 ([Bin22], Ví dụ 3, p. 5). Tìm số tự nhiên có 5 chữ số, biết nếu viết thêm chữ số 2 vào đằng sau số đó thì được số lớn gấp 3 lần số có được bằng cách viết thêm chữ số 2 vào đằng trước số đó.

19 ([Bin22], Mở rộng Ví dụ 3, p. 5). Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có chữ số đầu tiên ở bên trái là 2, khi chuyển chữ số 2 này xuống cuối cùng thì số đó tăng gấp 3 lần.

20 ([Bin22], Mở rộng Ví dụ 3, p. 6). Tìm số tự nhiên có 5 chữ số, biết nếu viết thêm 1 chữ số vào đằng sau số đó thì được số lớn gấp 3 lần số có được nếu viết thêm chính chữ số ấy vào đằng trước số đó.

21 ([Bin22], 2., p. 6). Xác định các tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử thuộc tập hợp đó: (a) $A = \{1, 3, 5, 7, \dots, 49\}$. (b) $B = \{11, 22, 33, 44, \dots, 99\}$. (c) $C = \{\text{tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12}\}$.

22 ([Bin22], 3., p. 6). Tìm tập hợp các số tự nhiên x sao cho: (a) $x + 3 = 4$. (b) $8 - x = 5$. (c) $x : 2 = 0$. (d) $0 : x = 0$. (e) $5x = 12$.

23 ([Bin22], 4., p. 6). Tìm $a, b \in \mathbb{N}$ sao cho $12 < a < b < 16$.

24 ([Bin22], 5., p. 6). Viết các số tự nhiên có 4 chữ số trong đó có 2 chữ số 3, 1 chữ số 2, 1 chữ số 1.

25 ([Bin22], 6., p. 6). Với cả 2 chữ số I & X, viết được bao nhiêu số La Mã? (Mỗi chữ số có thể viết nhiều lần, nhưng không viết liên tiếp quá 3 lần).

26 ([Bin22], 7., pp. 6–7). (a) Dùng 3 que diêm, xếp được các số La Mã nào? (b) Để viết các số La Mã từ 4000 trở lên, e.g. số 19520, người ta viết XIXmDXX (chữ m biểu thị 1 nghìn, m là chữ đầu của từ mille, tiếng Latin là 1 nghìn). Viết 2 số sau bằng chữ số La Mã: 7203, 121512.

27 ([Bin22], 8., p. 7). Tìm số tự nhiên có tận cùng bằng 3, biết rằng nếu xóa chữ số hàng đơn vị thì số đó giảm đi 1992 đơn vị.

28 ([Bin22], 9., p. 7). Tìm số tự nhiên có 6 chữ số, biết rằng chữ số hàng đơn vị là 4 & nếu chuyển chữ số đó lên hàng đầu tiên thì số đó tăng gấp 4 lần.

29 ([Bin22], 10., p. 7). Cho 4 chữ số a, b, c, d khác nhau & khác 0. Lập số tự nhiên lớn nhất & số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số gồm cả 4 chữ số ấy. Tổng của 2 số này bằng 11330. Tìm tổng các chữ số $a + b + c + d$.

30 ([Bin22], 11., p. 7). Cho 3 chữ số a, b, c sao cho $0 < a < b < c$. (a) Viết tập hợp A các số tự nhiên có 3 chữ số gồm cả 3 chữ số a, b, c . (b) Biết tổng 2 số nhỏ nhất trong tập hợp A bằng 488. Tìm 3 chữ số a, b, c nói trên.

31 ([Bin22], 12., p. 7). Tìm 3 chữ số khác nhau & khác 0, biết rằng nếu dùng cả 3 chữ số này lập thành các số tự nhiên có 3 chữ số thì 2 số lớn nhất có tổng bằng 1444.

32 (Even vs. odd – Chẵn vs. lẻ). Viết tập hợp theo nhiều cách nhất có thể: (a) Tập hợp các số tự nhiên chẵn. (b) Tập hợp các số tự nhiên lẻ. (c) Tập hợp các số nguyên dương chẵn. (d) Tập hợp các số nguyên dương lẻ. (e) Tập hợp các số nguyên chẵn. (f) Tập hợp các số nguyên lẻ.

33 (1-sided bounded subset of \mathbb{N} – Tập con của \mathbb{N} chỉ bị chặn 1 phía). Cho $a \in \mathbb{N}$ cho trước. Viết các tập hợp sau theo nhiều cách nhất có thể: (a) Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn a . (b) Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn a . (c) Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng a . (d) Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng a . (e) Tập hợp các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn a . (f) Tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn a . (g) Tập hợp các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn hoặc bằng a . (h) Tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn hoặc bằng a . (i) Tập hợp các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn a . (j) Tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn a . (k) Tập hợp các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn hoặc bằng a . (l) Tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn hoặc bằng a .

34 (2-sided bounded subset of \mathbb{N} – Tập con của \mathbb{N} bị chặn cả 2 phía). Với $a, b \in \mathbb{N}$ cho trước. Viết các tập hợp sau theo nhiều cách nhất có thể: (a) Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn a & nhỏ hơn b . (b) Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng a & nhỏ hơn b . (c) Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn a & nhỏ hơn hoặc bằng b . (d) Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng a & nhỏ hơn hoặc bằng b . (e) Tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn a & nhỏ hơn b . (f) Tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn hoặc bằng a & nhỏ hơn b . (g) Tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn a & nhỏ hơn hoặc bằng b . (h) Tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn hoặc bằng a & nhỏ hơn hoặc bằng b . (i) Tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn a & nhỏ hơn b . (j) Tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn hoặc bằng a & nhỏ hơn b . (k) Tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn a & nhỏ hơn hoặc bằng b . (l) Tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn hoặc bằng a & nhỏ hơn hoặc bằng b .

35 (Divisibility vs. Indivisibility (division with remainders) – Chia hết vs. chia không hết/có dư). Với $b, r, m, n \in \mathbb{N}$ cho trước (i.e., số tự nhiên khác 0), viết tập hợp theo 2 cách: (a) Tập hợp các số tự nhiên chia hết cho b . (b) Tập hợp các số tự nhiên chia hết cho b & nhỏ hơn/lớn hơn/nhỏ hơn hoặc bằng/lớn hơn hoặc bằng m . (c) Tập hợp các số tự nhiên chia cho b dư r . (d) Tập hợp các số tự nhiên chia cho b dư r & lớn hơn/lớn hơn hoặc bằng m & nhỏ hơn/nhỏ hơn hoặc bằng n .

36 (n -digit natural number – Số tự nhiên có n chữ số). Viết tập hợp theo nhiều cách nhất có thể: (a) Tập hợp các số tự nhiên có 1 chữ số. (b) Tập hợp các số tự nhiên có 2 chữ số. (c) Tập hợp các số tự nhiên có 3 chữ số. (d) Tập hợp các số tự nhiên có n chữ số, với n là 1 số tự nhiên cho trước.

37 (Biểu diễn thập phân n -digit natural number – Số tự nhiên có n chữ số). Viết biểu diễn thập phân của các số tự nhiên có: (a) 1 chữ số. (b) 2 chữ số. (c) 3 chữ số. (d) 4 chữ số. (e) 5 chữ số. (f) 6 chữ số. (g) 7 chữ số. (h) 8 chữ số. (i) 9 chữ số. (j) (d) 10 chữ số. (k) n chữ số, với $n \in \mathbb{N}$ cho trước.

38. Chứng minh: (a) Trong 2 số tự nhiên có số chữ số khác nhau: Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn, số nào có ít chữ số hơn thì nhỏ hơn. (b) Trong 2 số tự nhiên có cùng số chữ số, nếu trong cặp chữ số khác nhau đầu tiên từ trái sang phải, số nào có chữ số tương ứng trong cặp đó lớn hơn thì lớn hơn.

39. Viết tập hợp các ký hiệu La Mã. Có mấy ký hiệu trong hệ La Mã, i.e., tập hợp vừa viết có mấy phần tử?

40 ($\mathbb{N}^* \subset \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$). Viết tập hợp theo nhiều cách nhất có thể: (a) Tập hợp các số tự nhiên. (b) Tập hợp các số tự nhiên khác 0. (c) Tập hợp các số nguyên/nguyên dương/nguyên âm/nguyên không âm/nguyên không dương. (d) Tập hợp các phân số/phân số dương/phân số âm/phân số không âm/phân số không dương. (e) Tập hợp các số thập phân/số thập phân dương/số thập phân âm/số thập phân không âm/số thập phân không dương. (f) Tập hợp các phân số thập phân/phân số thập phân dương/phân số thập phân âm/phân số thập phân không âm/phân số thập phân không dương. (g) Tập hợp các số hữu tỷ/số hữu tỷ dương/số hữu tỷ âm/số hữu tỷ không âm/số hữu tỷ không dương. (h) Tập hợp các số thập phân hữu hạn/số thập phân hữu hạn dương/số thập phân hữu hạn âm/số thập phân hữu hạn không âm/số thập phân hữu hạn không dương. (i) Tập hợp các số thập phân vô hạn tuần hoàn/số thập phân vô hạn tuần hoàn dương/số thập phân vô hạn tuần hoàn âm/số thập phân vô hạn tuần hoàn không âm/số thập phân vô hạn tuần hoàn không dương. (j) Tập hợp các số thập phân vô hạn không tuần hoàn/số thập phân vô hạn không tuần hoàn âm/số thập phân vô hạn không tuần hoàn không âm/số thập phân vô hạn không tuần hoàn không dương. (k) Tập hợp các số thực/số thực dương/số thực âm/số thực không âm/số thực không dương. (l) Tập hợp các số vô tỷ/số vô tỷ dương/số vô tỷ âm/số vô tỷ không dương/số vô tỷ không âm. (m) Tập hợp các số phức/số thuần thực/số thuần ảo.

Tài liệu

- [Bin22] Vũ Hữu Bình. *Nâng Cao & Phát Triển Toán 6 Tập 1*. Tái bản lần thứ nhất. Kết nối tri thức với cuộc sống. Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, 2022, p. 200.
- [Tuy23] Bùi Văn Tuyên. *Bài Tập Nâng Cao & Một Số Chuyên Đề Toán 6*. Tái bản lần thứ 1. Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, 2023, p. 184.