

1st-Order Polynomial Equation with 1 Variable

Phương Trình Bậc Nhất 1 Ẩn

Nguyễn Quân Bá Hồng*

Ngày 12 tháng 2 năm 2023

Tóm tắt nội dung

[EN] This text is a collection of problems, from easy to advanced, about 1st-order polynomial equation with 1 variable. This text is also a supplementary material for my lecture note on Elementary Mathematics grade 8, which is stored & downloadable at the following link: [GitHub/NQBH/hobby/elementary mathematics/grade 8/lecture](https://github.com/NQBH/hobby/elementary_mathematics/grade_8/lecture)¹. The latest version of this text has been stored & downloadable at the following link: [GitHub/NQBH/hobby/elementary mathematics/grade 8/1st order polynomial equation with 1 variable](https://github.com/NQBH/hobby/elementary_mathematics/grade_8/1st_order_polynomial_equation_with_1_variable)².

[VI] Tài liệu này là 1 bộ sưu tập các bài tập chọn lọc từ cơ bản đến nâng cao về phương trình bậc nhất 1 ẩn. Tài liệu này là phần bài tập bổ sung cho tài liệu chính – bài giảng [GitHub/NQBH/hobby/elementary mathematics/grade 8/lecture](https://github.com/NQBH/hobby/elementary_mathematics/grade_8/lecture) của tác giả viết cho Toán Sơ Cấp lớp 8. Phiên bản mới nhất của tài liệu này được lưu trữ & có thể tải xuống ở link sau: [GitHub/NQBH/hobby/elementary mathematics/grade 8/1st order polynomial equation with 1 variable](https://github.com/NQBH/hobby/elementary_mathematics/grade_8/1st_order_polynomial_equation_with_1_variable).

Mục lục

1	Phương Trình Bậc Nhất 1 Ẩn & Cách Giải	2
2	Phương Trình Đưa Được Về Dạng $ax + b = 0$	3
3	Phương Trình Tích	4
4	Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu	5
5	Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình	6
6	Miscellaneous	8
	Tài liệu	9

*Independent Researcher, Ben Tre City, Vietnam

e-mail: nguyenquanbahong@gmail.com; website: <https://nqbh.github.io>.

¹URL: https://github.com/NQBH/hobby/blob/master/elementary_mathematics/grade_8/NQBH_elementary_mathematics_grade_8.pdf.

²URL: https://github.com/NQBH/hobby/blob/master/elementary_mathematics/grade_8/1st_order_polynomial_equation_1_variable/NQBH_1st_order_polynomial_equation_1_variable.pdf.

1 Phương Trình Bậc Nhất 1 Ẩn & Cách Giải

Định nghĩa 1.1 (Phương trình bậc nhất 1 ẩn). *Phương trình dạng $ax + b = 0$, với $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, là 2 số đã cho, được gọi là phương trình bậc nhất 1 ẩn.*

“**[1]** Phương trình ẩn x có dạng $A(x) = B(x)$ trong đó $A(x)$ & $B(x)$ là 2 biểu thức của cùng 1 biến x . Giá trị $x = x_0$ làm cho 2 vế của phương trình nhận cùng 1 giá trị gọi là 1 *ng nghiệm* của phương trình. 1 phương trình có thể có 1, 2, 3, ... nghiệm, nhưng cũng có thể không có nghiệm nào hoặc có vô số nghiệm. Tập hợp tất cả các nghiệm của 1 phương trình gọi là *tập nghiệm* của phương trình đó, thường ký hiệu là S . **[2]** 2 phương trình tương đương là 2 phương trình có cùng 1 tập nghiệm. 2 phương trình cùng tương đương với 1 phương trình thứ 3 thì tương đương với nhau. **[3]** Quy tắc chuyển vế & quy tắc nhân: (a) Nếu ta chuyển 1 hạng tử từ vế này sang vế kia & đổi dấu của nó thì được 1 phương trình tương đương với phương trình đó. (b) Nếu ta nhân (hay chia) cả 2 vế của 1 phương trình với cùng 1 số khác 0 thì được 1 phương trình tương đương với phương trình đã cho. **[4]** Phương trình bậc nhất 1 ẩn là phương trình dạng $ax + b = 0$. Các bước giải (đối với phương trình mà 2 vế là 2 biểu thức hữu tỷ, không chứa ẩn ở mẫu): *Bước 1.* Khử mẫu thức. *Bước 2.* Bỏ dấu ngoặc & chuyển các hạng tử chứa ẩn sang 1 vế, các hằng số sang vế kia. *Bước 3.* Thu gọn về dạng $ax + b = 0$ hay $ax = -b$. **[5]** Quy tắc chuyển vế chỉ là 1 hệ quả của tính chất sau: Nếu ta cộng cùng 1 đa thức của ẩn vào 2 vế của 1 phương trình thì được 1 phương trình mới tương đương với phương trình đã cho. **[6]** Trường hợp phương trình thu gọn có hệ số của ẩn bằng 0: *Dạng 1:* $0x = 0$. Phương trình có vô số nghiệm, $x \in \mathbb{R}$ hay $S = \mathbb{R}$. *Dạng 2:* $0x = c$, $c \neq 0$. Phương trình vô nghiệm, $S = \emptyset$.” – Tuyên, 2022, Chap. III, §1, pp. 53–54

Bài toán 1. *Biện luận theo các tham số $a, b \in \mathbb{R}$ để giải phương trình bậc nhất 1 ẩn $ax + b = 0$ (*).*

Giải. Xét các trường hợp sau:

- Trường hợp 1: $a = 0$. Phương trình $ax + b = 0$ trở thành $0x + b = 0$ hay $b = 0$. Xét tiếp 2 trường hợp con:
 - Trường hợp 1.1: $b = 0$. Phương trình $ax + b = 0$ trở thành $0 = 0$ đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$, nên phương trình (*) có vô số nghiệm thực với tập nghiệm $S = \mathbb{R}$.
 - Trường hợp 1.1: $b \neq 0$. Phương trình $ax + b = 0$ trở thành $b = 0$, mâu thuẫn với $b \neq 0$ nên phương trình (*) vô nghiệm thực, i.e., $S = \emptyset$.
- Trường hợp 2: $a \neq 0$. $ax + b = 0 \Leftrightarrow ax = -b \Leftrightarrow x = -\frac{b}{a}$. Phương trình (*) có 1 nghiệm duy nhất $x = -\frac{b}{a}$, i.e., $S = \{-\frac{b}{a}\}$.

Giải & biện luận hoàn tất. □

Bài toán 2. *Viết chương trình Pascal, Python, C/C++ để giải phương trình bậc nhất 1 ẩn $ax + b$ với $a, b \in \mathbb{R}$ được nhập từ bàn phím.*

Bài toán 3 (Thân et al., 2022, 2., p. 5). *Thử lại \mathcal{E} cho biết các khẳng định sau có đúng không? (a) $x^3 + 3x = 2x^2 - 3x + 1 \Leftrightarrow x = -1$; (b) $(z - 2)(z^2 + 1) = 2z + 5 \Leftrightarrow z = 3$.*

Nhắc lại, 2 phương trình tương đương với nhau khi & chỉ khi chúng có cùng tập nghiệm.

Giải. (a) Thay $x = -1$ vào phương trình thứ nhất: $(-1)^3 + 3(-1) = 2(-1)^2 - 3(-1) + 1 \Leftrightarrow -4 = 6$, vô lý, suy ra 2 phương trình không tương đương. (b) Thay $z = 3$ vào phương trình thứ nhất: $(3 - 2)(3^2 + 1) = 2 \cdot 3 + 5 \Leftrightarrow 10 = 11$, vô lý, suy ra 2 phương trình không tương đương. □

Bài toán 4 (Thân et al., 2022, 4., pp. 5–6). *Trong 1 cửa hàng bán thực phẩm, Tâm thấy cô bán hàng dùng 1 chiếc cân đĩa. 1 bên đĩa cô đặt 1 quả cân 500g, bên đĩa kia, cô đặt 2 gói hàng như nhau \mathcal{E} 3 quả cân nhỏ, mỗi quả 50g thì cân thăng bằng. Nếu khối lượng mỗi gói hàng là x g thì điều đó có thể được mô tả bởi phương trình nào?*

Giải. $500 = 2x + 3 \cdot 50 \Leftrightarrow x = 175$ g. □

Bài toán 5 (Thân et al., 2022, 5., p. 6). *Chứng minh phương trình $2mx - 5 = -x + 6m - 2$ luôn luôn nhận $x = 3$ làm nghiệm, dù m lấy bất cứ giá trị nào? Phương trình còn nghiệm nào khác $x = 3$ hay không?*

Giải. Thay $x = 3$ vào phương trình, được: $2m \cdot 3 - 5 = -3 + 6m - 2 \Leftrightarrow 6m - 5 = 6m - 5 \Leftrightarrow 0 = 0$ đúng $\forall m \in \mathbb{R}$. (b) Vì phương trình đã cho đúng $\forall m \in \mathbb{R}$ nên nói riêng, nó cũng đúng với $m = 0$. Khi $m = 0$, phương trình $2mx - 5 = -x + 6m - 2$ trở thành $-5 = -x - 2 \Leftrightarrow x = 3$, nên $x = 3$ là nghiệm duy nhất của phương trình đã cho. □

Lưu ý 1.1. *Phương trình bậc nhất 1 ẩn $ax + b = 0$, $\forall a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, có duy nhất 1 nghiệm $x = -\frac{b}{a}$.*

Bài toán 6 (Thân et al., 2022, 6., p. 6). Cho 2 phương trình $x^2 - 5x + 6 = 0$ (1); $x + (x - 2)(2x + 1) = 2$. (a) Chứng minh 2 phương trình có nghiệm chung là $x = 2$. (b) Chứng minh $x = 3$ là nghiệm của (1) nhưng không là nghiệm của (2). (c) 2 phương trình đã cho có tương đương với nhau không, vì sao?

Bài toán 7 (Thân et al., 2022, 7., p. 6). Tại sao có thể kết luận tập nghiệm của phương trình $\sqrt{x} + 1 = 2\sqrt{-x}$ là \emptyset ?

Nhắc lại, \sqrt{x} xác định $\Leftrightarrow x \geq 0$.

Giải. ĐKXD: $x \geq 0 \wedge -x \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 0 \wedge x \leq 0 \Leftrightarrow x = 0$. Thay $x = 0$ vào phương trình, được: $\sqrt{0} + 1 = 2\sqrt{-0} \Leftrightarrow 1 = 0$, vô lý, nên phương trình vô nghiệm. \square

Nhận xét 1.1. 1 phương trình đại số có chứa các biểu thức \sqrt{x} & $\sqrt{-x}$ chỉ có thể nhận $x = 0$ là nghiệm. Nếu $x = 0$ không là nghiệm của phương trình đó, thì phương trình đó vô nghiệm.

Bài toán 8 (Thân et al., 2022, 8., p. 6). Chứng minh phương trình $x + |x| = 0$ nghiệm đúng với mọi $x \leq 0$.

Bài toán 9 (Thân et al., 2022, 9., p. 6). Cho phương trình $(m^2 + 5m + 4)x^2 = m + 4$, trong đó $m \in \mathbb{R}$. Chứng minh: (a) Khi $m = -4$, phương trình nghiệm đúng với mọi giá trị của ẩn. (b) Khi $m = -1$, phương trình vô nghiệm. (c) Khi $m = -2$ hoặc $m = -3$, phương trình cũng vô nghiệm. (d) Khi $m = 0$, phương trình nhận $x = \pm 1$ là nghiệm.

Bài toán 10 (Thân et al., 2022, 12, p. 6). Tìm giá trị của m sao cho phương trình $2x + m = x - 1$ nhận $x = -2$ làm nghiệm.

Bài toán 11 (Mở rộng Thân et al., 2022, 12, p. 6). Tìm giá trị của m sao cho phương trình $ax + m = bx + c$ nhận $x = x_0$ làm nghiệm với $a, b, c, x_0 \in \mathbb{R}$ cho trước.

Bài toán 12 (Tuyên, 2022, Ví dụ 23, p. 54). Cho phương trình: $\frac{3(2x+1)}{4} - \frac{5x+3}{6} = \frac{2x-1}{3} + \frac{m}{12}$, $m \in \mathbb{R}$. Tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm.

Bài toán 13 (Tuyên, 2022, Ví dụ 23, p. 55). Giải & biện luận phương trình sau với m là hằng số:

$$\frac{m^2[(x+2)^2 - (x-2)^2]}{8} - 4x = (m-1)^2 + 3(2m+1).$$

2 Phương Trình Đưa Được Về Dạng $ax + b = 0$

Chỉ xét các phương trình $f(x) = g(x)$ mà 2 vế của chúng là 2 biểu thức hữu tỷ của ẩn, không chứa ẩn ở mẫu & có thể đưa được về dạng $ax + b = 0$ hay $ax = -b$.

Bài toán 14. Biện luận theo cách tham số $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ cho trước để giải phương trình bậc nhất 1 ẩn $ax + b = cx + d$.

Bài toán 15. Biện luận theo cách tham số $a, b, c, d, e, f, g, h, i, j \in \mathbb{R}$ cho trước để giải phương trình bậc nhất 1 ẩn:

$$\frac{ax+b}{c} + dx + e = \frac{fx+g}{h} + ix + j.$$

Bài toán 16 (Chính et al., 2022, Ví dụ 3, p. 11). Giải phương trình $\frac{(3x-1)(x+2)}{3} - \frac{2x^2+1}{2} = \frac{11}{2}$.

Bài toán 17 (Mở rộng Chính et al., 2022, Ví dụ 3, p. 11). Giải phương trình $\frac{(ax+b)(cx+d)}{e} + \frac{fx^2+gx+h}{i} = jx + k$ với $a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k \in \mathbb{R}$ thỏa $\frac{ac}{e} + \frac{f}{i} = 0$.

Nhận xét 2.1. Điều kiện $\frac{ac}{e} + \frac{f}{i} = 0$ nhằm mục đích triệt tiêu hệ số của x^2 để quy phương trình đã cho về phương trình bậc nhất 1 ẩn.

Bài toán 18 (Thân et al., 2022, 21., p. 8). Tìm điều kiện của x để giá trị của mỗi phân thức sau được xác định: (a) $A = \frac{3x+2}{2(x-1)-3(2x+1)}$; (b) $B = \frac{0.5(x+3)-2}{1.2(x+0.7)-4(0.6x+0.9)}$.

Bài toán 19 (Thân et al., 2022, 22., p. 8). Giải phương trình: (a) $\frac{5(x-1)+2}{6} - \frac{7x-1}{4} = \frac{2(2x+1)}{7} - 5$; (b) $\frac{3(x-3)}{4} + \frac{4x-10.5}{10} = \frac{3(x+1)}{5} + 6$; (c) $\frac{2(3x+1)+1}{4} - 5 = \frac{2(3x-1)}{5} - \frac{3x+2}{10}$; (d) $\frac{x+1}{3} + \frac{3(2x+1)}{4} = \frac{2x+3(x+1)}{6} + \frac{7+12x}{12}$.

Bài toán 20 (Thân et al., 2022, 23., p. 8). Tìm giá trị của k sao cho: (a) Phương trình $(2x+1)(9x+2k) - 5(x+2) = 40$ có nghiệm $x = 2$, $x = x_0 \in \mathbb{R}$ cho trước. (b) Phương trình $2(2x+1) + 18 = 3(x+2)(2x+k)$ có nghiệm $x = 1$, $x = x_0 \in \mathbb{R}$ cho trước.

Bài toán 21 (Thân et al., 2022, 24., p. 8). Tìm các giá trị của x sao cho 2 biểu thức A & B cho sau đây có giá trị bằng nhau: (a) $A = (x-3)(x+4) - 2(3x-2)$, $B = (x-4)^2$; (b) $A = (x+2)(x-2) + 3x^2$, $B = (2x+1)^2 + 2x$; (c) $A = (x-1)(x^2+x+1) - 2x$, $B = x(x-1)(x+1)$; (d) $A = (x+1)^3 - (x-2)^3$, $B = (3x-1)(3x+1)$.

Bài toán 22 (Thân et al., 2022, 25., p. 9). Giải phương trình: (a) $\frac{2x}{3} + \frac{2x-1}{6} = 4 - \frac{x}{3}$; (b) $\frac{x-1}{2} + \frac{x-1}{4} = 1 - \frac{2(x-1)}{3}$; (c) $\frac{2-x}{2001} - 1 = \frac{1-x}{2002} - \frac{x}{2003}$.

Bài toán 23 (Thân et al., 2022, 3.1., p. 9). Cho 2 phương trình: $\frac{7x}{8} - 5(x-9) = \frac{1}{6}(20x+1.5)$ (1), $2(a-1)x - a(x-1) = 2a+3$ (2). (a) Chứng minh phương trình (1) có nghiệm duy nhất, tìm nghiệm đó; (b) Giải phương trình (2) khi $a = 2$; (c) Tìm giá trị của a để phương trình (2) có 1 nghiệm bằng $\frac{1}{3}$ nghiệm của phương trình (1).

Bài toán 24 (Thân et al., 2022, 3.2., p. 9). Bằng cách đặt ẩn phụ, giải phương trình: (a) $\frac{6(16x+3)}{7} - 8 = \frac{3(16x+3)}{7} + 7$. Hint: Đặt $u = \frac{16x+3}{7}$. (b) $(\sqrt{2}+2)(x\sqrt{2}-1) = 2x\sqrt{2} - \sqrt{2}$. Hint: Đặt $u = x\sqrt{2} - 1$. (c) $0.05\left(\frac{2x-2}{2009} + \frac{2x}{2010} + \frac{2x+2}{2011}\right) = 3.3 - \left(\frac{x-1}{2009} + \frac{x}{2010} + \frac{x+1}{2011}\right)$. Hint: Đặt $u = \frac{x-1}{2009} + \frac{x}{2010} + \frac{x+1}{2011}$.

3 Phương Trình Tích

Bài toán 25. Biện luận theo các tham số $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{R}$ cho trước để giải phương trình: (a) $(ax+b)(cx+d) = 0$. (b) $(ax+b)(cx+d)(ex+f) = 0$.

Tổng quát hơn:

Bài toán 26 (Phương trình tích các phương trình bậc nhất 1 ẩn). Biện luận theo các tham số a_i, b_i , $i = 1, \dots, n$ cho trước để giải phương trình: $\prod_{i=1}^n (a_i x + b_i) = (a_1 x + b_1)(a_2 x + b_2) \cdots (a_n x + b_n) = 0$.

Bài toán 27 (Phương trình tích các phương trình bậc nhất 1 ẩn x & y). Biện luận theo các tham số a_i, b_i , $i = 1, \dots, n$, c_j, d_j , $j = 1, \dots, m$, cho trước để giải phương trình: $\prod_{i=1}^n (a_i x + b_i) \prod_{j=1}^m (c_j y + d_j) = (a_1 x + b_1)(a_2 x + b_2) \cdots (a_n x + b_n)(c_1 y + d_1)(c_2 y + d_2) \cdots (c_m y + d_m) = 0$.

Bài toán 28. Giải phương trình $(x^2 - 1) + (x+1)(x-2) = 0$.

Bài toán 29 (Chính et al., 2022, Ví dụ 2, p. 16). Giải phương trình $(x+1)(x+4) = (2-x)(2+x)$.

Bài toán 30 (Chính et al., 2022, ?3, p. 16). Giải phương trình $(x-1)(x^2+3x-2) - (x^3-1) = 0$.

Bài toán 31 (Chính et al., 2022, Ví dụ 3, p. 16). Giải phương trình $2x^3 = x^2 + 2x - 1$.

Bài toán 32 (Chính et al., 2022, ?4, p. 17). Giải phương trình $(x^3 + x^2) + (x^2 + x) = 0$.

Bài toán 33 (Chính et al., 2022, 21., p. 17). Giải phương trình: (a) $(3x-2)(4x+5) = 0$; (b) $2.3x - 6.9)(0.1x+2) = 0$; (c) $(4x+2)(x^2+1) = 0$; (d) $(2x+7)(x-5)(5x+1) = 0$.

Bài toán 34 (Chính et al., 2022, 22., p. 17). Bằng cách phân tích về trái thành nhân tử, giải các phương trình sau: (a) $2x(x-3) + 5(x-3) = 0$; (b) $(x^2-4) + (x-2)(3-2x) = 0$; (c) $x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = 0$; (d) $x(2x-7) - 4x + 14 = 0$; (e) $(2x-5)^2 - (x+2)^2 = 0$; (f) $x^2 - x - (3x-3) = 0$.

Bài toán 35 (Chính et al., 2022, 23., p. 17). Giải phương trình: (a) $x(2x-9) = 3x(x-5)$; (b) $0.5x(x-3) = (x-3)(1.5x-1)$; (c) $3x - 15 = 2x(x-5)$; (d) $\frac{3}{7}x - 1 = \frac{1}{7}x(3x-7)$.

Bài toán 36 (Chính et al., 2022, 24., p. 17). Giải phương trình: (a) $(x^2 - 2x + 1) - 4 = 0$; (b) $x^2 - x = -2x + 2$; (c) $4x^2 + 4x + 1 = x^2$; (d) $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Bài toán 37 (Chính et al., 2022, 25., p. 17). Giải phương trình: (a) $2x^3 + 6x^2 = x^2 + 3x$; (b) $(3x-1)(x^2+2) = (3x-1)(7x-10)$.

Bài toán 38 (Thân et al., 2022, 26., pp. 9-10). Giải phương trình: (a) $(4x-10)(24+5x) = 0$; (b) $(3.5-7x)(0.1x+2.3) = 0$; (c) $(3x-2)\left(\frac{2(x+3)}{7} - \frac{4x-3}{5}\right) = 0$; (d) $(3.3-11x)\left(\frac{7x+2}{5} + \frac{2(1-3x)}{3}\right) = 0$.

Bài toán 39 (Thân et al., 2022, 27., p. 10). Giải phương trình: (a) $(\sqrt{3}-x\sqrt{5})(2x\sqrt{2}+1) = 0$; (b) $(2x-\sqrt{7})(x\sqrt{10}+3) = 0$; (c) $(2-3x\sqrt{5})(2.5x+\sqrt{2}) = 0$; (d) $(\sqrt{13}+5x)(3.4-4x\sqrt{17}) = 0$.

Bài toán 40 (Thân et al., 2022, 28., p. 10). Giải phương trình: (a) $(x-1)(5x+3) = (3x-8)(x-1)$; (b) $3x(25x+15) - 35(5x+3) = 0$; (c) $(2-3x)(x+11) = (3x-2)(2-5x)$; (d) $(2x^2+1)(4x-3) = (2x^2+1)(x-12)$; (e) $(2x-1)^2 + (2-x)(2x-1) = 0$; (f) $(x+2)(3-4x) = x^2 + 4x + 4$.

Bài toán 41 (Thân et al., 2022, 29., p. 10). Giải phương trình: (a) $(x-1)(x^2+5x-2)-(x^3-1)=0$; (b) $x^2+(x+2)(11x-7)=4$; (c) $x^3+1=x(x+1)$; (d) $x^3+x^2+x+1=0$.

Bài toán 42 (Thân et al., 2022, 30., p. 10). Giải các phương trình bậc 2 sau bằng cách đưa về dạng phương trình tích: (a) $x^2-3x+2=0$; (b) $-x^2+5x-6=0$; (c) $4x^2-12x+5=0$; (d) $2x^2+5x+3=0$.

Bài toán 43 (Thân et al., 2022, 31., p. 10). Giải các phương trình sau bằng cách đưa về dạng phương trình tích: (a) $(x-\sqrt{2})+3(x^2-2)=0$; (b) $x^2-5=(2x-\sqrt{5})(x+\sqrt{5})$.

Bài toán 44 (Thân et al., 2022, 32., p. 10). Cho phương trình $(3x+2k-5)(x-3k+1)=0$, trong đó $k \in \mathbb{R}$. (a) Tìm các giá trị của k sao cho 1 trong các nghiệm của phương trình là $x=1$. (b) Với mỗi giá trị của k tìm được ở câu (a), giải phương trình đã cho.

Bài toán 45 (Thân et al., 2022, 33., p. 11). Biết $x=-2$ là 1 trong các nghiệm của phương trình $x^3+ax^2-4x-4=0$. (a) Xác định giá trị của a . (b) Với a vừa tìm được ở (a) tìm các nghiệm còn lại của phương trình bằng cách đưa phương trình đã cho về dạng phương trình tích.

Bài toán 46 (Thân et al., 2022, 34., p. 11). Cho biểu thức 2 biến $f(x,y)=(2x-3y+7)(3x+2y-1)$. (a) Tìm các giá trị của y sao cho phương trình (ẩn x) $f(x,y)=0$, nhận $x=-3$ làm nghiệm. (b) Tìm các giá trị của x sao cho phương trình (ẩn y) $f(x,y)=0$ nhận $y=2$ làm nghiệm.

4 Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu

Bài toán 47 (Chính et al., 2022, ?1, Ví dụ 1, pp. 19-20). Giải phương trình: (a) $x + \frac{1}{x-1} = 1 + \frac{1}{x-1}$; (b) $\frac{2x+1}{x-2} = 1$; (c) $\frac{2}{x-1} = 1 + \frac{1}{x+2}$.

Bài toán 48 (Chính et al., 2022, ?2, p. 20). Giải phương trình: (a) $\frac{x}{x-1} = \frac{x+4}{x+1}$; (b) $\frac{3}{x-2} = \frac{2x-1}{x-2} - x$.

Bài toán 49 (Chính et al., 2022, Ví dụ 2, p. 20). Giải phương trình: $\frac{x+2}{x} = \frac{2x+3}{2(x-2)}$.

Bài toán 50 (Chính et al., 2022, Ví dụ 3, p. 21). Giải phương trình: $\frac{x}{2(x-3)} + \frac{x}{2x+2} = \frac{2x}{(x+1)(x-3)}$.

Bài toán 51 (Chính et al., 2022, 27., p. 21). Giải phương trình: (a) $\frac{2x-5}{x+5} = 3$; (b) $\frac{x^2-6}{x} = x + \frac{3}{2}$; (c) $\frac{(x^2+2x)-(3x+6)}{x-3} = 0$; (d) $\frac{5}{3x+2} = 2x-1$.

Bài toán 52 (Chính et al., 2022, 28., p. 21). Giải phương trình: (a) $\frac{2x-1}{x-1} + 1 = \frac{1}{x-1}$; (b) $\frac{5x}{2x+2} + 1 = -\frac{6}{x+1}$; (c) $x + \frac{1}{x} = x^2 + \frac{1}{x^2}$; (d) $\frac{x+3}{x+1} + \frac{x-2}{x} = 2$.

Bài toán 53 (Chính et al., 2022, 30., p. 22). Giải phương trình: (a) $\frac{1}{x-2} + 3 = \frac{x-3}{2-x}$; (b) $2x - \frac{2x^2}{x+3} = \frac{4x}{x+3} + \frac{2}{7}$; (c) $\frac{x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x+1} = \frac{4}{x^2-1}$; (d) $\frac{3x-2}{x+7} = \frac{6x+1}{2x-3}$.

Bài toán 54 (Chính et al., 2022, 31., p. 22). Giải phương trình: (a) $\frac{1}{x-1} - \frac{3x^2}{x^3-1} = \frac{2x}{x^2+x+1}$; (b) $\frac{3}{(x-1)(x-2)} + \frac{2}{(x-3)(x-1)} = \frac{1}{(x-2)(x-3)}$; (c) $1 + \frac{1}{x+2} = \frac{12}{8+x^3}$; (d) $\frac{13}{(x-3)(2x+7)} + \frac{1}{2x+7} = \frac{6}{(x-3)(x+3)}$.

Bài toán 55 (Chính et al., 2022, 32., p. 22). Giải phương trình: (a) $\frac{1}{x} + 2 = (\frac{1}{x} + 2)(x^2+1)$; (b) $(x+1+\frac{1}{x})^2 = (x-1-\frac{1}{x})^2$.

Bài toán 56 (Chính et al., 2022, 33., p. 22). Tìm các giá trị của $a \in \mathbb{R}$ sao cho mỗi biểu thức sau có giá trị bằng 2: (a) $\frac{3a-1}{3a+1} + \frac{a-3}{a+3}$; (b) $\frac{10}{3} - \frac{3a-1}{4a+12} - \frac{7a+2}{6a+18}$.

Bài toán 57 (Thân et al., 2022, 35., p. 11). Đ/S? (a) 2 phương trình tương đương với nhau thì phải có cùng ĐKXD. (b) 2 phương trình có cùng ĐKXD có thể không tương đương với nhau.

Bài toán 58 (Thân et al., 2022, 37., pp. 11-12). Đ/S? (a) Phương trình $\frac{4x-8+(4-2x)}{x^2+1} = 0$ chỉ có 1 nghiệm là $x=2$. (b) Phương trình $\frac{(x+2)(2x-1)-x-2}{x^2-x+1} = 0$ có tập nghiệm là $S = \{-2; 1\}$. (c) Phương trình $\frac{x^2+2x+1}{x+1} = 0$ có nghiệm là $x=-1$. (d) Phương trình $\frac{x^2(x-3)}{x} = 0$ có tập nghiệm là $S = \{0; 3\}$.

Bài toán 59 (Thân et al., 2022, 38., p. 12). Giải phương trình: (a) $\frac{1-x}{x+1} + 3 = \frac{2x+3}{x+1}$; (b) $\frac{(x+2)^2}{2x-3} - 1 = \frac{x^2+10}{2x-3}$; (c) $\frac{5x-2}{2-2x} + \frac{2x-1}{2} = 1 - \frac{x^2+x-3}{1-x}$; (d) $\frac{5-2x}{3} + \frac{(x-1)(X+1)}{3x-1} = \frac{(x+2)(1-3x)}{9x-3}$.

Bài toán 60 (Thân et al., 2022, 39., p. 12). (a) Tìm x sao cho giá trị của biểu thức $\frac{2x^2-3x-2}{x^2-4}$ bằng 2. (b) Tìm x sao cho giá trị của 2 biểu thức $\frac{6x-1}{3x+2}$ & $\frac{2x+5}{x-3}$ bằng nhau. (c) Tìm y sao cho giá trị của 2 biểu thức $\frac{y+5}{y-1} - \frac{y+1}{y-3}$ & $\frac{-8}{(y-1)(y-3)}$ bằng nhau.

Bài toán 61 (Thân et al., 2022, 40., p. 12). *Giải phương trình:* (a) $\frac{1-6x}{x-2} + \frac{9x+4}{x+2} = \frac{x(3x-2)+1}{x^2-4}$; (b) $1 + \frac{x}{3-x} = \frac{5x}{(x+2)(3-x)} + \frac{2}{x+2}$; (c) $\frac{2}{x-1} + \frac{2x+3}{x^2+x+1} = \frac{(2x-1)(2x+1)}{x^3-1}$; (d) $\frac{x^3-(x-1)^3}{(4x+3)(x-5)} = \frac{7x-1}{4x+3} - \frac{x}{x-5}$.

Bài toán 62 (Thân et al., 2022, 41., p. 13). *Giải phương trình:* (a) $\frac{2x+1}{x-1} = \frac{5(x-1)}{x+1}$; (b) $\frac{x-3}{x-2} + \frac{x-2}{x-4} = -1$; (c) $\frac{1}{x-1} + \frac{2x^2-5}{x^3-1} = \frac{4}{x^2+x+1}$; (d) $\frac{13}{(x-3)(2x+7)} + \frac{1}{2x+7} = \frac{6}{x^2-9}$.

Bài toán 63 (Thân et al., 2022, 42., p. 13). *Cho phương trình ẩn x: $\frac{x+a}{a-x} + \frac{x-a}{a+x} = \frac{a(3a+1)}{a^2-x^2}$.* (a) *Giải phương trình với $a = -3$;* (b) *Giải phương trình với $a = 1$;* (c) *Giải phương trình với $a = 0$;* (d) *Tìm các giá trị của a sao cho phương trình nhận $x = \frac{1}{2}$ làm nghiệm.*

Bài toán 64 (Thân et al., 2022, 5.1., p. 13). *Giải các phương trình:*

$$\frac{2}{x + \frac{1}{1 + \frac{x+1}{x-2}}} = \frac{6}{3x-1}, \quad \frac{\frac{x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x+1}}{1 + \frac{x+1}{x-1}} = \frac{x-1}{2(x+1)}, \quad \frac{5}{x} + \frac{4}{x+1} = \frac{3}{x+2} + \frac{2}{x+3}.$$

5 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình

Bài toán 65 (Chính et al., 2022, 34., p. 25). *Mẫu số của 1 phân số lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị. Nếu tăng cả tử & mẫu của nó thêm 2 đơn vị thì được phân số mới bằng $\frac{1}{2}$. Tìm phân số ban đầu.*

Bài toán 66 (Chính et al., 2022, 35., p. 25). *Học kỳ 1, số học sinh giỏi của lớp 8A bằng $\frac{1}{8}$ số học sinh cả lớp. Sang học kỳ 2, có thêm 3 bạn phấn đấu trở thành học sinh giỏi nữa, do đó số học sinh giỏi bằng 20% số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 8A có bao nhiêu học sinh?*

Bài toán 67 (Chính et al., 2022, 36., p. 26). *Thời thơ ấu của Diophantine chiếm $\frac{1}{6}$. $\frac{1}{12}$ cuộc đời tiếp theo là thời thanh niên sôi nổi. Thêm $\frac{1}{7}$ cuộc đời nữa ông sống độc thân. Sau khi lập gia đình được 5 năm thì sinh 1 con trai. Nhưng số mệnh chỉ cho con sống bằng nửa đời cha. Ông đã từ trần 4 năm sau khi con mất. Diophantine sống bao nhiêu tuổi, tính cho ra?*

Bài toán 68 (Chính et al., 2022, p. 27). *1 xe máy khởi hành từ Hà Nội đi Nam Định với vận tốc 35km/h. Sau đó 24 phút, trên cùng tuyến đường đó, 1 ô tô xuất phát từ Nam Định đi Hà Nội với vận tốc 45km/h. Biết quãng đường Nam Định – Hà Nội dài 90km. Sau bao lâu, kể từ khi xe máy khởi hành, 2 xe gặp nhau?*

Bài toán 69 (Chính et al., 2022, p. 28). *1 phân xưởng may lập kế hoạch may 1 lô hàng, theo đó mỗi ngày phân xưởng phải may xong 90 áo. Nhưng nhờ cải tiến kỹ thuật, phân xưởng đã may được 120 áo mỗi ngày. Do đó, phân xưởng không những đã hoàn thành kế hoạch trước thời hạn 9 ngày mà còn may thêm được 60 áo. Hỏi theo kế hoạch, phân xưởng phải may bao nhiêu áo?*

Bài toán 70 (Chính et al., 2022, 37., p. 30). *Lúc 6:00, 1 xe máy khởi hành từ A để đến B. Sau đó 1 giờ, 1 ô tô cũng xuất phát từ A đến B với vận tốc trung bình lớn hơn vận tốc trung bình của xe máy 20km/h. Cả 2 xe đến B đồng thời vào lúc 9:30 cùng ngày. Tính độ dài quãng đường AB & vận tốc trung bình của xe máy.*

Bài toán 71 (Chính et al., 2022, 38., p. 30). *Điểm kiểm tra Toán của 1 tổ học tập được cho trong bảng sau:*

Điểm số x	4	5	7	8	9	
Tần số n	1	★	2	3	★	N = 10

Biết điểm trung bình của cả tổ là 6.6. Điền các giá trị thích hợp vào 2 dấu ★.

Bài toán 72 (Chính et al., 2022, 39., p. 30). *Lan mua 2 loại hàng & phải trả tổng cộng 120 nghìn đồng, trong đó đã tính cả 10 nghìn đồng là thuế giá trị gia tăng (VAT)³. Biết thuế VAT đối với loại hàng thứ nhất là 10%; thuế VAT đối với loại hàng thứ 2 là 8%. Hỏi nếu không kể thuế VAT thì Lan phải trả mỗi loại hàng bao nhiêu tiền?*

Bài toán 73 (Chính et al., 2022, 40., p. 31). *Năm nay, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Phương. Phương tính 13 năm nữa thì tuổi mẹ chỉ còn gấp 2 lần tuổi Phương thôi. Hỏi năm nay Phương bao nhiêu tuổi?*

Bài toán 74 (Chính et al., 2022, 41., p. 31). *1 số tự nhiên có 2 chữ số. Chữ số hàng đơn vị gấp 2 lần chữ số hàng chục. Nếu thêm chữ số 1 xen vào giữa 2 chữ số ấy thì được 1 số mới lớn hơn số ban đầu là 370. Tìm số ban đầu.*

³Thuế VAT là thuế mà người mua hàng phải trả, người bán hàng thu & nộp cho Nhà nước. Giả sử thuế VAT đối với mặt hàng A được quy định là 10%. Khi đó nếu giá bán của A là a đồng thì kể cả thuế VAT, người mua mặt hàng này phải trả tổng cộng a + 10%a đồng.

Bài toán 75 (Chính et al., 2022, 42., p. 31). Tìm số tự nhiên có 2 chữ số biết nếu viết thêm 1 chữ số 2 vào bên trái & 1 chữ số 2 vào bên phải số đó thì ta được 1 số lớn gấp 153 lần số ban đầu.

Bài toán 76 (Chính et al., 2022, 43., p. 31). Tìm phân số có đồng thời các tính chất sau: (a) Tử số của phân số là số tự nhiên có 1 chữ số; (b) Hiệu giữa tử số & mẫu số bằng 4; (c) Nếu giữ nguyên tử số & viết thêm vào bên phải của mẫu số 1 chữ số đúng bằng tử số thì được $\frac{1}{5}$.

Bài toán 77 (Chính et al., 2022, 44., p. 31). Điểm kiểm tra Toán của 1 lớp được cho trong bảng sau:

Điểm x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Tần số n	0	0	2	*	10	12	7	6	4	1	$N = *$

Tìm 2 dấu * biết điểm trung bình của lớp là 6.06.

Bài toán 78 (Chính et al., 2022, 45., p. 31). 1 xí nghiệp ký hợp đồng dệt 1 số tấm thảm len trong 20 ngày. Do cải tiến kỹ thuật, năng suất dệt của xí nghiệp đã tăng 20%. Bởi vậy, chỉ trong 18 ngày, không những xí nghiệp đã hoàn thành số thảm cần dệt mà còn dệt thêm được 24 tấm nữa. Tính số tấm thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng.

Bài toán 79 (Chính et al., 2022, 46., pp. 31–32). 1 người lái ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 48km/h. Nhưng sau khi đi được 1 giờ với vận tốc ấy, ô tô bị tàu hỏa chắn đường trong 10 phút. Do đó, để kịp đến B đúng thời gian đã định, người đó phải tăng vận tốc thêm 6km/h. Tính quãng đường AB.

Bài toán 80 (Chính et al., 2022, 47., p. 32). Bà An gửi vào quỹ tiết kiệm x nghìn đồng với lãi suất mỗi tháng là $a\%$ ($a > 0$ là 1 số cho trước) & lãi tháng này được tính gộp vào vốn cho tháng sau. (a) Viết biểu thức biểu thị: Số tiền lãi sau tháng thứ nhất. Số tiền (cả gốc lẫn lãi) có được sau tháng thứ nhất. Tổng số tiền lãi có được sau tháng thứ 2. (b) Nếu lãi suất là 1.2% (i.e., $a = 1.2$) & sau 2 tháng số tiền lãi là 48.288 nghìn đồng, thì lúc đầu bà An đã gửi bao nhiêu tiền tiết kiệm?

Bài toán 81 (Chính et al., 2022, 48., p. 32). Năm ngoái, tổng số dân của 2 tỉnh A & B là 4 triệu. Năm nay, dân số của tỉnh A tăng thêm 1.1%, còn dân số của tỉnh B tăng thêm 1.2%. Tuy vậy, số dân của tỉnh A năm nay vẫn nhiều hơn tỉnh B là 807200 người. Tính số dân năm ngoái của mỗi tỉnh.

Bài toán 82 (Thân et al., 2022, 43., p. 14). Tổng của 2 số bằng 80, hiệu của chúng bằng 14. Tìm 2 số đó.

Bài toán 83 (Thân et al., 2022, 44., p. 14). Tổng của 2 số bằng 90, số này gấp đôi số kia. Tìm 2 số đó.

Bài toán 84 (Thân et al., 2022, 45., p. 14). Hiệu của 2 số bằng 18, tỷ số giữa chúng bằng $\frac{5}{8}$. Tìm 2 số đó biết: (a) 2 số đó là 2 số dương. (b) 2 số đó tùy ý.

Bài toán 85 (Thân et al., 2022, 46., p. 14). Hiệu của 2 số bằng 18, tỷ số giữa chúng bằng $\frac{5}{8}$. Tìm 2 số đó biết: (a) 2 số đó là 2 số dương. (b) 2 số đó tùy ý.

Bài toán 86 (Thân et al., 2022, 47., p. 14). 2 số nguyên dương có tỷ số giữa số thứ nhất & số thứ 2 bằng $\frac{3}{5}$. Nếu lấy số thứ nhất chia cho 9, số thứ 2 chia cho 6 thì thương của phép chia số thứ nhất cho 9 bé hơn thương của phép chia số thứ 2 cho 6 là 3 đơn vị. Tìm 2 số đó biết các phép chia nói trên đều là phép chia hết.

Bài toán 87 (Thân et al., 2022, 48., p. 14). Thùng thứ nhất chứa 60 gói kẹo, thùng thứ 2 chứa 80 gói kẹo. Người ta lấy ra từ thùng thứ 2 số gói kẹo nhiều gấp 3 lần số gói kẹo lấy ra từ thùng thứ nhất. Hỏi có bao nhiêu gói kẹo được lấy ra từ thùng thứ nhất biết số gói kẹo còn lại trong thùng thứ nhất nhiều gấp 2 lần số gói kẹo còn lại trong thùng thứ 2?

Bài toán 88 (Thân et al., 2022, 49., p. 14). 1 ô tô đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa với vận tốc 40km/h. Sau 2 giờ nghỉ lại ở Thanh Hóa, ô tô lại từ Thanh Hóa về Hà Nội với vận tốc 30km/h. Tổng thời gian cả đi lẫn về là 10 giờ 45 phút (kể cả thời gian nghỉ lại ở Thanh Hóa). Tính quãng đường Hà Nội – Thanh Hóa.

Bài toán 89 (Thân et al., 2022, 50., p. 14). (Bài toán cổ Hy Lạp) - Thưa Pythagore lỗi lạc, trường của người có bao nhiêu môn đệ? Nhà hiền triết trả lời: - Hiện nay, $\frac{1}{2}$ đang học Toán, $\frac{1}{4}$ đang học Nhạc, $\frac{1}{7}$ đang ngồi yên suy nghĩ. Ngoài ra còn có 3 phụ nữ. Hỏi trường Đại học của Pythagore có bao nhiêu người?

Bài toán 90 (Thân et al., 2022, 51., p. 15). Trong 1 buổi lao động, lớp 8A gồm 40 học sinh chia thành 2 tốp: tốp thứ nhất trồng cây & tốp thứ 2 làm vệ sinh. Tốp trồng cây đông hơn tốp làm vệ sinh là 8 người. Hỏi tốp trồng cây có bao nhiêu học sinh?

Bài toán 91 (Thân et al., 2022, 52., p. 15). Ông của Bình hơn Bình 58 tuổi. Nếu cộng tuổi của ba Bình & 2 lần tuổi của Bình thì bằng tuổi của ông & tổng số tuổi của cả 3 người bằng 130. Tính tuổi của Bình.

Bài toán 92 (Thân et al., 2022, 53., p. 15). 1 số tự nhiên lẻ có 2 chữ số \mathcal{E} chia hết cho 5. Hiệu của số đó \mathcal{E} chữ số hàng chục của nó bằng 68. Tìm số đó.

Bài toán 93 (Thân et al., 2022, 54., p. 15). 1 phân số có tử số bé hơn mẫu số là 11. Nếu tăng tử số lên 3 đơn vị \mathcal{E} giảm mẫu số đi 4 đơn vị thì được 1 phân số bằng $\frac{3}{4}$. Tìm phân số ban đầu.

Bài toán 94 (Thân et al., 2022, 55., p. 15). 1 số thập phân có phần nguyên là số có 1 chữ số. Nếu viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó, sau đó chuyển dấu phẩy sang trái 1 chữ số thì được số mới bằng $\frac{9}{10}$ số ban đầu. Tìm số thập phân ban đầu.

Bài toán 95 (Thân et al., 2022, 56., p. 15). 1 ô tô đi từ Hà Nội lúc 8 giờ sáng, dự kiến đến Hải Phòng vào lúc 10:30 phút. Nhưng mỗi giờ ô tô đã đi chậm hơn so với dự kiến là 10km nên mãi đến 11:20 xe mới tới Hải Phòng. Tính quãng đường Hà Nội – Hải Phòng.

Bài toán 96 (Thân et al., 2022, 57., p. 15). 1 tàu chở hàng từ ga Vinh về ga Hà Nội. Sau đó 1.5 giờ, 1 tàu chở khách xuất phát từ ga Hà Nội đi Vinh với vận tốc lớn hơn vận tốc tàu chở hàng là 7km/h. Khi tàu khách đi được 4 giờ thì nó còn cách tàu hàng là 25km. Tính vận tốc mỗi tàu biết 2 ga cách nhau 319km.

Bài toán 97 (Thân et al., 2022, 58., p. 15). 1 người đi xe đạp từ A đến B. Lúc đầu, trên đoạn đường đá, người đó đi với vận tốc 10km/h. Trên đoạn đường còn lại là đường nhựa, dài gấp rưỡi đoạn đường đá, người đó đi với vận tốc 15km/h. Sau 4 giờ người đó đến B. Tính độ dài quãng đường AB.

Bài toán 98 (Thân et al., 2022, 59., p. 15). Bánh trước của 1 máy kéo có chu vi là 2.5m, bánh sau có chu vi là 4m. Khi máy kéo đi từ A đến B, bánh trước quay nhiều hơn bánh sau 15 vòng. Tính khoảng cách AB.

Bài toán 99 (Thân et al., 2022, 60., p. 15). 1 miếng hợp kim đồng \mathcal{E} thiếc có khối lượng 12kg, chứa 45% đồng. Hỏi phải thêm vào đó bao nhiêu thiếc nguyên chất để được 1 hợp kim mới có chứa 40% đồng?

Bài toán 100 (Thân et al., 2022, 61., pp. 15–16). 1 cửa hàng bán 1 máy vi tính với giá 6.5 triệu đồng chưa kể thuế giá trị gia tăng (VAT). Anh Trọng mua chiếc máy vi tính đó cùng với 1 modem⁴ ngoài \mathcal{E} phải trả tổng cộng 7.546 triệu đồng, trong đó đã tính cả 10% thuế VAT. Hỏi giá tiền 1 chiếc modem (không kể VAT) là bao nhiêu?

6 Miscellaneous

Bài toán 101 (Chính et al., 2022, 50., p. 33). Giải phương trình: (a) $3 - 4x(25 - 2x) = 8x^2 + x - 300$; (b) $\frac{2(1-3x)}{5} - \frac{2+3x}{10} = 7 - \frac{3(2x+1)}{4}$; (c) $\frac{5x+2}{6} - \frac{8x-1}{3} = \frac{4x+2}{5} - 5$; (d) $\frac{3x+2}{2} - \frac{3x+1}{6} = 2x + \frac{5}{3}$.

Bài toán 102 (Chính et al., 2022, 51., p. 33). Giải phương trình bằng cách đưa về phương trình tích: (a) $(2x+1)(3x-2) = (5x-8)(2x+1)$; (b) $4x^2 - 1 = (2x+1)(3x-5)$; (c) $(x+1)^2 = 4(x^2 - 2x + 1)$; (d) $2x^3 + 5x^2 - 3x = 0$.

Bài toán 103 (Chính et al., 2022, 52., p. 33). Giải phương trình: (a) $\frac{1}{2x-3} - \frac{3}{x(2x-3)} = \frac{5}{x}$; (b) $\frac{x+2}{x-2} - \frac{1}{x} = \frac{2}{x(x-2)}$; (c) $\frac{x+1}{x-2} + \frac{x-1}{x+2} = \frac{2(x^2+2)}{x^2-4}$; (d) $(2x+3)\left(\frac{3x+8}{2-7x} + 1\right) = (x-5)\left(\frac{3x+8}{2-7x} + 1\right)$.

Bài toán 104 (Chính et al., 2022, 53., p. 34). Giải phương trình: $\frac{x+1}{9} + \frac{x+2}{8} = \frac{x+3}{7} + \frac{x+4}{6}$.

Bài toán 105 (Chính et al., 2022, 54., p. 34). 1 canô xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 4h \mathcal{E} ngược dòng từ bến B về bến A mất 5h. Tính khoảng cách giữa 2 bến A \mathcal{E} B biết vận tốc của dòng nước là 2km/h.

Bài toán 106 (Chính et al., 2022, 55., p. 34). Biết 200g 1 dung dịch chứa 50g muối. Hỏi phải pha thêm bao nhiêu gam nước vào dung dịch đó để được 1 dung dịch chứa 20% muối?

Bài toán 107 (Chính et al., 2022, 56., p. 34). Để khuyến khích tiết kiệm điện, giá điện sinh hoạt được tính theo kiểu lũy tiến, i.e., nếu người sử dụng càng dùng nhiều điện thì giá mỗi số điện (1kWh) càng tăng lên theo các mức như sau: Mức thứ nhất: Tính cho 100 số điện đầu tiên. Mức thứ 2: Tính cho số điện thứ 101 đến 150, mỗi số đắt hơn 150 đồng so với mức thứ nhất. Mức thứ 3: Tính cho số điện thứ 151 đến 200, mỗi số đắt hơn 200 đồng so với mức thứ 2. ... Ngoài ra, người sử dụng còn phải trả thêm 10% thuế giá trị gia tăng (thuế VAT). Tháng vừa qua, nhà Cường dùng hết 165 số điện \mathcal{E} phải trả 95700 đồng. Hỏi mỗi số điện ở mức thứ nhất giá bao nhiêu?

Bài toán 108 (Thân et al., 2022, 62., p. 16). Cho 2 biểu thức $A = \frac{5}{2m+1}$ \mathcal{E} $B = \frac{4}{2m-1}$. Tìm các giá trị của m để 2 biểu thức ấy có giá trị thỏa mãn hệ thức: (a) $2A + 3B = 0$; (b) $AB = A + B$.

⁴“Modem là 1 thiết bị dùng để chuyển đổi các tín hiệu số do máy tính phát ra thành các tín hiệu thích hợp, truyền qua đường điện thoại, & ngược lại. Với 1 máy tính cá nhân & 1 modem, người ta có thể trao đổi thông tin giữa các tổ chức hay cá nhân qua mạng Internet. Khi mua 1 máy tính không có modem trong (i.e., modem được thiết kế & cài đặt sẵn trong máy) mà muốn sử dụng Internet, người ta phải mua thêm 1 modem ngoài.” – Thân et al., 2022, p. 15

Bài toán 109 (Thân et al., 2022, 63., p. 16). *Giải phương trình: (a) $(x\sqrt{13} + \sqrt{5})(\sqrt{7} - x\sqrt{3}) = 0$; (b) $(x\sqrt{2.7} - 1.54)(\sqrt{1.02} + x\sqrt{3.1}) = 0$.*

Bài toán 110 (Thân et al., 2022, 64., p. 16). *Giải phương trình: (a) $\frac{9x-0.7}{4} - \frac{5x-1.5}{7} = \frac{7x-1.1}{3} - \frac{5(0.4-2x)}{6}$; (b) $\frac{3x-1}{x-1} - \frac{2x+5}{x+3} = 1 - \frac{4}{(x-1)(x+3)}$; (c) $\frac{3}{4(x-5)} + \frac{15}{50-2x^2} = \frac{-7}{6(x+5)}$; (d) $\frac{8x^2}{3(1-4x^2)} = \frac{2x}{6x-3} - \frac{1+8x}{4+8x}$.*

Bài toán 111 (Thân et al., 2022, 65., pp. 16–17). *Cho phương trình (ẩn x): $4x^2 - 25 + k^2 + 4kx = 0$. (a) Giải phương trình với $k = 0$. (b) Giải phương trình với $k = -3$. (c) Tìm các giá trị của k sao cho phương trình nhận $x = -2$ làm nghiệm.*

Bài toán 112 (Thân et al., 2022, 66., p. 17). *Giải phương trình: (a) $(x+2)(x^2 - 3x + 5) = (x+2)x^2$; (b) $\frac{-7x^2+4}{x^3+1} = \frac{5}{x^2-x+1} - \frac{1}{x+1}$; (c) $2x^2 - x = 3 - 6x$; (d) $\frac{x-2}{x+2} - \frac{3}{x-2} = \frac{2(x-11)}{x^2-4}$.*

Bài toán 113 (Thân et al., 2022, 67., p. 17). *Số nhà của Khanh là 1 số tự nhiên có 2 chữ số. Nếu thêm chữ số 5 vào bên trái số đó thì được 1 số ký hiệu là A. Nếu thêm chữ số 5 vào bên phải số đó thì được 1 số ký hiệu là B. Tìm số nhà của Khanh biết $A - B = 153$.*

Bài toán 114 (Thân et al., 2022, 68., p. 17). *1 đội thợ mỏ lập kế hoạch khai thác than, theo đó mỗi ngày phải khai thác được 50 tấn than. Khi thực hiện, mỗi ngày đội khai thác được 57 tấn than. Do đó, đội đã hoàn thành kế hoạch trước 1 ngày & còn vượt mức 13 tấn than. Hỏi theo kế hoạch, đội phải khai thác bao nhiêu tấn than?*

Bài toán 115 (Thân et al., 2022, 69., p. 17). *2 xe ô tô cùng khởi hành từ Lạng Sơn về Hà Nội, quãng đường dài 163km. Trong 43km đầu, 2 xe có cùng vận tốc. Nhưng sau đó chiếc xe thứ nhất tăng vận tốc lên gấp 1.2 lần vận tốc ban đầu, trong khi chiếc xe thứ 2 vẫn duy trì vận tốc cũ. Do đó xe thứ nhất đã đến Hà Nội sớm hơn xe thứ 2 40 phút. Tính vận tốc ban đầu của 2 xe.*

Bài toán 116 (Thân et al., 2022, 70., p. 17). *1 đoàn tàu hỏa từ Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh. 1 giờ 48 phút sau, 1 đoàn tàu hỏa khác khởi hành từ Nam Định cũng đi TP Hồ Chí Minh với vận tốc nhỏ hơn vận tốc của đoàn thứ nhất là 5km/h. 2 đoàn tàu gặp nhau (tại 1 ga nào đó) sau 4 giờ 48 phút kể từ khi đoàn thứ nhất khởi hành. Tính vận tốc mỗi đoàn tàu biết ga Nam Định nằm trên đường từ Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh & cách ga Hà Nội 87km.*

Bài toán 117 (Thân et al., 2022, 71., p. 17). *Lúc 7:00, 1 chiếc canô xuôi dòng từ bến A đến bến B, cách nhau 36km, rồi ngày lập tức quay trở về & đến bến A lúc 11:30. Tính vận tốc của canô khi xuôi dòng biết vận tốc nước chảy là 6km/h.*

Bài toán 118 (Thân et al., 2022, III.1., p. 18). *Giải phương trình: (a) $\frac{13}{(2x+7)(x-3)} + \frac{1}{2x+7} = \frac{6}{x^2-9}$; (b) $\left(1 - \frac{2x-1}{x+1}\right)^3 + 6\left(1 - \frac{2x-1}{x+1}\right)^2 = \frac{12(2x-1)}{x+1} - 20$.*

Bài toán 119 (Thân et al., 2022, III.2., p. 18). *(a) Cho 3 số a, b, c đôi một phân biệt. Giải phương trình: $\frac{x}{(a-b)(a-c)} + \frac{x}{(b-a)(b-c)} + \frac{x}{(c-a)(c-b)} = 2$. (b) Cho số a & 3 số b, c, d khác a & thỏa mãn điều kiện $c + d = 2b$. Giải phương trình:*

$$\frac{x}{(a-b)(a-c)} - \frac{2x}{(a-b)(a-d)} + \frac{3x}{(a-c)(a-d)} = \frac{4a}{(a-c)(a-d)}.$$

Bài toán 120 (Thân et al., 2022, III.3., p. 18). *Cần phải thêm vào tử & mẫu của phân số $\frac{13}{18}$ với cùng 1 số tự nhiên nào để được phân số $\frac{4}{5}$?*

Bài toán 121 (Thân et al., 2022, III.4., p. 18). *Cách đây 10 năm, tuổi của người thứ nhất gấp 3 lần tuổi của người thứ 2. Sau đây 2 năm, tuổi của người thứ 2 bằng nửa tuổi của người thứ nhất. Hỏi hiện nay, tuổi của mỗi người là bao nhiêu?*

Tài liệu

Chính, Phan Đức, Tôn Thân, Nguyễn Huy Doan, Lê Văn Hồng, Trương Công Thành, and Nguyễn Hữu Thảo (2022). *Toán 8 Tập 2*. Tái bản lần thứ 18. Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, p. 133.

Thân, Tôn, Nguyễn Huy Doan, Lê Văn Hồng, Trần Hữu Nam, Trương Công Thành, and Nguyễn Hữu Thảo (2022). *Bài Tập Toán 8 Tập 2*. Tái bản lần thứ 18. Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, p. 192.

Tuyên, Bùi Văn (2022). *Bài Tập Nâng Cao & Một Số Chuyên Đề Toán 8*. Tái bản lần thứ 17. Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, p. 326.