

微積溯源序

微積溯源八卷，前四卷爲微分術，後四卷爲積分術，乃算學中最深之事也。余既與西士傅蘭雅譯畢代數術二十五卷，更思求其進境，故又與傅君譯此書焉。先是咸豐年間，曾有海甯李壬叔與西士偉烈亞力譯出代微積拾級一書，流播海內。余素與壬叔相友，得讀其書，粗明微積二術之梗概。所以又譯此書者，蓋欲補其所略也。書中代數之式甚繁，校算不易，則劉君省菴之力居多。

今刻工已竣矣，故序之，曰：吾以爲古時之算法惟有加減而已。其乘與除乃因加減之不勝其繁，故更立二術以使之簡易也。開方之法，又所以濟除法之窮者也。蓋算學中自有加減乘除開方五法，而一切淺近易明之數，無不可通矣。惟人之心思智慮日出不窮，往往以能人之所不能者爲快。遇有窒礙難通之處，輒思立法以濟其窮。故有減其所不可減而正負之名不得不立矣；除其所不能除而寄母通分之法又不得不立矣。代數中種種記號之法皆出於不得已而立者也，惟每立一法必能使繁者爲簡，難者爲易，遲者爲速，而算學之境界藉此得更進一層。如是屢進不已而所立之法於是乎日多矣。微分積分者，蓋又因乘除開

方之不勝其繁，且有窒礙難通之處，故更立此二術以濟其窮，又使簡易而速者也。試觀圓徑求周、真數求對等事，雖無微分積分之時，亦未嘗不可求，惟須乘除開方數十百次。其難有不可言喻者，不如用微積之法理明而數捷也。然則謂加減乘除開方代數之外者，更有二術焉，一曰微分，一曰積分可也。其積分術爲微分之還原，猶之開平方爲自乘之還原、除法爲乘之還原、減法爲加之還原也。然加與乘其原無不可還，而微分之原有可還有不可還，是猶算式中有不可開之方耳，又何怪焉。如必曰加減乘除開方已足供吾之用矣，何必更究其精？是舍舟車之便利而必欲負重遠行也。其用力多而成功少，蓋不待智者而辨矣。

同治十三年九月十八日，金匱華衡芳序。

微積溯源卷一

論變數與函數之變比例

第一款 用代數以解任何曲線，其中每有幾種數，其大小恒有定率者，如橢圓之長徑、拋物線之通徑、雙曲線之屬徑之類是也。

又每有幾種數可有任若干相配之同數，其大小恒不能有定率者，如曲線任一點之縱橫線是也。

數既有此兩種分別，則每種須有一總名以賅之，故名其有定之數曰常數，無定之數曰變數。

凡常數之同數不能增亦不能損。

凡變數之同數，能變爲大，亦能變爲小。故其從此同數變至彼同數之時，必歷彼此二數間最小最微之各分數。

如平圓之半徑爲常數，而其任一段之弧或弧之弦矢切割各線，及各線與弧所成之面，

皆謂之變數。

橢圓之長徑短徑皆爲常數，而其曲線之任一段或曲線上任一點之縱橫線，並其形內形外所能作之任何線或面或角，皆謂之變數。

拋物線之通徑爲常數，而其曲線之任一段或任一點之縱橫線、或弧與縱橫線所成之面，皆謂之變數。他種曲線亦然。

凡常數，恒以甲乙丙丁等字代之。凡變數，恒以天地人等字代之。

第二款 若有彼此二數皆爲變數，此數變而彼數因此數變而亦變者，則彼數爲此數之函數。

如平圓之八線皆爲弧之函數。若反求之，亦可以弧爲八線之函數。

又如重學中令物體前行之力，與其物所行之路，皆爲時刻之函數。

如有式 $\frac{\text{地} \perp \text{天}}{\text{甲} \perp \text{天}}$ ，此式中甲爲常數，天爲自主之變數，地爲天之函數。故地之同

數能以天與甲明之。

如有式 $\frac{\text{地} \perp \text{一}}{\text{甲}(\text{地} \perp \text{一})}$ ，此式中甲與一皆爲常數，地爲自主之變數，天爲地之函數，

故天之同數可以地與甲及一明之。

如有式 $\frac{\text{丙} \perp \text{天}^2}{\text{甲} \perp \sqrt{\text{乙} \text{天}}}$ ，其甲

乙丙爲常數，天爲自變之數，而戊皆爲天之函數。

凡函數之中，可以有數箇自主之變數。

如有式 $戊 = 甲天^2 + 乙天地 + 丙地^2$ ，則天與地皆爲自主之變數，戊爲天地兩變數之函數。

凡變數之函數，其形雖有多種，然每可化之，使不外乎以下數類 $天^{\frac{1}{2}}$ ， $天^{\frac{1}{3}}$ ， $天^{\frac{1}{4}}$ ， $天^{\frac{1}{5}}$ 等類是也。

凡函數爲 $天^{\frac{1}{n}}$ 之類，其指數爲常數，則可從天之卯方，用代數之常法化之。而以有窮之項明其函數之同數。故謂之代數函數，亦謂之常函數。

如有式 $戊 = 甲天^2 + \sqrt{\frac{甲^2 + 天^2}{乙天 + 丙^2}}$ ，此種函數，其戊之同數可用加減乘除開方等法而得之。

凡函數爲 $天^{\frac{1}{n}}$ ， $天^{\frac{1}{m}}$ 之類，則其函數之同數不能以有窮之項明之。故謂之越函數。越者，超越於尋常之意也。

凡函數爲 $天^{\frac{1}{n}}$ ， $天^{\frac{1}{m}}$ 及 $天^{\frac{1}{k}}$ ， $天^{\frac{1}{l}}$ 之類，其函數之同數皆可以平圓之各線明之。故謂之圓函數，亦謂之角函數。以上三種函數常函數、越函數、圓函數也。，若已知天之同數，則其函數之同數即可求得。故

名此三種函數爲陽函數。因其顯而易明，故謂之陽函數。

更有他種函數，必先解其方程式，令函數中之各變數分開，然後能求其同數者。

如有式 $\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1$ ，其成爲天之函數，如欲求其成與天相配之同數，必先解其次方程式始能通。

此種之式名曰天之陰函數。因其雜糅未明，故謂之陰函數。反之亦可云天爲成之陰函數。

如解其方程式爲 $\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1$ ，則成變爲天之陰函數。

整理者註：右最後一句云成變爲天之陰函數，這顯而易見是錯誤的。原文大英百科全書卷第九之 Fluxions 作 explicit function，即陽函數，此當爲譯者譯錯。目前由於校勘凡例未定，暫留此字，待討論後決定修改與否。

昔代數之家，凡遇須用開平方之處，每于其式之左旁作一根字以記之，如 \sqrt{x} 爲天之平方根。後又變通其法，而以根號記之，如 \sqrt{x} 爲天之平方根。此代數之例也。茲可仿照此例，凡遇某變數之函數，亦用一號以記之。所以凡有任何變數之函數，皆可書一函字于其變數之旁，以爲識別。

如天之函數則作 $\text{函}x$ ，或作 $\text{函}(x)$ ，皆言天之函數也。

所以凡見變數之左旁有一函字者，其函字并非代表天之倍數，其意謂是某變數之函數

也。

用此法則可將 $\text{戊} = \text{天}^{\text{卯}}$ 、 $\text{戊} = \text{甲}^{\text{天}}$ 、 $\text{戊} = \text{對天}$ 、 $\text{戊} = \text{正弦天}$ 、 $\text{戊} = \text{餘弦天}$ 各種之式以一語賅之，謂之 $\text{戊} = \text{函天}$ 或 $\text{戊} = \text{函}(\text{天})$ 。

若函數從兩箇變數而成，其天與地皆爲自主之變數，其式如 $\text{戊} = \text{甲}^{\text{天}} \text{乙}^{\text{地}}$ 者，則可以 $\text{戊} = \text{函}(\text{天}, \text{地})$ 別之。函數爲多箇變數所成者，仿此推之。惟函數只指其變數言之，若甲乙丙丁各常數。雖多不論。

第三款 凡觀此書者，必先明變數與函數變比例之限。如幾何原本中證明平圓之面積必比其外切多等邊形之面積微小，若其外切多等邊形之邊愈多，則其面積愈近于平圓之面積。所以可設平圓之面積爲任何小，而切其圓外爲多等邊形，可使多等邊形之面積與平圓之面積較其數甚小于所設之圓面積；再設其多等邊形之面積爲級數，而其邊之變率可每變多若干倍，則其多等邊形之面積必漸與平圓之面積相近而以平圓爲限。雖切于圓外之多邊形其邊任變至若何多，其面積總不能等于平圓之面積。然其級數之總數可比平圓之面積所差甚微，其較數之小，可小至莫可名言。

若用此法于圓內容多等邊形，則其多等邊形之面積亦以平圓之面積爲限。總言之，凡平圓之周爲其內容外切多等邊形之限。

乘數 $1 - \frac{1}{2^n}$ 之類與一相較之差甚小，若卯愈大，則其差愈微；若令卯爲任意大，則各乘數可略等於一，所以得 $\left(1 - \frac{1}{2^n}\right)^{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n} + \frac{1 \cdot 1 \cdot 1}{2^n \cdot 2^n} - \frac{1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1}{2^n \cdot 2^n \cdot 2^n} + \dots$ ①。

曾在代數術第一百七十七款中證①式之右邊爲由函數 e^x 而成。其戊之同數因爲 e^{-x} 即訥白爾對數之根也。所以卯若愈大則 $\left(1 - \frac{1}{2^n}\right)^{2^n}$ 必愈與 e^{-x} 相近，而其限爲 e^{-x} 。

如令 $x = 1$ ，則 $\left(1 - \frac{1}{2^n}\right)^{2^n}$ 之限爲戊，即 $\left(1 - \frac{1}{2^n}\right)^{2^n} - e^{-1} = 0.7182818284620498 \dots$ 故其函數爲常數。

第四款 惟因函數之同數本從變數而生，故變數之同數與函數之長數比則爲 $\frac{x}{e^x - 1} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{12} - \frac{x^4}{720} + \dots$

設函數之式爲 $y = f(x)$ ，令天長數爲辛，而以函數之新同數爲戊，則

辛之各方之倍數，則函數 $\text{戊} = \text{天}^{\text{卯}}$ 之新同數必爲 $\text{戊}' = \text{辛}^{\text{一}} \text{巴}^{\text{辛}} \text{辛}^{\text{一}} \text{辛}^{\text{二}} \text{辛}^{\text{三}} \text{辛}^{\text{四}} \text{辛}^{\text{五}} \text{辛}^{\text{六}} \text{辛}^{\text{七}} \text{辛}^{\text{八}} \text{辛}^{\text{九}} \text{辛}^{\text{十}} \text{辛}^{\text{十一}} \text{辛}^{\text{十二}}$ 。由是知函數之新同數必爲級數，其初項戊爲函數之原同數，其餘各項爲天之長數辛之各整方，以巳午未申之類爲各倍數，其各倍數皆爲天之別種函數，其式亦從本函數而生。

由以上各式又可見函數爲 $\text{戊} = \text{天}^{\text{一}}$ 、 $\text{戊} = \text{天}^{\text{二}}$ 、 $\text{戊} = \text{天}^{\text{三}}$ 、 $\text{戊} = \text{天}^{\text{四}}$ 之類，則其變數與函數之變比例必爲 $\frac{\text{辛}}{\text{戊}' \text{丁} \text{戊}} = \text{二天}^{\text{一}} \text{辛}$ 、 $\frac{\text{辛}}{\text{戊}' \text{丁} \text{戊}} = \text{三天}^{\text{二}} \text{辛}^{\text{一}} \text{三天}^{\text{三}} \text{辛}^{\text{二}} \text{三天}^{\text{四}} \text{辛}^{\text{三}} \text{三天}^{\text{五}} \text{辛}^{\text{四}} \text{三天}^{\text{六}} \text{辛}^{\text{五}} \text{三天}^{\text{七}} \text{辛}^{\text{六}} \text{三天}^{\text{八}} \text{辛}^{\text{七}} \text{三天}^{\text{九}} \text{辛}^{\text{八}} \text{三天}^{\text{十}} \text{辛}^{\text{九}} \text{三天}^{\text{十一}} \text{辛}^{\text{十}} \text{三天}^{\text{十二}} \text{辛}^{\text{十一}}$ 。四 $\text{天}^{\text{三}} \text{辛}^{\text{一}} \text{六天}^{\text{二}} \text{辛}^{\text{一}} \text{四天}^{\text{三}} \text{辛}^{\text{一}} \text{辛}^{\text{二}}$ 之類。總之若以卯爲天之整指數，則 $\text{戊} = \text{天}^{\text{卯}}$ 之變比例必爲 $\frac{\text{辛}}{\text{戊}' \text{丁} \text{戊}} = \text{巴}^{\text{辛}} \text{辛}^{\text{一}} \text{辛}^{\text{二}} \text{辛}^{\text{三}} \text{辛}^{\text{四}} \text{辛}^{\text{五}} \text{辛}^{\text{六}} \text{辛}^{\text{七}} \text{辛}^{\text{八}} \text{辛}^{\text{九}} \text{辛}^{\text{十}} \text{辛}^{\text{十一}} \text{辛}^{\text{十二}}$ 。由此可見，變數天之長數與函數天之長數其變比例

數 $\text{天}^{\text{卯}}$ 之長數其變比例 $\frac{\text{辛}}{\text{戊}' \text{丁} \text{戊}}$ 之同數 $\text{巴}^{\text{辛}} \text{辛}^{\text{一}} \text{辛}^{\text{二}} \text{辛}^{\text{三}} \text{辛}^{\text{四}} \text{辛}^{\text{五}} \text{辛}^{\text{六}} \text{辛}^{\text{七}} \text{辛}^{\text{八}} \text{辛}^{\text{九}} \text{辛}^{\text{十}} \text{辛}^{\text{十一}} \text{辛}^{\text{十二}}$ ……可分之爲兩

式，其一式爲 巴 ，此式與天之長數辛無相關；又一式爲 $\text{辛}^{\text{一}} \text{辛}^{\text{二}} \text{辛}^{\text{三}} \text{辛}^{\text{四}} \text{辛}^{\text{五}} \text{辛}^{\text{六}} \text{辛}^{\text{七}} \text{辛}^{\text{八}} \text{辛}^{\text{九}} \text{辛}^{\text{十}} \text{辛}^{\text{十一}} \text{辛}^{\text{十二}}$ ……即 $\text{辛}^{\text{一}} (\text{辛}^{\text{一}} \text{辛}^{\text{二}} \text{辛}^{\text{三}} \text{辛}^{\text{四}} \text{辛}^{\text{五}} \text{辛}^{\text{六}} \text{辛}^{\text{七}} \text{辛}^{\text{八}} \text{辛}^{\text{九}} \text{辛}^{\text{十}} \text{辛}^{\text{十一}} \text{辛}^{\text{十二}} \dots\dots)$ 。此式因以辛爲乘數，故辛若變小，其數亦必隨辛而變小。如令辛爲任何小，則此式之數可小至甚近于○。故此數可以不計，而以巳爲變比例之限。

此二種法，若細攷其根源，即奈端所謂正流數、反流數也；亦即來本之所謂微分算術、積分算術也；又即拉果闡諸所謂函數變例也。

論各種函數求微分之公法

第五款 若函數之式爲 $\alpha = \alpha^{\text{二}} \alpha^{\text{一}}$ ，令天變爲 $\alpha^{\text{一}} \alpha^{\text{二}}$ ，則函數之新同數必爲 $\alpha^{\text{一}} = \alpha^{\text{一}} \alpha^{\text{一}} \alpha^{\text{二}} \alpha^{\text{二}}$ ，其與原同數之較爲 $\alpha^{\text{一}} \alpha^{\text{二}}$ ，即 $\alpha^{\text{一}} \alpha^{\text{二}} \alpha^{\text{一}}$ ，此式之初項 $\alpha^{\text{一}} \alpha^{\text{二}}$ ，名之曰溢率。依同理推之，若函數之式爲 $\alpha = \alpha^{\text{三}}$ ，令天變爲 $\alpha^{\text{一}} \alpha^{\text{二}}$ ，則函數之新同數爲 $\alpha^{\text{一}} = \alpha^{\text{一}} \alpha^{\text{二}} \alpha^{\text{三}}$ ，其與原同數之較爲 $\alpha^{\text{一}} \alpha^{\text{二}}$ ，即 $\alpha^{\text{一}} \alpha^{\text{二}} \alpha^{\text{一}} \alpha^{\text{二}}$ 。其初項 $\alpha^{\text{一}} \alpha^{\text{二}}$ 爲溢率。

若函數之式爲 $\alpha = \alpha^{\text{四}}$ ，而天變爲 $\alpha^{\text{一}} \alpha^{\text{二}}$ ，則函數之新同數與原同數之較爲 $\alpha^{\text{一}} \alpha^{\text{二}} \alpha^{\text{三}}$ 。而天變爲 $\alpha^{\text{一}} \alpha^{\text{二}} \alpha^{\text{三}}$ ，而其溢率爲 $\alpha^{\text{一}} \alpha^{\text{二}}$ 。

總言之，凡天之函數無論爲某方，恆可以 $\alpha^{\text{一}} \alpha^{\text{二}}$ 代其天，而變其函數之同數爲 $\alpha^{\text{一}} \alpha^{\text{二}} \alpha^{\text{三}} \alpha^{\text{四}} \alpha^{\text{五}} \alpha^{\text{六}} \alpha^{\text{七}} \alpha^{\text{八}} \alpha^{\text{九}} \alpha^{\text{十}} \alpha^{\text{十一}} \alpha^{\text{十二}} \alpha^{\text{十三}} \alpha^{\text{十四}} \alpha^{\text{十五}} \alpha^{\text{十六}} \alpha^{\text{十七}} \alpha^{\text{十八}} \alpha^{\text{十九}} \alpha^{\text{二十}} \alpha^{\text{二十一}} \alpha^{\text{二十二}} \alpha^{\text{二十三}} \alpha^{\text{二十四}} \alpha^{\text{二十五}} \alpha^{\text{二十六}} \alpha^{\text{二十七}} \alpha^{\text{二十八}} \alpha^{\text{二十九}} \alpha^{\text{三十}} \alpha^{\text{三十一}} \alpha^{\text{三十二}} \alpha^{\text{三十三}} \alpha^{\text{三十四}} \alpha^{\text{三十五}} \alpha^{\text{三十六}} \alpha^{\text{三十七}} \alpha^{\text{三十八}} \alpha^{\text{三十九}} \alpha^{\text{四十}} \alpha^{\text{四十一}} \alpha^{\text{四十二}} \alpha^{\text{四十三}} \alpha^{\text{四十四}} \alpha^{\text{四十五}} \alpha^{\text{四十六}} \alpha^{\text{四十七}} \alpha^{\text{四十八}} \alpha^{\text{四十九}} \alpha^{\text{五十}}$ ，乃以原同數 $\alpha^{\text{一}} \alpha^{\text{二}}$ 減之得 $\alpha^{\text{一}} \alpha^{\text{二}} \alpha^{\text{三}} \alpha^{\text{四}} \alpha^{\text{五}} \alpha^{\text{六}} \alpha^{\text{七}} \alpha^{\text{八}} \alpha^{\text{九}} \alpha^{\text{十}} \alpha^{\text{十一}} \alpha^{\text{十二}} \alpha^{\text{十三}} \alpha^{\text{十四}} \alpha^{\text{十五}} \alpha^{\text{十六}} \alpha^{\text{十七}} \alpha^{\text{十八}} \alpha^{\text{十九}} \alpha^{\text{二十}} \alpha^{\text{二十一}} \alpha^{\text{二十二}} \alpha^{\text{二十三}} \alpha^{\text{二十四}} \alpha^{\text{二十五}} \alpha^{\text{二十六}} \alpha^{\text{二十七}} \alpha^{\text{二十八}} \alpha^{\text{二十九}} \alpha^{\text{三十}} \alpha^{\text{三十一}} \alpha^{\text{三十二}} \alpha^{\text{三十三}} \alpha^{\text{三十四}} \alpha^{\text{三十五}} \alpha^{\text{三十六}} \alpha^{\text{三十七}} \alpha^{\text{三十八}} \alpha^{\text{三十九}} \alpha^{\text{四十}} \alpha^{\text{四十一}} \alpha^{\text{四十二}} \alpha^{\text{四十三}} \alpha^{\text{四十四}} \alpha^{\text{四十五}} \alpha^{\text{四十六}} \alpha^{\text{四十七}} \alpha^{\text{四十八}} \alpha^{\text{四十九}} \alpha^{\text{五十}}$ ，而取其初項 $\alpha^{\text{一}} \alpha^{\text{二}}$ 爲溢率。

準此推之，則知天之溢率即爲其長數辛。惟因函數之溢率每藉天之長數而生，故微分

術中，恆以 $\frac{1}{x}$ 代天之溢率。其 $\frac{1}{x}$ 號者，非天之倍數，不過是天之溢率耳。溢率之名，本爲流數術中所用。而 $\frac{1}{x}$ 號者，卽微字之偏旁，故微分之術用之。

如有式 $y = x^2$ ，則 $\frac{dy}{dx} = 2x$ 。此式之意謂 y 之微分等于 $2x$ 乘 x 之微分。猶言函數 y 之溢率等于以 $2x$ 乘其 x 之溢率也。如有式 $y = x^3$ ，則 $\frac{dy}{dx} = 3x^2$ 。此式之意謂 y 之微分等于以 $3x^2$ 乘 x 之微分。猶言函數 y 之溢率等于以 $3x^2$ 乘其 x 之溢率也。

第六款 惟因每遇 $y = x^2$ ，則 $\frac{dy}{dx} = 2x$ ，所以可寫之如 $\frac{dy}{dx} = 2x$ 。此爲天微分之

倍數，亦謂之微係數。

又依前法推之，如函數之式爲 $y = x^3$ ，則 $\frac{dy}{dx} = 3x^2$ ，而 $\frac{dy}{dx} = 3x^2$ 。其 $3x^2$ 爲原函數 $y = x^3$ 之微係數。

總言之，無論何種函數之微係數，皆可以 $\frac{dy}{dx}$ 代之。而函數之新同數爲 $y = x^2$ ， $y = x^3$ ， $y = x^4$ ，……，所以 $\frac{dy}{dx} = 2x$ ，其已爲天之他函數，其形每隨函數之式而變。如之 $y = x^2$ 爲何式，則其已之同數卽易求得。

凡函數之欲求微分者，先于其式之左旁作一 \times 號以記之。如有 $[(\text{甲} \perp \text{天})(\text{乙} \neg \neg \text{天} \neg)]$ 式，欲求其微分，則可先作 $\times[(\text{甲} \perp \text{天})(\text{乙} \neg \neg \text{天} \neg)]$ 。

凡函數之欲求微係數者，于其式之左旁作 \times 號，又以 \times 天爲其分母。如有 $[(\text{甲} \perp \text{天})(\text{乙} \neg \neg \text{天} \neg)]$ 式，欲求其微係數，則作 $\frac{\times[(\text{甲} \perp \text{天})(\text{乙} \neg \neg \text{天} \neg)]}{\times \text{天}}$ 。

從以上各款諸說，易知求微分之公法。

法曰：無論天之任何函數，欲求微分，則以 \times 天代其原式中之天而詳之。依辛之整方數自小而大序之，取其初有辛之項，而以 \times 天代其辛即得。

如有式 $\text{戊} = \text{甲} \text{天} \perp \text{乙} \text{天} \neg$ ，欲求其微係數，則以 $\text{天} \perp \times$ 代其天，而令函數之新同數

$$\begin{aligned} & \text{爲戊}' \text{，則得戊}' = \left\{ \begin{aligned} & = \text{甲}(\text{天} \perp \times) \perp \text{乙}(\text{天} \perp \times) \neg \\ & = \text{甲} \text{天} \perp \text{乙} \text{天} \neg \perp (\text{甲} \perp \neg \text{乙} \text{天}) \times \perp \text{乙} \times \neg \\ & = \text{戊} \perp (\text{甲} \perp \neg \text{乙} \text{天}) \times \perp \text{乙} \times \neg \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

$\neg \text{乙} \text{天}) \times$ ，以 \times 天代其辛，即得 $\times \text{戊} = (\text{甲} \perp \neg \text{乙} \text{天}) \times \text{天}$ ，故其 $\frac{\times \text{天}}{\times \text{戊}} = \text{甲} \perp \neg \text{乙} \text{天}$ 。

第七款 上款之法，必令天變爲 \times 天，而詳其函數之同數爲級數，此乃論其立法之理當如是

也。惟求得級數之後，所用者僅爲其辛一方之項，則但能求得此項已足用矣。前于第四款中言此項之倍數爲變數與函數變比例之限，又于第六款中言此項之倍數謂之微係數。然則求函數之微係數與求變數與函數變比例之限，其法本無異也。

如有式 $\text{戊} = \frac{\text{天}}{\text{甲}^2}$ ，則 $\text{戊}' = \frac{\text{天} \text{上} \text{辛}}{\text{甲}^2}$ 。而 $\text{戊} \text{下} \text{戊}' = \frac{\text{天}}{\text{甲}^2} - \frac{\text{天} \text{上} \text{辛}}{\text{甲}^2}$ ，即 $\text{戊} \text{下} \text{戊}' = \frac{\text{天}(\text{天} \text{上} \text{辛})}{\text{下} \text{甲}^2 \text{辛}}$ ，故其變比例之式爲 $\frac{\text{辛}}{\text{戊} \text{下} \text{戊}'} = \frac{\text{天}(\text{天} \text{上} \text{辛})}{\text{下} \text{甲}^2}$ 。惟此式可不待詳爲級數而始得其變比例之限，因可見辛愈小，則其式愈近于 $\frac{\text{天}^2}{\text{甲}^2}$ ，故此式必即爲 $\frac{\text{天}}{\text{甲}}$ 之同數，

所以得 $\text{天} \text{下} \text{戊} = \text{下} \frac{\text{天}^2}{\text{甲}^2 \text{天}}$ 。

若以戊爲任何函數之原同數，而以 $\text{天} \text{上} \text{辛}$ 代其天，則其函數之新同數爲 $\text{戊}' = \text{戊} \text{上} \text{巴} \text{辛} \text{上} \text{午} \text{辛}^2 \text{上} \text{未} \text{辛}^3 \text{上} \dots$ ，即得 $\frac{\text{辛}}{\text{戊}' \text{下} \text{戊}} = \text{巴} \text{上} \text{午} \text{辛} \text{上} \text{未} \text{辛}^2 \text{上} \dots$ 。惟

因 $\frac{\text{辛}}{\text{戊}' \text{下} \text{戊}}$ 之限爲巴，故得 $\frac{\text{天}}{\text{甲}} = \text{巴}$ ，而 $\text{天} \text{下} \text{戊} = \text{巴} \text{天}$ 。

由此得一解曰：凡微分之術，其意專爲求任何變數與函數同時變大之限耳。凡求任何函數之微分，不過將一尋常之代數式另用他法以變化之。因其變化之法與代

第八款 凡變數與函數變比例之限，無論以何數爲主，其形必同。

[illegible]

第九款 由此易知，凡有相等之函數，則其微係數亦必相等。

如戌與亥爲兩函數，而戌 = 亥，其天變爲天_上午之時，戌變爲戌，亥變爲亥，則戌' = 亥'，而戌'下戌 = 亥'下亥，故 $\frac{\text{戌}'\text{下戌}}{\text{戌}'\text{下亥}} = \frac{\text{亥}'\text{下亥}}{\text{亥}'\text{下亥}}$ 。如以巳與午各爲其變比例之限，則巳 = 午。故巳下天 = 午下天，而午戌 = 亥亥。

由此可見，凡函數之式無論如何改形，若其同數無異者，則其微係數必同。如函數之原式爲 $y = a^x + b^x$ ，若改其形爲 $(a^x + b^x)^c$ ，則此式之微係

申₁巴₁辛₁午₁辛₂上₁……，其巴₁午爲由未函數所得之天之他函數；其巴₁午爲由申函數所得之天之他函數。

再令戊₁ = 未₁申₁，則依法得戊₁ = 未₁申₁ = 未₁申₁(未巴₁上申巴₁)辛₁上(未午₁上巴巴₁上申午)辛₂上……。以戊代其未申，移項而以辛約之，則得 $\frac{\text{戊}_1}{\text{戊}_1 \text{下戊}_1} = \frac{\text{辛}_1}{\text{辛}_1 \text{下戊}_1} = \text{未巴}_1 \text{上申巴}_1$

(未午₁上巴巴₁上申午)辛₁上……。此式中之未巴₁與申巴₁兩項乃天之他函數，而與辛無涉者，其餘各項俱有辛之各方爲乘數。設辛爲甚微，則其所乘之衆項亦甚微，故其變比例之限爲 $\frac{\text{戊}_1 \text{下戊}_1}{\text{辛}_1} = \text{未巴}_1 \text{上申巴}_1$ 。惟因巴₁ = $\frac{\text{辛}_1}{\text{未}_1 \text{下未}_1}$ ，巴₁ = $\frac{\text{辛}_1}{\text{申}_1 \text{下申}_1}$ ，故可

依第六款之法以 $\frac{\text{辛}_1}{\text{戊}_1 \text{下戊}_1}$ 代其 $\frac{\text{辛}_1}{\text{戊}_1 \text{下戊}_1}$ ……以 $\frac{\text{辛}_1}{\text{戊}_1 \text{下戊}_1}$ 代其 $\frac{\text{辛}_1}{\text{戊}_1 \text{下戊}_1}$ ……以 $\frac{\text{辛}_1}{\text{戊}_1 \text{下戊}_1}$ 代其 $\frac{\text{辛}_1}{\text{戊}_1 \text{下戊}_1}$ 。則得 $\frac{\text{辛}_1}{\text{戊}_1} = \text{未}_1 \frac{\text{辛}_1}{\text{戊}_1 \text{下申}_1} \frac{\text{辛}_1}{\text{戊}_1 \text{下申}_1}$ ，因 $\frac{\text{辛}_1}{\text{戊}_1} = \text{未}_1 \frac{\text{辛}_1}{\text{戊}_1 \text{下申}_1} \frac{\text{辛}_1}{\text{戊}_1 \text{下申}_1}$ 未