

Doctor Order & Progress Note

Maharat Nakhon Ratchasima Hospital

Progress note	Date/ time	Order for one day	Order for continuation
Massive PE ○ high risk PE ○ Intermediate to high risk PE BW_____kg วิธีผสม ยา SK** ตามเอกสารแนบ		Fibrinolysis ○ Streptokinase(SK) 1.5 mu dilute in NSS 100 ml IV drip in 120 min ○ ** SK 250,000 U up to NSS 100 ml (Loading dose) IV drip in 30 min เวลา_____ then SK ความเข้มข้น 25,000 U/ml IV drip 4 ml/hr (100,000 unit/hr) via syringe pump เวลา_____ (ยามีอายุ 8 ชั่วโมงหลังผสมยา) Expired เวลา_____ หรือ ○ rt-PA 100 mg iv drip in 120 minutes หรือ ○ rt-PA _____mg (0.6 mg/kg/DOSE) iv drip in 15 min X 1 DOSE (max 50 mg) Record vital sign q 15 min Observe ภาวะเลือดออกผิดปกติ อาการซึม หายใจลำบาก ผื่น คัน If SBP > 180 mmHg, DBP > 105 mmHg SBP < 90 mmHg, HR < 50 please notify แพทย์ผู้สั่ง/Staff	

Department of service.....Ward.....

Attending Physician.....Name of patient &Age

ติด Sticker

ชื่อ-สกุล HN AN ผู้ป่วย

ปรับปรุง เมษายน 2566

เตรียมอุปกรณ์

- SK 1 ขวด
- Syringe 5 CC 1 อัน
- Syringe 50 CC 2 อัน
- NSS 100 CC 2 ขวด
- NSS 5 CC 1 กระเปาะ
- หัวเข็ม

การผสมยา Streptokinase 1,500,000 U/ขวด



ผสม NSS 5 CC

ตั้งขวดทิ้งไว้จนละลายแล้ว
กลิ้งขวดไปทั่วๆระวังเกิดฟอง



SK 5 CC

ความเข้มข้น 300,000 u/ml

วิธีการผสม SK 250,000 U IV bolus followed by 100,000 U/hr infusion for 12-24 h

Syringe 1	Syringe 2 (เตรียมสำหรับ infusion)
 1 ใช้ syringe 50 cc ดูด NSS มา 25 CC 2 ดึงก้านสูบลงประมาณ 30 cc นำปลายเข็ม syringe SK 5 cc แหงตรงปากกระบอก syringe 1 แล้วค่อยๆดัน SK ทั้งหมดผสมใน syringe 3 ห้ามเขย่า สวมปกเข็มแล้วกลิ้ง syringe ไปมา ได้ SK 30 CC ที่ ความเข้มข้น 50,000U/ml	 1. ใช้ syringe 50 cc ดูด NSS มา 25 CC 2. ต้องเตรียม syringe 1 ให้เสร็จก่อน 3. ดึงก้านสูบลงถึงเลข 50 CC แหงปลายเข็ม syringe 1 ลงปากกระบอก syringe 2 แล้วค่อยๆดันสารละลายจากเบอร์ 1 ผสมใน syringe 2 4. ห้ามเขย่า สวมปกเข็มแล้วกลิ้ง syringe ไปมา ได้ SK 50 CC ที่ ความเข้มข้น 25,000U/ml
Bolus	Infusion
 ดูด SK ความเข้มข้น 50,000 U/ml 5 CC ผสมใน NSS 100 CC IV drip in 30 นาที	 SK ความเข้มข้น 25,000 U/ml drip 4 CC/ hr 8 ชั่วโมง ผ่าน syringe pump (ยาหลังเจ็จากอายุ 8 ชั่วโมง)

ใบประเมินข้อห้ามในการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วย Massive PE

ติดสติ๊กเกอร์ผู้ป่วย

ยาละลายลิ่มเลือด o Streptokinase o rt-PA

ข้อห้ามในการให้ยาละลายลิ่มเลือดเด็ดขาด	ใช่	ไม่ใช่
มีประวัติเลือดออกในสมอง(Hemorrhagic stroke) หรือ Stroke of unknown origin		
มีประวัติสมองขาดเลือด (Ischemic stroke) ภายใน 6 เดือน		
ได้รับการบาดเจ็บรุนแรงหรือผ่าตัดใหญ่ภายใน 3 สัปดาห์		
Active bleeding		
Central nervous system neoplasm		
ห้ามใช้ยา Streptokinase เข้าในกรณีเคยได้รับยา Streptokinase มาก่อน ภายใน 6 เดือน		
ภาวะที่ไม่ควรให้ยาละลายลิ่มเลือด		
มีประวัติเป็น Transient ischemic stroke(TIA) ภายใน 6 เดือน		
ได้รับยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด (anticoagulant therapy)		
ได้รับการเจาะในตำแหน่งที่ไม่สามารถหยุดเลือดได้ภายใน 24 ชั่วโมง เช่น การเจาะชั้นเนื้อตับ การเจาะตรวจวัดน้ำไขสันหลัง		
Traumatic resuscitation		
มีความดันโลหิตสูงมากกว่า > 180 mmHg		
มีการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ (infective endocarditis)		
ผู้ป่วยตั้งครรภ์ หรือ First post-partum week		
Advanced liver disease		
Active peptic ulcer		

ผู้ประเมิน _____ วันที่ _____