

เตรียมอุปกรณ์

- SK 1 ขวด
- Syringe 5 CC 1 อัน
- Syringe 50 CC 2 อัน
- NSS 100 CC 2 ขวด
- NSS 5 CC 1 กระเปาะ
- หัวเข็ม

การผสมยา Streptokinase 1,500,000 U/ขวด



ผสม NSS 5 CC

ตั้งขวดทิ้งไว้จนละลายแล้ว
กลิ้งขวดไปทั่วๆระวังเกิดฟอง



SK 5 CC

ความเข้มข้น 300,000 u/ml

วิธีการผสม SK 250,000 U IV bolus followed by 100,000 U/hr infusion for 12-24 h

Syringe 1	Syringe 2 (เตรียมสำหรับ infusion)
 1 ใช้ syringe 50 cc ดูด NSS มา 25 CC 2 ดึงก้านสูบลงประมาณ 30 cc นำปลายเข็ม syringe SK 5 cc แหงตรงปากกระบอก syringe 1 แล้วค่อยๆดัน SK ทั้งหมดผสมใน syringe 3 ห้ามเขย่า สวมปกเข็มแล้วกลิ้ง syringe ไปมา ได้ SK 30 CC ที่ ความเข้มข้น 50,000U/ml	 1. ใช้ syringe 50 cc ดูด NSS มา 25 CC 2. ต้องเตรียม syringe 1 ให้เสร็จก่อน 3. ดึงก้านสูบลงถึงเลข 50 CC แหงปลายเข็ม syringe 1 ลงปากกระบอก syringe 2 แล้วค่อยๆดันสารละลายจากเบอร์ 1 ผสมใน syringe 2 4. ห้ามเขย่า สวมปกเข็มแล้วกลิ้ง syringe ไปมา ได้ SK 50 CC ที่ ความเข้มข้น 25,000U/ml
Bolus	Infusion
 ดูด SK ความเข้มข้น 50,000 U/ml 5 CC ผสมใน NSS 100 CC IV drip in 30 นาที	 SK ความเข้มข้น 25,000 U/ml drip 4 CC/ hr 8 ชั่วโมง ผ่าน syringe pump (ยาหลังเจ็จากอายุ 8 ชั่วโมง)