

Standing order for Antivenom

Maharat Nakhon Ratchasima Hospital

Progress Note	Date/ Time	Orders for one day	Date/ Time	Orders for Continuation
Venomous snake bite ☐ Hematotoxin ☐ Green pit viper (เขียวหางไหม้) ☐ Malayan pit viper: MVP(กะปะ) ☐ Russell's viper: RV (แมวเซา) ☐ Unknown Indication (เลือกอย่างน้อยหนึ่งข้อ) ☐ Systemic bleeding ตำแหน่ง..... ☐ INR > 1.2 ☐ Platelet < 50,000 ☐ 20min WBCT unclot ☐ Compartment syndrome ☐ Neurotoxin ☐ Cobra (เห่า) ☐ King cobra (จงอาง) ☐ Malayan krait (ทับสมิงคลา) ☐ Banded krait (สามเหลี่ยม) ☐ Unknown Indication (เลือกอย่างน้อยหนึ่งข้อ) ☐ Weakness ☐ Respiratory failure ☐ Ptosis/Dysphagia/Dysphonia ☐ Malayan krait/Banded krait ประวัติวัคซีนบาดทะยัก ☐ ครบ 3 เข็มภายใน 5 ปี ☐ ครบ 3 เข็ม มากกว่า 5 ปี ☐ ไม่ทราบ/ไม่ครบ 3 เข็ม ประวัติแพ้ยาหรือวัคซีนจากม้า ☐ ไม่แพ้ ☐ แพ้.....		Lab: ☐ CBC, Coagulogram, ☐ BUN, Cr ☐ 20min WBCT ☐ Observe neuro signs q 1 hr if GCS drop >1, RR< 12, ptosis, dysphagia, dyspnea, dysphonia or weakness please notify ☐ Observe signs compartment syndrome (6Ps) please notify Antivenom ☐ Green pit viper 3 vials in NSS 100 ml IV drip in 30 min ☐ MVP หรือ RV 5 vials in NSS 100ml IV drip in 30 min ☐ Hematotoxin 5 vials in NSS 100 ml IV drip in 30 min ☐ Cobra หรือ King Cobra 10 vials in NSS 100ml IV drip in 60 min ☐ Malayan Krait 5 vials in NSS 100 ml IV drip in 30 min ☐ Neurotoxin 10 vials in NSS 100 ml IV drip in 60 min - Observe signs anaphylaxis ขณะและหลังให้ Antivenom - เตรียม Adrenaline (1:1000) 0.5mg ไว้ข้างเตียง ลงชื่อแพทย์.....		☐ NPO ☐ Diet..... ☐ Record V/S ☐ ยกบริเวณที่โดนกัดสูง 30 องศา ☐ Bleeding precaution Medications ☐ Augmentin 1.2gm IV q 8 hr ☐ Augmentin (1) 1x2 po pc ☐ Paracetamol (500) 1-2tab po prn q 4-6 hr กรณีแพ้ Penicillin ☐ Ciprofloxacin (500) 1x2 po pc และ ☐ Clindamycin (300) 1x3 po pc ลงชื่อแพทย์.....

หมายเหตุ: - การผสม Antivenom ห้ามเขย่า สามารถปรับชนิดและปริมาณสารนี้ได้ตามความเหมาะสม และควร drip ให้หมดภายใน 60min
 - Hematotoxin ให้ Repeat lab หลังให้ยาครบ 6 ชั่วโมง q 6 ชั่วโมง จนครบ 24 ชั่วโมง (ถ้าไม่ให้อาการ Antivenom Serial lab จนครบ 72 ชั่วโมง)
 - Neurotoxin Repeat Antivenom ได้อีก 1 dose หากให้ยาครบ 2-3 ชั่วโมง อาการอ่อนแรง worsening/progress หรือ 12 ชั่วโมงแล้วอาการอ่อนแรงยังไม่ดีขึ้น (ถ้าเป็น Banded krait ให้ใช้ Antivenom Neurotoxin แทน)

Department of service..... Ward

Attending Physician..... Name of patient & Age
HN&AN



ดิจิตัลเกอร์บาร์โค้ด
 ชื่อ-สกุล HN AN ผู้ป่วย