

行列式の定義

Definition

n 次正方行列 $A = [a_{ij}]$ に対し

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}$$

とおき, A の行列式と呼ぶ.

A の行列式は $|A|$ と書き表す.

Example

$S_2 = \{\epsilon, (1 \ 2)\}$ であり, $\operatorname{sgn}(\epsilon) = 1$, $\operatorname{sgn}(1 \ 2) = -1$ であるから,

$$\begin{aligned} \det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} &= \operatorname{sgn}(\epsilon) a_{11} a_{22} + \operatorname{sgn}((1 \ 2)) a_{12} a_{21} \\ &= a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}. \end{aligned}$$

行列式の定義

Example

$S_3 = \{\epsilon, (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$ であり,
 $\epsilon, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)$ は偶置換,
 $(1\ 2), (1\ 3), (2\ 3)$ は奇置換であるから

$$\det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32}.$$

行列の性質

Theorem (定理3.2.1)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Example

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 3(2 \cdot 4 - 1 \cdot 3) = 15.$$

Example

$$|E_n| = 1$$

行列式の行に関する多重線形性

Theorem (定理3.2.2)

① c をスカラーとする.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ ca_{i1} & \cdots & ca_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & & a_{nn} \end{vmatrix} = c \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & & a_{nn} \end{vmatrix}$$

②

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{i1} + c_{i1} & \cdots & b_{in} + c_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{i1} & \cdots & b_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{i1} & \cdots & c_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Example

定理3.2.2より,

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ a+3 & b+6 & c+9 \\ 7 & 2 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ a & b & c \\ 7 & 2 & 4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & 6 & 9 \\ 7 & 2 & 4 \end{vmatrix} \\ = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ a & b & c \\ 7 & 2 & 4 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ 7 & 2 & 4 \end{vmatrix}.$$

行列式の性質

Theorem (定理3.2.3)

- ① (交代性) 二つの行を入れ替えると, 行列式は -1 倍になる.
- ② 二つの行が等しいならば, 行列式は 0 である.

Example

- ① 定理3.2.3(2)より,

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 6 & 2 \\ 1 & 6 & 7 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 6 & 7 \end{vmatrix} = 0.$$

- ② 定理3.2.3(1)より,

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -6.$$

行列式の性質

Theorem (定理3.2.4)

行列の一つの行に他の行の何倍かを加えても、
行列式の値は変わらない。

Example

定理3.2.4より、

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -2 & -5 & 7 \\ -3 & 2 & -1 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 15 \\ 0 & 11 & 11 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 15 \\ 11 & 11 \end{vmatrix} = 11 \begin{vmatrix} 1 & 15 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 11 \begin{vmatrix} 1 & 15 \\ 0 & -14 \end{vmatrix} \\ &= 11 \cdot (-14) = -154. \end{aligned}$$

Theorem (定理3.3.1)

$$\det({}^tA) = \det(A).$$

Theorem (定理3.3.2)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

行列の性質

Theorem (定理3.3.3)

- ① 一つの列を c 倍すると、行列式は c 倍になる。
- ② 一つの列が二つの列ベクトルの和である行列の行列式は、他の列は同じで、その列に上の列ベクトルを別々にとった行列の行列式の和となる。
- ③ 二つの列を入れ替えると行列式は -1 倍になる。
- ④ 二つの列が等しい行列の行列式は 0 である。
- ⑤ 一つの列に他の列の何倍かを加えても行列式は変わらない。

(1)と(2)を列に関する多重線形性, (3)を交代性という。

注意 $n \times n$ 行列上で定義されたスカラー関数 F で、
列に関する多重線形性かつ交代性を持ち、
 $F(E_n) = 1$ を満たすものはただ一つ存在する。

Theorem (定理3.3.4)

Aが $r \times r$ 行列, Dが $s \times s$ 行列, Bが $r \times s$ 行列, Cが $s \times r$ 行列ならば,

$$\det \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & D \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} A & 0 \\ C & D \end{bmatrix} = \det(A) \det(D)$$

Theorem (定理3.3.5)

$n \times n$ 行列A, Bに対して

$$\det(AB) = \det(A) \det(B).$$