

# 余因子展開

## Definition

$n$ 次正方行列 $A = [a_{ij}]$ に対し、第 $i$ 行と第 $j$ 列を取り除いて得られる $(n-1)$ 次の正方行列を $A_{ij}$ と書く。

## Example

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 4 & -3 & 0 \\ 2 & 6 & 5 \end{bmatrix} \text{ に対して, } A_{12} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \quad A_{22} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}.$$

## Theorem (余因子展開)

$n$ 次正方行列 $A = [a_{ij}]$ と任意の $1 \leq i, j \leq n$ に対して、

$$\begin{aligned} |A| &= (-1)^{j+1} a_{1j} |A_{1j}| + \cdots + (-1)^{j+n} a_{nj} |A_{nj}| \\ &= (-1)^{i+1} a_{i1} |A_{i1}| + \cdots + (-1)^{i+n} a_{in} |A_{in}| \end{aligned}$$

# 余因子展開

$$|A| = (-1)^{j+1}a_{1j}|A_{1j}| + \cdots + (-1)^{j+n}a_{nj}|A_{nj}|$$

を第  $j$  列に関する余因子展開という.

$$|A| = (-1)^{i+1}a_{i1}|A_{i1}| + \cdots + (-1)^{i+n}a_{in}|A_{in}|$$

を第  $i$  行に関する余因子展開という.

## Example

第2列に関する余因子展開.

$$\begin{vmatrix} 2 & 7 & 4 \\ 3 & 2 & 0 \\ 1 & 5 & 3 \end{vmatrix} = -7 \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} - 5 \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

第2行に関する余因子展開.

$$\begin{vmatrix} 4 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \\ 7 & 8 & 3 \end{vmatrix} = -0 \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 8 & 3 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 7 & 3 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

# 余因子展開

## Definition

$n$ 次正方行列 $A = [a_{ij}]$ に対し,

$$a_{ij}^* = (-1)^{i+j} |A_{ji}|$$

とおく. さらに,

$$\tilde{A} = [a_{ij}^*]$$

とおき,  $A$ の余因子行列(adjugate matrix)という.

## Theorem ((定理3.4.1, 3.4.2) )

行列 $A = [a_{ij}]$ の余因子行列を $\tilde{A}$ とすると

$$A\tilde{A} = \tilde{A}A = \det(A)E.$$

さらに,  $\det(A) \neq 0$ ならば,  $A$ は正則で $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}\tilde{A}$ である.

## Theorem

Aをn次の正則行列とする. 連立一次方程式

$$Ax = b$$

の解は次のように与えられる.

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad x_i = \frac{\det \begin{bmatrix} a_1 & \dots & i & b & \dots & a_n \end{bmatrix}}{\det(A)}.$$

ここで,  $\begin{bmatrix} a_1 & \dots & i & b & \dots & a_n \end{bmatrix}$  はAの第i列をbで置き換えた行列である.

注意: Aが正則ならば, 定理3.3.5より,  $\det(A) \neq 0$ .

# 特別な形の行列式

## Theorem (ヴァンデルモンド行列式)

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

## Theorem

$$\begin{vmatrix} a_0 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & x & -1 & \ddots & \vdots \\ a_2 & 0 & x & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_n & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix} = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n.$$

# 特別な形の行列式

## Theorem

$$\begin{vmatrix} 1 & a & b & c+d \\ 1 & b & c & d+a \\ 1 & c & d & a+b \\ 1 & d & a & b+c \end{vmatrix} = 0.$$