
Exact $L = 2$
Exact $L = 4$
Unconditional reduced
MC, 95% CI
Gaussian
Half-normal
ReLU
Lognormal
Pareto(4)
Exponential
$\mathcal{I}_n$
n
32
128
512
4096
1.05
1.00
0.95
15
10
5
6
4
2
10^2
10^1
10^3
10^2
10^1
40
20
0


Shared RNE
Split into 16
Independent scales
Shared SR
Variance / $\sum_i w_i^2$
10^0
10^{-1}
0 0.00276
1
$\chi = (\sum_i w_i)^2/(n\sum_i w_i^2)$
MSE / $\sum_i w_i^2$
10^1
10^0
10^{-1}
0 0.00276
1
$\chi = (\sum_i w_i)^2/(n\sum_i w_i^2)$


10^{103}
10^{86}
10^{69}
10^{52}
10^{35}
10^{18}
10^{1}
$\mathcal{I}_n$
Exact finite-n
Theorem normalization
8
16
32
64
128
256
2^j, $n = \lfloor e^{2^j} \rfloor$
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
10^{-10}
10^{-12}
$\mathcal{I}_n/n$
8
16
32
64
128
256
2^j, $n = \lfloor e^{2^j} \rfloor$