

第2节-2

齐次方程与全微分方程

一、齐次方程

*二、可化为齐次方程的方程

三、全微分方程



一、齐次方程

形如 $\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ 的方程叫做**齐次方程**.

解法: 令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y = ux$, $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$,

代入原方程得 $u + x \frac{du}{dx} = \varphi(u)$

分离变量: $\frac{du}{\varphi(u) - u} = \frac{dx}{x}$

两边积分, 得 $\int \frac{du}{\varphi(u) - u} = \int \frac{dx}{x}$

积分后再用 $\frac{y}{x}$ 代替 u , 便得原方程的通解.



例1. 解微分方程 $y' = \frac{y}{x} + \tan \frac{y}{x}$.

解: 令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y' = u + xu'$, 代入原方程得

$$u + xu' = u + \tan u$$

分离变量 $\frac{\cos u}{\sin u} du = \frac{dx}{x}$

两边积分 $\int \frac{\cos u}{\sin u} du = \int \frac{dx}{x}$

此处 $C \neq 0$

得 $\ln |\sin u| = \ln |x| + \ln |C|$, 即 $\sin u = Cx$

故原方程的通解为 $\sin \frac{y}{x} = Cx$ (C 为任意常数)

(当 $C = 0$ 时, $y = 0$ 也是方程的解)



例2. 解微分方程 $(y^2 - 2xy)dx + x^2 dy = 0$.

解: 方程变形为 $\frac{dy}{dx} = 2\frac{y}{x} - \left(\frac{y}{x}\right)^2$, 令 $u = \frac{y}{x}$,

则有 $u + xu' = 2u - u^2$

分离变量 $\frac{du}{u^2 - u} = -\frac{dx}{x}$ 即 $\left(\frac{1}{u-1} - \frac{1}{u}\right)du = -\frac{dx}{x}$

积分得 $\ln\left|\frac{u-1}{u}\right| = -\ln|x| + \ln|C|$, 即 $\frac{x(u-1)}{u} = C$

代回原变量得通解 $x(y-x) = Cy$ (C 为任意常数)

说明: 显然 $x=0$, $y=0$, $y=x$ 也是原方程的解, 但在求解过程中丢失了.



*二、可化为齐次方程的方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{ax + by + c}{a_1x + b_1y + c_1} \quad (c^2 + c_1^2 \neq 0)$$

1. 当 $\frac{a_1}{a} \neq \frac{b_1}{b}$ 时, 作变换 $x = X + h, y = Y + k$ (h, k 为待定常数), 则 $dx = dX, dy = dY$, 原方程化为

$$\frac{dY}{dX} = \frac{aX + bY + ah + bk + c}{a_1X + b_1Y + a_1h + b_1k + c_1}$$

$$\downarrow \text{令} \begin{cases} ah + bk + c = 0 \\ a_1h + b_1k + c_1 = 0 \end{cases}, \text{解出 } h, k$$

$$\frac{dY}{dX} = \frac{aX + bY}{a_1X + b_1Y} \quad (\text{齐次方程})$$



求出其解后, 将 $X = x - h, Y = y - k$ 代入, 即得原方程的解.

2. 当 $\frac{a_1}{a} = \frac{b_1}{b} = \lambda$ 时, 原方程可化为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{ax + by + c}{\lambda(ax + by) + c_1}$$

$$\downarrow \text{令 } v = ax + by, \text{ 则 } \frac{dv}{dx} = a + b \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{dv}{dx} = a + b \frac{v + c}{\lambda v + c_1} \quad (\text{可分离变量方程})$$

注: 上述方法可适用于下述更一般的方程

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax + by + c}{a_1x + b_1y + c_1}\right) \quad (c^2 + c_1^2 \neq 0)$$



例4. 求解
$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = \frac{x+y+4}{x-y-6} \\ y|_{x=2} = -5 \end{cases}$$

解: 令
$$\begin{cases} h+k+4=0 \\ h-k-6=0 \end{cases} \quad \text{得 } h=1, k=-5$$

令 $x = X + 1, y = Y - 5$, 得
$$\frac{dY}{dX} = \frac{X+Y}{X-Y}$$

再令 $Y = Xu$, 得

$$\frac{1-u}{1+u^2} du = \frac{dX}{X}$$

积分得
$$\arctan u - \frac{1}{2} \ln(1+u^2) = \ln|CX|$$

代回原变量, 得原方程的通解:



$$\arctan \frac{y+5}{x-1} - \frac{1}{2} \ln \left[1 + \left(\frac{y+5}{x-1} \right)^2 \right] = \ln |C(x-1)|$$

利用 $y|_{x=2} = -5$ 得 $C = 1$ ，故所求特解为

$$\arctan \frac{y+5}{x-1} = \frac{1}{2} \ln \left[(x-1)^2 + (y+5)^2 \right]$$

思考：若方程改为 $\frac{dy}{dx} = \frac{x+y+4}{x+y-6}$ ，如何求解？

提示：令 $v = x + y$.



三、全微分方程

若存在 $u(x, y)$ 使 $du(x, y) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$
则称 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ ③

为全微分方程.

判别: P, Q 在某单连通域 D 内有连续一阶偏导数, 则

$$\text{③为全微分方程} \iff \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, (x, y) \in D$$

求解步骤:

1. 求原函数 $u(x, y)$

方法1 凑微分法;

方法2 利用积分与路径无关的条件.

2. 由 $du = 0$ 知通解为 $u(x, y) = C$.



例1. 求解 $(x + \frac{y}{x^2})dx - \frac{1}{x}dy = 0$

解: $\because \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{1}{x^2} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, \therefore 这是一个全微分方程.

用凑微分法求通解. 将方程改写为

$$x dx - \frac{x dy - y dx}{x^2} = 0$$

即 $d(\frac{1}{2}x^2) - d(\frac{y}{x}) = 0$, 或 $d(\frac{1}{2}x^2 - \frac{y}{x}) = 0$

故原方程的通解为 $\frac{1}{2}x^2 - \frac{y}{x} = C$



思考: 如何解方程 $(x^3 + y)dx - xdy = 0$?

这不是一个全微分方程, 但若在方程两边同乘 $\frac{1}{x^2}$,
就化成例1 的方程.

注: 若存在连续可微函数 $\mu = \mu(x, y) \neq 0$, 使

$$\mu(x, y)P(x, y)dx + \mu(x, y)Q(x, y)dy = 0$$

为全微分方程, 则称 $\mu(x, y)$ 为原方程的**积分因子**.

在简单情况下, 可凭观察和经验根据微分倒推式得到积分因子.



例2. 求解

$$(5x^4 + 3xy^2 - y^3)dx + (3x^2y - 3xy^2 + y^2)dy = 0$$


解: 因为 $\frac{\partial P}{\partial y} = 6xy - 3y^2 = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 故这是全微分方程.

法1 取 $x_0 = 0, y_0 = 0$, 则有

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_0^x 5x^4 dx + \int_0^y (3x^2y - 3xy^2 + y^2) dy \\ &= x^5 + \frac{3}{2}x^2y^2 - xy^3 + \frac{1}{3}y^3 \end{aligned}$$

因此方程的通解为

$$x^5 + \frac{3}{2}x^2y^2 - xy^3 + \frac{1}{3}y^3 = C$$



法2 此全微分方程的通解为 $u(x, y) = C$, 则有

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 5x^4 + 3xy^2 - y^3 \quad \textcircled{4}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 3x^2y - 3xy^2 + y^2 \quad \textcircled{5}$$

由④得 $u(x, y) = \int (5x^4 + 3xy^2 - y^3) dx + \varphi(y)$

$$= x^5 + \frac{3}{2}x^2y^2 - xy^3 + \varphi(y), \quad \varphi(y) \text{ 待定}$$

两边对 y 求导得 $\frac{\partial u}{\partial y} = 3x^2y - 3xy^2 + \varphi'(y)$

与⑤比较得 $\varphi'(y) = y^2$, 取 $\varphi(y) = \frac{1}{3}y^3$

因此方程的通解为 $x^5 + \frac{3}{2}x^2y^2 - xy^3 + \frac{1}{3}y^3 = C$



练习 设 $\text{grad } u(x, y) = (x^4 + 4xy^3, 6x^2y^2 - 5y^4)$, 求 $u(x, y)$.

提示: $du(x, y) = (x^4 + 4xy^3)dx + (6x^2y^2 - 5y^4)dy$

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} (x^4 + 4xy^3)dx + (6x^2y^2 - 5y^4)dy + C \\ &= \int_0^x x^4 dx + \int_0^y (6x^2y^2 - 5y^4) dy + C \\ &= \frac{1}{5}x^5 + 2x^2y^3 - y^5 + C \end{aligned}$$

