

# Памятка по приему метотрексата

---


Савельева Ю.О.  
Врач ревматолог  
Клиника «Добрый  
доктор»



**Метотрексат** принимается  
**1 раз в неделю** в  
фиксированный день.

---

**Через сутки или позже**  
обязательно прием  
**фолиевой кислоты**  
(главное не принимать  
фолиевую кислоту в сутки  
приема метотрексата)



| понедельник                                      | вторник                                  | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|-------------|
| Метотрексат<br>В таблетках<br>В 09.00<br>В 21.00 |                                          |       |         |         |         |             |
|                                                  | В 21.00 –<br>фолиевая<br>кислота<br>5 мг |       |         |         |         |             |

| понедельник | вторник | среда                              | четверг                                | пятница | суббота | воскресенье |
|-------------|---------|------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------|-------------|
|             |         | Метотрексат<br>Подкожно<br>в 10.00 |                                        |         |         |             |
|             |         |                                    | В 10.00<br>Фолиевая<br>кислота<br>5 мг |         |         |             |

ИЛИ если  
Вы  
делаете  
укол:

- 
- **Регулярно сдавать анализы:**
    - – Общий анализ крови +СОЭ
    - – Общий анализ мочи
    - – Анализ крови на АСТ, АЛТ, билирубин, креатинин, мочевины, общий белок, СРБ
  - **КАК ЧАСТО?** Первые 6 месяцев 1 раз в месяц, при повышении дозировки через 2 недели
  - **ЕСЛИ** дозировка подобрана и **ВЫ** себя хорошо чувствуете, то 1 раз в 2–3 месяца, перед приемом ревматолога



## ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ

- У вас признаки ОРВИ, гриппа, НКИ с высокой температурой или бактериальной инфекцией (например: гнойный гайморит, ангина, пневмония)
- **ВРЕМЕННО ОТМЕНИТЕ ПРИЕМ МЕТОТРЕКСАТА**, до момента выздоровления.
- После выздоровления можно самостоятельно вернуть метотрексат в той же дозировке!!!

## АНАЛИЗЫ

- ЕСЛИ в анализе крови есть снижение уровня **лейкоцитов** меньше 3,0 на  $10^9$ , **тромбоцитов** меньше 100 ИЛИ повышение печеночных **трасаминаз** (АСТ, АЛТ) выше чем 3 нормы (ЭТО ПРИМЕРНО 120 и выше) ВРЕМЕННО ОТМЕНИТЕ МЕТОТРЕКСАТ и обратитесь на консультацию к ревматологу

## КАК БОРОТЬСЯ С ТОШНОТОЙ?

- –Использовать мятные леденцы
- – Избегать резких запахов
- –Медленно пить и есть
- – НЕ принимать горизонтальное положение в течение 2х часов после еды
- – ПИТЬ больше воды (вода с лимоном, морсы)
- – ОБРАТИТЬСЯ к врачу для назначения противотошнотных препаратов