

Вакцинация

Основные положения

Вакцинация при ревматологических заболеваниях в стадии низкой активности не противопоказана*

Существуют живые ослабленные вакцины и инактивированные вакцины.

Инактивированные вакцины: Дифтерия, гепатит В, гепатит А, гемофильная инфекция типа b, папилломавирус, грипп, пневмококк, стрептококк, столбняк, клещевой энцефалит, брюшной тиф (парентеральная), полиомиелит (парентеральная)

Живые вакцины: Корь, ротавирус, паротит, брюшной тиф (оральная), полиомиелит (оральная), желтая лихорадка, герпес зостер

Живые вакцины противопоказано вводить на фоне иммуносупрессивной терапии (ИСТ), если же вы готовитесь к началу ИСТ, то живые вакцины вводят не ранее чем за 4 недели до планируемой ИСТ.

Для вас я подготовила краткую выдержку из руководства группы ACR по вакцинации **наиболее значимых инфекций** у пациентов с ревматическими заболеваниями (РЗ) на сегодняшний день. Эксперты подчеркивают, что соблюдение данных рекомендаций является добровольным, а окончательное решение относительно их применения должно приниматься лечащим врачом в свете индивидуальных особенностей каждого пациента.

Грипп

Вакцинация производится 1 раз в год

для пациентов с РЗ в возрасте от 18 до 65 лет и старше, получающих иммуносупрессивные препараты, условно рекомендуется проводить иммунизацию высокодозной или адъювантной вакциной против гриппа вместо обычной противогриппозной вакцинации

Пневмококковая вакцинация:

Вакцинация вакциной «**Пневмо-23**» производится каждые 5 лет

Вакциной «**Превенар 13**»- однократно в течение жизни

для пациентов с ИВРЗ в возрасте старше 65 лет, получающих ИСТ **настоятельно** рекомендуется пневмококковая вакцинация

Герпесвирус человека 3-го типа (VZV, varicella zoster virus): –

«**Шингрикс**» после первого введения ревакцинация через 2-6 месяцев

для пациентов с ИВРЗ старше 18 лет, получающих иммуносупрессивные препараты, **настоятельно рекомендуется** введение рекомбинантной вакцины против VZV.

Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ):

для пациентов с ИВРЗ в возрасте 26–45 лет, получающих иммуносупрессивные препараты и не вакцинированных ранее, **условно рекомендуется** вакцинация против ВПЧ.

****«Гардасил» и «Церварикс»** ревакцинация через 2 месяца и 6 месяцев от первого введения.

*Перед вакцинацией проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом-ревматологом

**О необходимости вакцинации данными вакцинами проконсультируйтесь с врачом-гинекологом