

Полезные материалы

Шкалы и таблицы

Опросник нейропатической боли DN4

ОПРОС ПАЦИЕНТА	Баллы	
1. Соответствует ли боль, которую испытывает пациент, одному или нескольким из следующих определений?	Да	Нет
• Ощущение жжения	1	0
• Болезненное ощущение холода	1	0
• Ощущение как от ударов током	1	0
2. Сопровождается ли боль одним или несколькими из следующих симптомов в области ее локализации?	Да	Нет
• Пощипывание, ощущение ползания мурашек	1	0
• Покалывание	1	0
• Онемение	1	0
• Зуд	1	0
ОСМОТР ПАЦИЕНТА	Баллы	
3. Локализована ли боль в той же области, где осмотр выявляет один или оба следующих симптомов:	Да	Нет
• Пониженная чувствительность к прикосновению	1	0
• Пониженная чувствительность к покалыванию	1	0
4. Можно ли вызвать или усилить боль в области ее локализации?	Да	Нет
• Проведя в этой области кисточкой	1	0

Интерпретация результатов опросника
нейропатической боли DN4

Количество баллов	Интерпретация
≥ 4	Боль нейропатического характера или присутствие нейропатического компонента боли
< 4	Нейропатический компонент боли маловероятен

Экспресс-скрининг фибромиалгии (FiRST)	
	Да/Нет
У меня болит все тело	
Боль сопровождается постоянной и изматывающей общей усталостью.	
Боль ощущается как при ожогах, ударе электрическим током или судорогах.	
Боль сопровождается другими необычными ощущениями во всем теле, такими как покалывание или онемение.	
Боль сопровождается другими проблемами со здоровьем, такими как проблемы с пищеварением, мочеиспусканием, головными болями или беспокойством в ногах.	
Боль оказывает значительное влияние на мою жизнь, особенно на мой сон и способность концентрироваться, из-за чего я в целом чувствую себя заторможенным.	
По одному баллу за каждый ответ "Да". Оценка 5 и более баллов указывает на фибромиалгию.	

Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии (HADS)

Каждому утверждению соответствуют 4 варианта ответа. Выберите тот из ответов, который соответствует Вашему состоянию, а затем просуммируйте баллы в каждой части.

Часть I (оценка уровня ТРЕВОГИ)	Часть II (оценка уровня ДЕПРЕССИИ)
1. Я испытываю напряжение, мне не по себе 3 - все время 2 - часто 1 - время от времени, иногда 0 - совсем не испытываю 2. Я испытываю страх, кажется, что что-то ужасное может вот-вот случиться 3 - определенно это так, и страх очень велик 2 - да, это так, но страх не очень велик 1 - иногда, но это меня не беспокоит 0 - совсем не испытываю 3. Беспокойные мысли крутятся у меня в голове 3 - постоянно 2 - большую часть времени 1 - время от времени и не так часто 0 - только иногда 4. Я легко могу присесть и расслабиться 0 - определенно, это так 1 - наверно, это так 2 - лишь изредка, это так 3 - совсем не могу 5. Я испытываю внутреннее напряжение или дрожь 0 - совсем не испытываю 1 - иногда 2 - часто 3 - очень часто 6. Я испытываю неуверенность, мне постоянно нужно двигаться 3 - определенно, это так 2 - наверно, это так 1 - лишь в некоторой степени, это так 0 - совсем не испытываю 7. У меня бывает внезапное чувство паники 3 - очень часто 2 - довольно часто 1 - не так уж часто 0 - совсем не бывает	1. То, что приносило мне большое удовольствие, и сейчас вызывает у меня такое же чувство 0 - определенно, это так 1 - наверно, это так 2 - лишь в очень малой степени, это так 3 - это совсем не так 2. Я способен рассмеяться и увидеть в том или ином событии смешное 0 - определенно, это так 1 - наверно, это так 2 - лишь в очень малой степени, это так 3 - совсем не способен 3. Я испытываю бодрость 3 - совсем не испытываю 2 - очень редко 1 - иногда 0 - практически все время 4. Мне кажется, что я стал все делать очень медленно 3 - практически все время 2 - часто 1 - иногда 0 - совсем нет 5. Я не слежу за своей внешностью 3 - определенно, это так 2 - я не уделяю этому столько времени, сколько нужно 1 - может быть, я стал меньше уделять этому времени 0 - я слежу за собой так же, как и раньше 6. Я считаю, что мои дела (занятия, увлечения) могут принести мне чувство удовлетворения 0 - точно так же, как и обычно 1 - да, но не в той степени, как раньше 2 - значительно меньше, чем обычно 3 - совсем так не считаю 7. Я могу получить удовольствие от хорошей книги, радио- или телепрограммы 0 - часто 1 - иногда 2 - редко 3 - очень редко
Количество баллов здесь _____	Количество баллов здесь _____
0-7 баллов → «норма» (отсутствие достоверно выраженных симптомов тревоги и депрессии) 8-10 баллов → «субклинически выраженная тревога / депрессия» 11 баллов и выше → «клинически выраженная тревога / депрессия»	

Например: по шкале тревоги (слева) получилось 11 баллов, по шкале депрессии (справа) – 3 балла

Можно сделать вывод, что имеет место клинически выраженная тревога, а уровень депрессии находится в пределах нормы

Или: по шкале тревоги получилось 15 баллов, по шкале депрессии – 9 баллов

Можно сделать вывод о том, что имеет место клинически выраженная тревога и субклинически выраженная депрессия

Или: по шкале тревоги получилось 6 баллов, по шкале депрессии – 1 балл

Можно сделать вывод о том, что уровни и тревоги, и депрессии находятся в пределах нормы

Шкала депрессии Бека (часть 1)

Оцениваемые параметры		Баллы
Настроение	Я не чувствую себя расстроенным, печальным	0
	Я чувствую печаль большую часть времени	1
	Я все время печален	2
	Я настолько расстроен и несчастлив, что не могу это выдержать	3
Пессимизм	Я не тревожусь о своем будущем	0
	Я тревожусь о будущем больше обычного	1
	Я чувствую, что меня ничего не ждет в будущем	2
	Мое будущее безнадежно и будет еще хуже	3



Шкала депрессии Бека (часть 2)

Оцениваемые параметры		Баллы
Чувство несостоятельности	Я не чувствую себя неудачником	0
	Я чувствую, что терпел больше неудач, чем другие люди	1
	Когда я оглядываюсь на свою жизнь, я вижу в ней много неудач	2
	Я чувствую, что как личность я – полный неудачник	3
Потеря удовольствия	Я получаю так же много удовольствия от того, чем я всегда наслаждался	0
	Я не получаю такого же удовольствия, как раньше	1
	Я получаю совсем немного удовольствия от тех вещей, которыми привык наслаждаться	2
	Я не получаю никакого удовольствия от того, чем обычно наслаждался	3



Шкала депрессии Бека (часть 3)

Оцениваемые параметры		Баллы
Чувство вины	Я не чувствую себя в чем-нибудь виноватым	0
	Я чувствую себя виноватым за многое, что я сделал или должен был бы сделать	1
	Большую часть времени я чувствую себя виноватым	2
	Я постоянно испытываю чувство вины	3
Ощущение наказанности	Я не чувствую, что могу быть наказанным за что-либо	0
	Я чувствую, что могу быть наказан	1
	Я ожидаю, что могу быть наказан	2
	Я чувствую себя уже наказанным	3



Шкала депрессии Бека (часть 4)

Оцениваемые параметры		Баллы
Отношение к самому себе	Мое отношение к себе не изменилось	0
	Я потерял уверенность в себе	1
	Я разочарован в себе	2
	Я не люблю себя	3
Самокритичность	Я критикую или обвиняю себя не больше, чем обычно	0
	Я более критичен к себе, чем раньше	1
	Я критикую себя за все свои ошибки	2
	Я виню себя во всем плохом, что происходит	3



Шкала депрессии Бека (часть 5)

Оцениваемые параметры		Баллы
Суицидальные мысли	Я никогда не думал покончить с собой	0
	Ко мне приходят мысли покончить с собой, но я не буду их осуществлять	1
	Я хотел бы покончить с собой	2
	Я бы убил себя, если бы представился случай	3
Слезливость	Я плачу не больше, чем обычно	0
	Сейчас я плачу чаще, чем раньше	1
	Я плачу по любому незначительному поводу	2
	Раньше я мог плакать, а сейчас не могу, даже если мне хочется	3



Шкала депрессии Бека (часть 6)

Оцениваемые параметры		Баллы
Возбуждение	Я не более беспокоен или взволнован, чем обычно	0
	Я чувствую себя более беспокойно или взволнованно, чем обычно	1
	Я так взволнован и обеспокоен, что мне трудно оставаться на месте	2
	Я так взволнован и взвинчен, что мне нужно двигаться или делать хоть что-нибудь	3
Потеря интереса	Я не утратил интереса к другим людям и делам	0
	Я меньше интересуюсь другими людьми и делами, чем раньше	1
	Я почти потерял интерес к другим людям и делам	2
	Мне тяжело заинтересоваться чем-либо	3



Шкала депрессии Бека (часть 7)

Оцениваемые параметры		Баллы
Нерешительность	Я принимаю решения так же, как всегда	0
	Принятие решений дается мне труднее, чем обычно	1
	Мне гораздо труднее, чем раньше, дается принятие решений	2
	У меня есть проблемы с принятием любых решений	3
Бесполезность	Я не чувствую себя бесполезным	0
	Я не чувствую себя таким же стоящим и полезным, как раньше	1
	Я чувствую себя менее полезным по сравнению с другими людьми	2
	Я чувствую себя совершенно никчемным	3



Шкала депрессии Бека (часть 8)

Оцениваемые параметры		Баллы
Обессиленность	Я энергичен так же, как всегда	0
	У меня меньше энергии, чем обычно	1
	Мне не хватает сил на очень многое	2
	У меня ни на что не хватает сил	3
Изменения в шаблоне сна	Я сплю так же, как и раньше	0
	Я сплю немного больше обычного	1
	Я сплю немного меньше обычного	1
	Я сплю намного больше, чем обычно	2
	Я сплю намного меньше, чем обычно	2
	Я сплю большую часть дня	3
	Я просыпаюсь через каждый час или два	3



Шкала депрессии Бека (часть 9)

Оцениваемые параметры		Баллы
Раздражительность	Я не более раздражителен, чем обычно	0
	Я более раздражителен, чем обычно	1
	Я гораздо более раздражителен, чем обычно	2
	Я всегда раздражен	3
Изменения в аппетите	Мой аппетит не изменился	0
	Я ем немного меньше обычного	1
	Я ем немного больше обычного	1
	Мой аппетит намного меньше, чем раньше	2
	Мой аппетит намного больше обычного	2
	У меня вообще нет аппетита	3
	Я все время хочу есть	3



Шкала депрессии Бека (часть 10)

Оцениваемые параметры		Баллы
Концентрация внимания	Я могу сосредоточиваться так же хорошо, как всегда	0
	Я не могу сконцентрироваться так же хорошо, как обычно	1
	Мне трудно сосредоточиться на чем-то надолго	2
	Я считаю, что не могу сконцентрироваться ни на чем	3
Усталость или утомление	Я не более уставший или утомленный, чем обычно	0
	Я устаю или утомляюсь легче, чем обычно	1
	Я слишком устал и утомлен, чтобы делать многое из привычных для себя вещей	2
	Я слишком устал и утомлен, чтобы делать большинство привычных дел	3



Шкала депрессии Бека (часть 11)

Оцениваемые параметры		Баллы
Потеря сексуального влечения	Я не заметил никаких изменений в своем интересе к сексу	0
	Секс интересует меня меньше, чем раньше	1
	Сейчас секс интересует меня гораздо меньше	2
	Я полностью утратил сексуальный интерес	3

Интерпретация

0-13 баллов – Отсутствие депрессивных симптомов

14-19 баллов – Легкая степень

20-28 баллов – Средняя степень

29-63 баллов – Тяжелая степень



Ссылки на сайты для обучения:

<https://painguide.com/> **PainGuide**

<https://www.fmaware.org/> **National Fibromyalgia Association**

Практики и упражнения:

Важно! Перед началом выполнения любого комплекса упражнений необходимо проконсультироваться с врачом и физическим терапевтом. Этот комплекс предназначен для общей информации и не заменяет индивидуальную программу реабилитации.

Принципы выполнения упражнений:

- **Мягкость:** Все движения должны быть плавными и не вызывать острой боли. Избегайте резких рывков и перенапряжения.
- **Постепенность:** Начинайте с небольшого количества повторений и постепенно увеличивайте их по мере улучшения состояния. Не форсируйте прогресс.
- **Осознанность:** Сосредоточьтесь на ощущениях в теле во время выполнения упражнений. Обращайте внимание на дыхание и расслабляйте мышцы, которые не участвуют в движении.
- **Регулярность:** Выполняйте упражнения регулярно, 3-5 раз в неделю. Даже короткие тренировки (10-15 минут) могут быть

полезны.

- **Отдых:** Обязательно делайте перерывы между упражнениями и давайте телу отдохнуть.

Комплекс упражнений (пример):

1. Дыхательные упражнения:

- **Диафрагмальное дыхание:** Лягте на спину, согните колени, положите одну руку на грудь, другую - на живот. Медленно вдыхайте через нос, наполняя воздухом живот (рука на животе поднимается), грудь остается неподвижной. Медленно выдыхайте через рот, втягивая живот. Повторите 5-10 раз. (цель: снижение напряжения и улучшение оксигенации тканей)
- **Чередование ноздрей:** (если нет противопоказаний - заложенности носа) Закройте правую ноздрю пальцем, вдохните через левую. Закройте левую ноздрю, выдохните через правую. Затем вдохните через правую, закройте ее, выдохните через левую. Повторите 5-10 раз. (цель: балансировка нервной системы)

2. Растяжка: (каждое упражнение удерживайте 15-30 секунд)

- **Растяжка шеи:** Наклоните голову вправо, почувствуйте растяжение мышц левой стороны шеи. Повторите в другую сторону. (цель: снятие напряжения в шейном отделе)
- **Растяжка плеч:** Заведите правую руку за спину, согните ее в локте.левой рукой потяните правый локоть к себе. Повторите для другой руки. (цель: улучшение подвижности плечевого пояса)
- **Растяжка грудных мышц:** Встаньте прямо, руки разведите в стороны, слегка отведите плечи назад. (цель: улучшение осанки)

и дыхания)

- **Растяжка спины:** Сядьте на пол, ноги вытяните вперед. Наклонитесь вперед, стараясь дотянуться руками до стоп. (цель: увеличение гибкости позвоночника)

- **Растяжка подколенных сухожилий:** Лягте на спину, поднимите одну ногу вверх, согните ее в колене. Обхватите руками бедро и аккуратно подтяните ногу к себе. (цель: улучшение гибкости ног)

3. Упражнения на укрепление мышц: (выполняйте 8-12 повторений каждого упражнения)

- **Изометрические упражнения для мышц шеи:** Положите руку на лоб и надавите на нее головой, создавая сопротивление. Удерживайте напряжение 5-10 секунд. Повторите для боковых и задних мышц шеи. (цель: укрепление мышц шеи без движения)

- **Подъем рук перед собой:** Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Медленно поднимите руки перед собой до уровня плеч. (цель: укрепление мышц плечевого пояса)

- **Подъем пяток:** Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Медленно поднимитесь на носки, задержитесь на секунду и опуститесь. (цель: укрепление мышц голени)

- **"Кошка-корова":** Встаньте на четвереньки, руки и колени на ширине плеч. На вдохе прогните спину вниз, поднимите голову вверх. На выдохе выгните спину дугой, опустите голову вниз. (цель: улучшение подвижности позвоночника и координации)

4. Аэробные упражнения: (выполняйте 20-30 минут, 3-5 раз в неделю)

- **Ходьба:** Начните с коротких прогулок и постепенно

увеличивайте их продолжительность и интенсивность.

- **Плавание:** Отличный вариант для снижения нагрузки на суставы.
- **Велосипед:** Используйте велотренажер или катайтесь на велосипеде по ровной местности.

5. Упражнения на расслабление:

• Прогрессивная мышечная релаксация по

Джекобсону: Поочередно напрягайте и расслабляйте различные группы мышц, сосредотачиваясь на ощущениях. (цель: снятие мышечного напряжения и снижение тревоги)

- **Медитация осознанности:** Сядьте удобно, закройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании. Отмечайте мысли и чувства, которые возникают, но не задерживайтесь на них. (цель: снижение стресса и улучшение осознанности)

Дополнительные рекомендации:

- Используйте теплую ванну или душ перед тренировкой, чтобы расслабить мышцы.
- Слушайте спокойную музыку во время выполнения упражнений.
- Не сравнивайте себя с другими. Каждый человек уникален, и прогресс может быть разным.
- Прислушивайтесь к своему телу и останавливайтесь, если чувствуете сильную боль или дискомфорт.
- Ведите дневник упражнений, чтобы отслеживать свой прогресс и мотивировать себя.

Важно: Помните, что цель этих упражнений - улучшение самочувствия и снижение симптомов фибромиалгии, а не

достижение спортивных рекордов. Будьте терпеливы к себе и наслаждайтесь процессом.

Еще несколько полезных ссылок:

<https://singularity-app.ru/blog/razvitie-osoznannosti/>

Упражнения на осознанность

<https://copingcard.com/ru/exposures/>

Техники КПТ: Экспозиции

Контакты:

Савельева Ю.О.- ревматолог



Очный прием в г Калининград, клиника «Добрый доктор»

Информационные-онлайн консультации (запись через сайт)

<https://taplink.cc/revmatologsavelieva>

Также ТГ-канал и ИГ

<https://t.me/revmaSavelieva>



Семёнова Н.Ф.-ревматолог

Очный прием в г Калининград МЦ «Апрель» Сельма

Информационные-онлайн консультации через сервис «Докма»

<https://dc24.docma.ru/semyonova>



Кожухова Ю.А.- психиатр, психотерапевт

Запись на консультацию в клинике «Denira» г. Москва

https://denira.clinic/kozhukhova_yulia?ysclid=maftpjmxwu319081912

а также онлайн: https://taplink.cc/dr_kozhukhova?ysclid=ma0gb4b15z817813369

