理想流体力学試験問題

2002-8-1,12:50~14:20 by E. Yamazato

1.(20) 複素ポテンシャルが次式で表される流れの型を説明し、かつそれらの流れの速度ポテンシャルおよび流れの関数を求めよ。

$$(1)w = -15ilnz + 13z, (2)w = 23z + 22lnz$$

- 2.(20) 二次元の渦流れにおいて、速度成分が u=3x+y, v=2x-3y なる流れの渦度を求めよ。 (2) その流れの流れ関数を求めよ。 (3) 直線 $x=\pm 2, y=\pm 2$ で区切られた正方形のまわりの循環値を求めよ。
- 3.(20)x=a と x=-a に強さ Q の吹き出しがあるとき、その複素ポテンシャルを求めよ。また (0,a) 点における速度成分 u,v を求めよ。
- 4.(20) 速度 U の一様流れ中に強さ Q の吹き出しが原点にある場合、この流れ場に作用する力を求めよ。
- 5.(25)4a の長さの平板に α なる傾きをもち、かつ循環をもつ流れがある。(1) 平行流れ (w-平面)から平板に至る写像関係を示し、かつ流れをスケッチせよ。(2) 平板の後端 に岐点がくるようにしたときの循環値を求めよ。

理想流体力学試験問題

8-1-2002,12:50~14:20 by E. Yamazato

1.(20) 複素ポテンシャルが次式で表される流れの型を説明し、かつそれらの流れの速度ポテンシャルおよび流れの関数を求めよ。

$$(1)w = -15ilnz + 13z, (2)w = 23z + 22lnz$$

(解)

(1) Parallel flow (U=3)+Circulation flow($\Gamma = 30\pi$) $w = -15iln(re^{i\theta}) + 13re^{i\theta} = -15ilnr + 15\theta + 13r(\cos\theta + i\sin\theta)$ $\varphi = 15\theta + 13r\cos\theta, \psi = 13r\sin\theta - 15lnr$

(2) Parallel flow(U=23)Source flow($Q=44\pi$) $w = 23re^{i\theta} + 22lnre^{i\theta}$ $\varphi = 23rcos\theta + 22lnr, \psi = 23rsin\theta + 22\theta$

2.(20) 二次元の渦流れにおいて、速度成分が u=3x+y, v=2x-3y なる流れの渦度を求めよ。 (2) その流れの流れ関数を求めよ。 (3) 直線 $x=\pm 2, y=\pm 2$ で区切られた正方形のまわりの循環値を求めよ。

(解)

$$(1) \qquad \zeta = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = 2 - 1 = 1$$

$$(2) \qquad u = 3x + y, v = 2x - 3y$$

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial y} = 3xy + y; \psi = 3xy + 1/2y^{2}$$

$$v = -\frac{\partial \psi}{\partial x} = 2x - 3y; \psi = x^{2} + 3xy$$

$$\psi = 3xy + 1/2y^{2} - x^{2}$$

$$(3) \qquad \Gamma = \int_{-2}^{2} \int_{-2}^{2} (\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} dx dy = 4 \times 4 = 16$$

3.(20)x=a と x=-a に強さ Q の吹き出しがあるとき、その複素ポテンシャルを求めよ。また (0,a) 点における速度成分 u,v を求めよ。 (解)

$$w = \frac{Q}{2\pi} \ln(z - a) + \frac{Q}{2\pi} \ln(z + a) = \frac{Q}{2\pi} \ln(z^2 - a^2)$$

$$\frac{dw}{dz} = \frac{Q}{2\pi} \frac{2z}{z^2 - a^2} = u - iv$$

$$At(0, a), z = ia, u - iv = \frac{Q}{2\pi} \frac{2ia}{-a^2 - a^2} = -\frac{Qi}{2\pi a}$$

$$\therefore u = 0, v = \frac{Q}{2\pi a}$$

4.(20) 速度 U の一様流れ中に強さ Q の吹き出しが原点にある場合、この流れ場に作用する力を求めよ。

(解)

$$\begin{split} w &= Uz + mlnz, m = \frac{Q}{2\pi} \\ \frac{dw}{dz} &= U + \frac{m}{z} \\ (\frac{dw}{dz})^2 &= U^2 + \frac{m^2}{z^2} + \frac{2Um}{z} \\ F_x - F_y &= \frac{i\rho}{2} \oint (\frac{dw}{dz})^2 dz = \frac{i\rho}{2} 2Um(2\pi i) = -\rho UQ \\ F_x &= -\rho UQ, F_y = 0 \end{split}$$

5.(25)4a の長さの平板に α なる傾きをもち、かつ循環をもつ流れがある。(1) 平行流れ (w-平面)から平板に至る写像関係を示し、かつ流れをスケッチせよ。(2) 平板の後端 に岐点がくるようにしたときの循環値を求めよ。(解)

$$\begin{split} w &= U(z_1 + \frac{a^2}{z_1}) - \frac{i\Gamma}{2\pi} ln z_1, z_2 = z_1 e^{i\alpha}, z = z_2 + \frac{a^2}{z_2} \\ \frac{dw}{dz_1} \frac{dz_1}{dz_2} \frac{dz_2}{dz} &= 0 \\ \frac{dw}{dz_1} &= U(1 - \frac{a^2}{z_1^2} - \frac{i\Gamma}{2\pi z_1} = 0 \\ \text{At point A, } z &= 2a, z_2 = a, z_1 = z_2 e^i \alpha \\ \frac{dw}{dz_1})_A &= U(1 - \frac{a^2}{a^2 e^{-2i\alpha}}) - \frac{i\Gamma}{2\pi a e^{-i\alpha}} = 0 \\ U(1 - e^{2i\alpha}) - \frac{i\Gamma}{2\pi a} e^{i\alpha} &= 0 \end{split}$$

$$U(e^{-i\alpha}) - e^{i\alpha} - \frac{i\Gamma}{2\pi a} = 0$$

$$U(\cos\alpha - i\sin\alpha - \cos\alpha - i\sin\alpha) - \frac{i\Gamma}{2\pi a} = 0$$

$$\Gamma = -4\pi a U \sin\alpha (\Gamma : negative)$$