COLINÉRGICOS

Fármaco	Mecanismo	Efecto	Memotecnia
Acetilcolina	Agonista endógeno de receptores muscarínicos y nicotínicos	Efectos parasimpáticos y contracción del músculo esquelético	Pilocarpina: **pupila chiquita** y **pileta de saliva**. Betanecol: la **vejiga** se vacía La **ACh** es la original: prende M y N
Betanecol	Agonista colinérgico (éster de colina) de los receptores muscarínicos	Trata la retención urinaria	
Pilocarpina	Agonista selectivo de receptores muscarínicos	Miosis, espasmo de acomodación y aumento de saliva	
Toxina botulínica	Inhibe la liberación de acetilcolina	Disminuye la contracción: parálisis flácida	**Botox** relaja: **no sale la orden**
Fisostigmina **Neostigmina** (miastenia gravis)	Inhibidor reversible de la acetilcolinesterasa (sustrato)	↑ ACh en la sinapsis	**Fisi** y **Neo** engañan a la enzima con **comida falsa**
Edrofonio (diagnóstico de miastenia gravis) **Tetraetilamonio**	Inhibidor reversible (no sustrato) de la acetilcolinesterasa	↑ ACh	**Edro** y **Tetra ni entran** a la enzima
Paratión **Malatión** **Ecotiofato**	Organofosforado: inhibidor irreversible de la acetilcolinesterasa	Crisis colinérgica	**Para mal**, **eco**: lo malo deja eco para siempre
Atropina	Antagonista competitivo no selectivo de los receptores muscarínicos	Aumenta la frecuencia cardíaca	**Atropina acelera**
Hioscina **Buscapina** (butilbromuro de hioscina) **Oxibutinina** **Propinoxato**		Antiespasmódico	**Hoy escapé buscando oxígeno propio** **Ciclo** de ciclopleJía
Ciclopentolato		Midriasis pasiva y cicloplejía	
Ipratropio (vida media corta: crisis agudas) **Tiotropio** (vida media larga: tratamiento crónico)		Broncodilatación	Mi **tío Ipra respira** hondo
Succinilcolina (despolarizante) **Atracurio** **Tubocurarina** **Pancuronio**	Bloquea de forma reversible el receptor nicotínico de la placa	Parálisis del músculo esquelético	**Su atraco entubó** al **paciente**

ADRENÉRGICOS

Fármaco	Mecanismo	Efecto	Memotecnia
Adrenalina	Agonista de receptores α1, α2, β1 y β2	Dosis bajas: vasodilatación por β2. Dosis altas: vasoconstricción por α	**Doña Adrenalina**
Noradrenalina	Agonista de receptores α1, α2 y β1	Vasoconstricción periférica	
Dopamina	Dosis bajas D1. Dosis medias β1. Dosis altas α1	Bajas: vasodilatación y diuresis. Medias: ↑ contractilidad y FC. Altas: vasoconstricción	
Fenilefrina	Agonista selectivo de receptores α1	Vasoconstricción	**Feni uno aprieta**, **Cloni dos apaga**
Clonidina	Agonista selectivo α2	Antihipertensivo central	
Isoproterenol	Agonista β no selectivo	Vasodilatación y broncodilatación	Salbutamol **salva** al asmático. Dobutamina **dobla** la fuerza del corazón **Iso**: igual para β1 y β2
Dobutamina	Agonista β1	Inotrópico positivo cardíaco	
Salbutamol	Agonista β2 adrenérgico	Broncodilatador	
Tiramina **Efedrina**	Amina simpaticomimética: desplaza noradrenalina de la vesícula	Aumenta los efectos simpáticos	**Tira** y **Efe empujan** a la noradrenalina afuera **MoHA** frena la salida
Morfina, histamina, angiotensina II	Inhiben la liberación de noradrenalina	Disminuyen los efectos simpáticos	
Prazosin	Antagonista reversible selectivo α1	Antihipertensivo por vasodilatación	**Pra**zosin para la **presión**. **Tam**sulosina para la **próstata** **Fento** va al Feo. **Ergo** aprieta la migraña
Tamsulosina		Favorece la micción: hiperplasia prostática benigna	
Fentolamina	Antagonista reversible no selectivo α	Vasodilatador: feocromocitoma	
Ergotamina	Antagonista α no selectivo. Actúa también sobre 5-HT	Vasoconstricción: antimigrañoso	
Propranolol	Antagonista no selectivo de los receptores β adrenérgicos	Antihipertensivo	El **profe timbró solo**, **sin elegir** a nadie
Timolol **Sotalol**		Baja la FC	
Atenolol	Antagonista selectivo β1	Disminuye la FC y la fuerza de contracción	**AMÉ A un solo corazón**
Metoprolol **Esmolol** **Acebutolol**		Disminuye la FC	
Carvedilol **Labetalol**	Antagonista de receptores β y α adrenérgicos	Antihipertensivo	**CARLA** tiene **los dos**

DOPAMINÉRGICOS

Fármaco	Mecanismo	Efecto	Memotecnia
Levodopa	Precursor de dopamina: atraviesa la BHE	Antiparkinsoniano	**Le Ama** a la dopamina: Levodopa y Amantadina
Amantadina	Aumenta la liberación de dopamina	Antiparkinsoniano de primera etapa	
Bromocriptina	Agonista selectivo de los receptores D2	Antiparkinsoniano	**Bromo con** la dopamina: la Bromocriptina la acompaña, no la bloquea **Pero Cabe más dopamina**: Pergolida y Cabergolina
Pergolida **Cabergolina**	Agonista dopaminérgico no selectivo	Disminuye prolactina	
Selegilina	Inhibidor irreversible selectivo de la MAO-B	Antiparkinsoniano	**Capona** captura a la **COMT** Selegilina **selecciona** a la **B** de Bueno para el Parkinson
Entacapona **Tolcapona**	Inhibidor reversible de la COMT	↑ concentración de dopamina	
Cocaína	Inhibe la recaptación de dopamina y noradrenalina (DAT)	Euforia, simpaticomimético	**Coca tapa**, **Anfeta empuja**
Anfetamina	Aumenta la liberación de dopamina y bloquea DAT	Cuadros psicóticos similares a la esquizofrenia	
Haloperidol (selectivo D2) **Clorpromazina**	Antagonista de los receptores D2	Antipsicótico	**Halo**peridol para las **alucinaciones**. **Domperidona** para no **devolver** **Cloro** limpia la psicosis
Domperidona		Antiemético y proquinético	

SEROTONINÉRGICOS

Fármaco	Mecanismo	Efecto	Memotecnia
Buspirona **Ipsapirona** **Gepirona**	Agonista parcial de los receptores 5-HT1A	Ansiolítico	**Bus**, **Ipsa**, **Ge**: tres que calman, todos en -pirona
Sumatriptán **Zolmitriptán** **Naratriptán**	Agonista de los receptores 5-HT1	Antimigrañoso	**Suma Nara Zol** para la migraña
Ketanserina	Antagonista de los receptores 5-HT2	Vasodilatación arterial e hipotensión	**Keta Cipro Cloza**, y la **Risperidona** se suma
Ciproheptadina		Antagonista serotoninérgico	
Clozapina		Antipsicótico atípico	
Risperidona	Antagonista D2 y 5-HT2		
Ondansetrón	Antagonista de los receptores 5-HT3	Antiemético	**Ondas** de náusea, **Meto** freno
Metoclopramida	Antagonista D2 y 5-HT3		
Cisaprida **Cleboprida** **Mosaprida** **Cinitaprida** (además bloquea D2)	Agonista de los receptores 5-HT4	Proquinético	Cuatro **empujan** con -prida: **Cisa**, **Clebo**, **Mosa** y **Cini**
Amitriptilina **Nortriptilina**	Inhibidor no selectivo de la recaptación de catecolaminas	Antidepresivo tricíclico	**Ami** y **Nor** son **tres anillos**
Fluoxetina **Paroxetina** **Sertralina** **Citalopram**	Inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina	Antidepresivo	**Flu**, **Para**, **Ser** y **Cita**: alegría serotonina
Moclobemida	Inhibidor reversible de la MAO-A	↑ noradrenalina y serotonina	**Mi Clor A**, mi **Sele B**
Clorgilina	Inhibidor irreversible de la MAO-A	Aumenta efectos simpáticos	

GABA Y GLUTAMATO

Fármaco	Mecanismo	Efecto	Memotecnia
Diazepam	BZD: potencia al GABA en el GABA-A, ↑ frecuencia de apertura del canal de Cl−	Ansiolítico, sedante, hipnótico, anticonvulsivante, miorrelajante	**Di Clo Al Mi Lo**: frecuencia en el cloro
Clonazepam		Ansiolítico, sedante, hipnótico, anticonvulsivante	
Alprazolam **Midazolam**		Ansiolítico, sedante, hipnótico	
Lorazepam		Anticonvulsivante en crisis agudas	
Fenobarbital	Barbitúrico: aumenta el tiempo de apertura de los canales de cloro	Anticonvulsivante y antiepiléptico	**Feno** y **Tío** se quedan **más tiempo**
Tiopental		Anestésico general: sedante	
Ácido valproico	Inhibe la recaptación de GABA, inhibe la GABA transaminasa e inhibe canales de Na+	Antiepiléptico	VAL: **Vuelve**, **Atrapa** y **Limita**
Vigabatrina	Inhibe la GABA transaminasa		Vigabatrina **vigila** a la transaminasa
Carbamazepina **Fenitoína**	Aumenta el tiempo de inactivación de los canales de Na+, disminuye la excitación neuronal		**Carla Fenita**, en la **Lámpara**: tres que apagan el sodio
Lamotrigina	Bloquea canales de Na+ e inhibe la excitación glutamatérgica		
Etosuximida	Bloqueo de canales de Ca++	Antiepiléptico: crisis de ausencia	**Eto** se **ausenta** con **calcio**
Flumazenil	Antagonista competitivo del receptor GABA-A en el sitio de benzodiacepinas	Revierte la intoxicación por benzodiacepinas	Flumazenil es el **fusible** de las benzos

HISTAMINA, HIERRO Y EPO

Fármaco	Mecanismo	Efecto	Memotecnia
Difenhidramina	Agonista inverso H1 de primera generación	Antialérgico sedante	Difenhidramina te **Difumina**: te deja dormido
Clorfeniramina **Hidroxicina**	Antihistamínico H1 de primera generación		**Clor** e **Hidroxi** también te duermen
Loratadina **Cetirizina**	Agonista inverso H1 de segunda generación: estabiliza el receptor	Antialérgico, poca sedación	**Lora** y **Ceti** tuvieron hijas: **Des-lora** y **Levo-ceti**
Desloratadina **Levocetirizina**	Antihistamínico H1 de tercera generación		**Des** y **Levo** son la tercera
Famotidina **Ranitidina** **Cimetidina** (además inhibe el citocromo P450)	Antagonista selectivo competitivo y reversible del receptor H2	Inhibe la secreción de ácido gástrico	Las -tidina frenan el ácido: **Famo** y **Rani** **Cime** pelea con el citocromo
Cromoglicato de sodio	Estabiliza la membrana mastocitaria e impide liberar mediadores	Asma, rinitis y conjuntivitis alérgica	Cromoglicato **blinda** al mastocito
Eritropoyetina	Se une a Epo-R y activa JAK-2 y STAT 5, con inducción génica	Promueve la formación de la serie eritrocitaria	EPO: **Epo-R**, **JAK**, **STAT**, se abre el **núcleo** **Alfa**, **Beta** y **Metoxi**: la EPO de farmacia
Epoetina alfa (30% de biodisponibilidad SC) **Epoetina beta** (24 a 40% de biodisponibilidad SC) **Metoxipolietilen glicol-EPO beta**	Forma farmacéutica de EPO		
Sulfato ferroso	Aporta hierro ferroso por vía oral	Repone hierro	**Ferroso** entra fácil. **Férrico** por la vena
Hierro sacarato **Hierro carboximaltosa**	Hierro férrico por vía EV		**Sacarato** y **carboximaltosa** van por la vena

ANTINEOPLÁSICOS

Efecto de todos: antineoplásico

Fármaco	Mecanismo	Fase	Memotecnia
Ciclofosfamida	Se une de forma covalente con un grupo alquilo a los ácidos nucleicos del ADN	No específico de fase	**Ciclo**, **Car** y **Bus** alquilan **a toda hora**
Busulfán	Alquil sulfonato: agente alquilante		
Carmustina	Nitrosourea: alquila el ADN		
Doxorrubicina	Altera la replicación normal uniéndose a los pares de bases del ADN y bloqueando la transcripción		**Rubicina** roja, **corazón roto** **Bleo** rompe en G2
Bleomicina	Produce especies de oxígeno reactivo y daño directo al ADN (fase G2)		
Metotrexato	Análogo del ácido fólico: interfiere en la síntesis normal de ácidos nucleicos	S	S de **Síntesis** y de **metabolitoS**: antimetabolitos en fase S **Me Fluye Claro** en la fase S
5-Fluorouracilo	Análogo de pirimidinas: interfiere en la síntesis de ácidos nucleicos		
Cladribina	Análogo de purinas		
Etopósido	Inhibe la topoisomerasa II y evita que la célula entre en mitosis	G2 y M	EtoPÓsido: topoisomerasa, antes de **Pasar a mitosis**
Vincristina **Vinblastina**	Inhibe el ensamblaje de los microtúbulos al unirse a la tubulina	M	**Vinca desarma**. **Taxel taxativo**: no se mueve **Vin-cris** y **Vin-blas** desarman
Paclitaxel **Docetaxel**	Se une a los microtúbulos ya formados y los estabiliza		Taxi detenido: **Pacli** y **Doce no se mueven**

ANTICUERPOS MONOCLONALES

Fármaco	Mecanismo	Efecto	Memotecnia
Rituximab	Quimérico anti-CD20	LNH B, LLC, artritis reumatoide, PTI, AHAI	**Ritu**ximab 20, **Bren**tuximab 30, **Infli**ximab inflama menos
Infliximab	Quimérico anti TNF-α	Artritis reumatoide, artritis psoriásica, Crohn, colitis ulcerosa	
Brentuximab	Quimérico anti-CD30	Linfoma de Hodgkin	
Alemtuzumab	Humanizado anti-CD52	Leucemia linfática crónica	**Toci** toca IL-6. **Alem** es 52. **Iba** al CD4
Ibalizumab	Humanizado anti-CD4	HIV multirresistente	
Tocilizumab	Humanizado anti receptor de IL-6	Artritis reumatoide	
Daratumumab	Humano anti-CD38	Mieloma múltiple	**Dara 38** al **mieloma**