

$$a^{p_n} = \frac{1}{\left(\frac{1}{a}\right)^{p_n}}, \quad a^{q_n} = \frac{1}{\left(\frac{1}{a}\right)^{q_n}},$$

所以结论(1)和(2)也仍然成立. \square

根据这引理,我们给出以下定义.

定义 设 $a \in \mathbb{R}, a > 0, x$ 是无理数. 我们定义

$$a^x = \lim a^{q_n},$$

这里 $\{q_n\}$ 是收敛于 x 的任意有理数序列.

注记 如果 $x \in \mathbb{Q}, \{q_n\} \subset \mathbb{Q}, q_n \rightarrow x$, 那么仍有

$$a^x = \lim a^{q_n}.$$

这是因为我们可以把 x 视为常数序列

$$p_n = x, \quad n = 1, 2, \dots,$$

于是由引理 2 可得

$$a^x = \lim a^{p_n} = \lim a^{q_n}.$$

定理 2 对于 $a \in \mathbb{R}, a > 0$ 和 $x, y \in \mathbb{R}$, 我们有

$$(1) \quad a^{x+y} = a^x \cdot a^y;$$

$$(2) \quad a > 1, x < y \Rightarrow a^x < a^y,$$

$$a < 1, x < y \Rightarrow a^x > a^y.$$

证明 (1) 设 $\{p_n\}, \{q_n\}$ 是有理数序列, $p_n \rightarrow x, q_n \rightarrow y$, 则 $p_n + q_n \rightarrow x + y$. 于是

$$\begin{aligned} a^{x+y} &= \lim a^{p_n+q_n} \\ &= \lim (a^{p_n} \cdot a^{q_n}) \\ &= \lim a^{p_n} \cdot \lim a^{q_n} \\ &= a^x \cdot a^y. \end{aligned}$$

(2) 我们对 $a > 1$ 的情形给出证明 ($a < 1$ 的情形可类似地讨论). 设 $\{p_n\}, \{q_n\}$ 是有理数序列, $p_n \rightarrow x, q_n \rightarrow y$. 因为 $x < y$, 所以对充分大的 n 就有

$$p_n < q_n,$$

于是

$$a^{p_n} < a^{q_n}, \\ a^x = \lim a^{p_n} \leq \lim a^{q_n} = a^y.$$

为了得到严格的不等式,我们在 x 与 y 之间插入两个有理数 r 和 s :

由有理数稠密性

$$x < r < s < y, \quad r, s \in \mathbf{Q}.$$

于是

$$a^x \leq a^r < a^s \leq a^y.$$

这样,我们证明了

$$a > 1, x < y \Rightarrow a^x < a^y. \quad \square$$

引理 3 设 $a \in \mathbf{R}, a > 1, x, y \in \mathbf{R}, |x - y| < 1$. 则有

$$|a^x - a^y| \leq a^y(a - 1)|x - y|.$$

证明 设 $\{p_n\}, \{q_n\}$ 是有理数序列, $p_n \rightarrow x, q_n \rightarrow y$. 则对充分大的 n 有

$$|p_n - q_n| < 1.$$

于是有

$$|a^{p_n} - a^{q_n}| \leq a^{q_n}(a - 1)|p_n - q_n|.$$

在上式中让 $n \rightarrow +\infty$ 取极限就得到 \downarrow 由引理 3.

$$|a^x - a^y| \leq a^y(a - 1)|x - y|. \quad \square$$

定理 3 设 $a \in \mathbf{R}, a > 1$. 则指数函数 a^x 在 $\mathbf{R} = (-\infty, +\infty)$ 上有定义,严格递增并且连续.

证明 只剩下关于连续性的结论尚待证明. 设 $x_0 \in \mathbf{R}, \{x_n\} \subset \mathbf{R}, x_n \rightarrow x_0$. 则对充分大的 n 有

$$|x_n - x_0| < 1.$$

于是有

$$|a^{x_n} - a^{x_0}| \leq a^{x_0}(a - 1)|x_n - x_0|.$$

由此得知函数 a^x 在 x_0 点连续. \square

推论 设 $a \in \mathbf{R}, 0 < a < 1$. 则指数函数 a^x 在 $\mathbf{R} = (-\infty, +\infty)$ 上有定义,严格递减并且连续.

$+\infty$)有定义,严格递减并且连续.

证明 我们有

$$a^x = \frac{1}{\left(\frac{1}{a}\right)^x}, \quad \frac{1}{a} > 1.$$

利用定理 3 就得到本推论. \square

引理 4 设 $a \in \mathbf{R}, a > 1$. 则有

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty,$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0.$

证明 (1) 我们有不等式

$$a^n = (1 + (a - 1))^n \geq 1 + n(a - 1), \quad \forall n \in \mathbf{N}.$$

对任何 $E > 0$, 可取 $\Delta = \frac{E}{a-1} + 1$, 则当 $x > \Delta$ 时, 就有

$$\begin{aligned} a^x &\geq a^{[x]} \geq 1 + [x](a - 1) \\ &> 1 + \frac{E}{a-1}(a - 1) > E. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{a^{-x}} \\ &= \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{1}{a^u} = 0. \quad \square \end{aligned}$$

设 $a \in \mathbf{R}, a > 1$. 我们看到: 严格递增的连续函数 $y = a^x$ 把区间 $(-\infty, +\infty)$ 一对一地映成区间 $(0, +\infty)$. 因而对任意的 $y \in (0, +\infty)$, 存在唯一的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 使得

$$a^x = y.$$

我们把这样由 y 唯一确定的 x 称为以 a 为底 y 的对数, 记为

$$x = \log_a y.$$

作为指数函数 $y = a^x$ 的反函数, 对数函数 $x = \log_a y$ 是连续的. 我们把这一事实写成以下定理.

定理 4 设 $a \in \mathbf{R}, a > 1$, 则

(1) 对数函数 $x = \log_a y$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上有定义, 严格递增

$a^{-x} = \frac{1}{a^x}$
 很好理解, 由定义自然成立.
 $\ln x + \ln y = \ln xy$.

并且连续;

$$(2) \lim_{y \rightarrow +\infty} \log_a y = +\infty, \lim_{y \rightarrow 0+} \log_a y = -\infty.$$

证明 结论(1)可以从关于反函数的一般定理 (§3 的定理 3) 得出. 结论(2)的证明如下: 对任意 $E > 0$, 可取 $\Delta = a^E > 0$, 于是对于 $y > \Delta$, 就有

$$\log_a y > \log_a \Delta = E.$$

这证明了

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \log_a y = +\infty.$$

由此又可得

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow 0+} \log_a y &= \lim_{y \rightarrow 0+} \left(-\log_a \left(\frac{1}{y} \right) \right) \\ &= \lim_{z \rightarrow +\infty} (-\log_a z) \\ &= -\infty. \quad \square \end{aligned}$$

在数学的理论研究和应用中, 常常采用数 e 作为指数函数或者对数函数的底. 这里数 e 定义为

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n.$$

以 e 为底的对数称为自然对数, 记为

$$\ln y = \log_e y, \quad \forall y > 0.$$

我们已经看到: 多项式函数, 有理分式函数, 三角函数, 反三角函数, 指数函数, 对数函数等函数在它们有定义的范围都是连续的. 这些函数称为基本初等函数. 由基本初等函数经过有限次四则运算和复合而成的函数称为初等函数. 于是, 我们有:

定理 5 初等函数在其有定义的范围都是连续的. 连续性由基本初等函数的连续性和复合函数的连续性.

例 1 考查幂函数 $y = x^\mu (x > 0, \mu \in \mathbb{R})$ 的连续性. 我们可以把它视为复合函数:

$$y = x^\mu = e^{\mu \ln x}.$$

由指数函数和对数函数的连续性可知: 幂函数在它有定义的范围是连续的.