

INF367, Spring 2020
Exercise 9: Solutions

Gibbs sampler:

$$P(\mathbf{w} | y, \mathbf{x}, \beta) \propto N(\mathbf{w} | \mathbf{0}, \alpha^{-1} \mathbf{I}) \prod_{i=1}^n N(y_i | \mathbf{w}^T \mathbf{x}_i, \beta^{-1})$$

Gaussian likelihood is the conjugate prior for Gaussian prior. It follows that $P(\mathbf{w} | y, \mathbf{x}, \alpha, \beta) = N(\mathbf{w} | \mathbf{m}, \mathbf{S})$ where

$$\mathbf{S} = (\beta \sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i \mathbf{x}_i^T + \alpha \mathbf{I})^{-1}$$

and

$$\mathbf{m} = \mathbf{S} (\beta \sum_{i=1}^n y_i \mathbf{x}_i).$$

$$P(\beta | y, \mathbf{x}, \mathbf{w}, \alpha) \propto \text{Gamma}(\beta | a_0, b_0) \prod_{i=1}^n N(y_i | \mathbf{w}^T \mathbf{x}_i, \beta^{-1})$$

We notice that there are Gamma prior for the precision of Gaussian likelihood with known mean. It follows that the probability of β follows a Gamma distribution

$$\text{Gamma}(\beta | a_0 + \frac{n}{2}, b_0 + \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \mathbf{w}^T \mathbf{x}_i)^2}{2}).$$