Kompendium til kapitel 5


Mængdeberegning

Navn _____

Klasse _____

INDHOLD

Noter til 5.1 Beregninger i kemi	2
Opgaver til 5.1 Beregninger i kemi	4
Noter til 5.2 Molarmasse	6
Opgaver til 5.2 Molarmasse	8
Noter til 5.3 Stofmængde	11
Opgaver til 5.3 Stofmængde	13
Noter til 5.4 Ækvivalente mængder	16
Opgaver til 5.4 Ækvivalente mængder	18
Noter til 5.5 Mængdeberegning	21
Opgaver til 5.5 Mængdeberegning	23
Noter til 5.6 Gasser	27
Opgaver til 5.6 Gasser	29
Øvelse 5.5a: Ståluld på vægten	30
Øvelse 5.5b: Natron i diglen	33
Ekstraopgaver	36
Bilag: Det periodiske system	39



NOTER

5.1 Beregninger i kemi

Størrelser, symboler og enheder

Udfyld skemaet. Hvordan skriver du massen af vand med symboler?

Størrelse	Symbol	Enhed
Masse		
Volumen		
Densitet		

Densitet

Skriv, hvad densiteten fortæller, og hvornår et stof flyder på vand.

Skriv formlen for densitet på de tre måder.

Du vil finde	Formel
densiteten	
massen	
volumenet	

Sådan skriver du en pæn beregning

Følg de fire trin i bogens eksempel: Hvor meget vejer 25,0 mL madolie med densiteten 0,92 g/mL?

Trin	***m*(olie)**
1. Kendte størrelser	
2. Formel	
3. Beregning	
4. Konklusion	

Hvordan viser enhederne, om formlen er rigtig?

Betydende cifre

Skriv, hvilke cifre der tæller med som betydende cifre, og udfyld skemaet.

Tal	**0,0250**	**10,00**	**4,5**	**0,30**
Antal betydende cifre				

Skriv reglen for afrunding. Hvorfor er facit i eksemplet med madolien 23 g og ikke 23,0 g?

OPGAVER

5.1 Beregninger i kemi

Skriv hver beregning i fire trin: kendte størrelser, formel, beregning med enheder og konklusion.

Opgave 1: Størrelse, symbol og enhed 5.1.1

Udfyld skemaet.

Størrelse	Symbol	Enhed
Masse		
Volumen		
Densitet		

Opgave 2: Beregn densiteten 5.1.2

En sten vejer 67,5 g og har volumenet 25,0 mL. Beregn stenens densitet.

Opgave 3: Beregn massen 5.1.3

Ethanol har densiteten 0,789 g/mL. Hvor meget vejer 50,0 mL ethanol?

Opgave 4: Beregn volumenet 5.1.4

Guld har densiteten 19,3 g/mL. Hvor meget fylder en guldklump på 96,5 g?

Opgave 5: Tæl betydende cifre 5.1.5

Hvor mange betydende cifre har hvert tal?

a. 12,5 _____ **c.** 3,00 _____ **e.** 100,0 _____

b. 0,050 _____ **d.** 0,0071 _____ **f.** 6,02 _____

Opgave 6: Afrund 5.1.6

Afrund hvert tal til 3 betydende cifre.

a. 2,3456 _____ **c.** 98,076 _____

b. 0,045678 _____ **d.** 7,996 _____

Opgave 7: Gør beregningen pæn 5.1.7

En elev har skrevet denne beregning af en densitet:

46 / 50 = 0,92

a. Hvad mangler der i beregningen?

b. Skriv beregningen om, så den er pæn. Massen er 46,0 g, og volumenet er 50,0 mL.

NOTER

5.2 Molarmasse

Atomer vejes i u

Hvorfor måles atomers masse i u og ikke i gram? Find atommassen for hydrogen og for oxygen i det periodiske system.

Formelmasse

Skriv, hvad formelmassen er, og skriv dens symbol og enhed. Beregn formelmassen for vand, H_2O, og for natriumchlorid, NaCl.

Fra u til gram

Hvad er et mol, og hvad er molarmassen? Skriv molarmassens symbol og enhed, og forklar forskellen på formelmassen og molarmassen for vand.

Sådan beregnes molarmassen

Forklar med dine egne ord, hvordan du beregner molarmassen ud fra stoffets formel.

Eksempel: molarmassen for carbondioxid

Beregn molarmassen for carbondioxid, CO_2.

Trin	$\boldsymbol{M(CO_2)}$
Formel	
Beregning	
Konklusion	

Eksempel: en formel med parentes

Beregn molarmassen for calciumhydroxid, $Ca(OH)_2$.

Trin	$\boldsymbol{M(Ca(OH)_2)}$
Formel	
Beregning	
Konklusion	

Hvad gælder tallet efter en parentes for?

OPGAVER

5.2 Molarmasse

Atommasserne står i det periodiske system.

Opgave 1: Find atommasserne

5.2.1

Find atommassen for hvert grundstof.

Grundstof	H	C	N	O	Na	Cl
Atommasse (u)						

Opgave 2: Tæl atomerne

5.2.2

Skriv, hvor mange atomer der er af hvert grundstof i formlen.

a. CO_2 _____

b. H_2SO_4 _____

c. $Mg(OH)_2$ _____

d. $Ca(NO_3)_2$ _____

e. $Al_2(SO_4)_3$ _____

Opgave 3: Små molekyler

5.2.3

Beregn molarmassen for hvert stof. Skriv formlen op først, som i eksemplet med vand.

Stof	Formel	Beregning	Molarmasse
Vand	$M(H_2O) = 2 \cdot M(H) + M(O)$	$2 \cdot 1{,}008 + 16{,}00$	18,02 g/mol
Natriumchlorid, NaCl			
Ammoniak, NH_3			
Methan, CH_4			
Oxygen, O_2			

Opgave 4: Større molekyler 5.2.4

Beregn molarmassen for hvert stof.

a. Ethanol, C_2H_6O

b. Svovlsyre, H_2SO_4

c. Glucose, $C_6H_{12}O_6$

Opgave 5: Formler med parentes 5.2.5

Beregn molarmassen for hvert stof.

a. Magnesiumhydroxid, $Mg(OH)_2$

b. Calciumnitrat, $Ca(NO_3)_2$

c. Aluminiumsulfat, $Al_2(SO_4)_3$

Opgave 6: Fra navn til molarmasse 5.2.6

Skriv formlen for hver ionforbindelse, og beregn molarmassen. Natriumoxid er vist som eksempel.

Navn	Formel	Molarmasse
Natriumoxid	Na_2O	61,98 g/mol
Calciumchlorid		
Magnesiumoxid		
Kaliumsulfat		

Opgave 7: Find fejlen 5.2.7

Begge beregninger indeholder en fejl. Find fejlen, og skriv det rigtige resultat.

a. $M(CO_2)$ = 12,01 g/mol + 16,00 g/mol = 28,01 g/mol

b. $M(H_2O) = 2 \cdot 1{,}008 + 16{,}00 = 18{,}02$ g

NOTER

5.3 Stofmængde

Et mol

Skriv, hvad et mol er, og skriv symbol og enhed for stofmængde. Hvorfor vejer ét mol vand ikke det samme som ét mol køkkensalt?

Fra masse til stofmængde

Skriv formlen på de tre måder.

Du vil finde	Formel	Enhed
stofmængden		
massen		
molarmassen		

Hvorfor har molarmassen enheden g/mol?

Eksempel: fra masse til stofmængde

Hvor stor en stofmængde er 10,0 g natriumchlorid, NaCl?

Trin	***n*(NaCl)**
Kendte størrelser	
Formel	
Beregning	
Konklusion	

Eksempel: fra stofmængde til masse

Hvor meget vejer 2,00 mol vand?

Trin	***m*(H_2O)**
Kendte størrelser	
Formel	
Beregning	
Konklusion	

Hvor mange er det?

Hvordan finder du antallet af molekyler? Beregn antallet af vandmolekyler i 2,00 mol vand.

OPGAVER

5.3 Stofmængde

De molarmasser, du skal bruge, står her:

Stof	H_2O	CO_2	NaCl	CH_4	O_2	$C_6H_{12}O_6$	$C_{12}H_{22}O_{11}$
M (g/mol)	18,02	44,01	58,44	16,04	32,00	180,16	342,30

Opgave 1: Tre størrelser

5.3.1

Udfyld skemaet.

Størrelse	Symbol	Enhed
Masse		
Molarmasse		
Stofmængde		

Opgave 2: Vælg formlen

5.3.2

Skriv den formel, du skal bruge, når du vil finde

a. stofmængden _____

b. massen _____

c. molarmassen _____

Opgave 3: Beregn stofmængden 5.3.3

Beregn stofmængden af

a. 36,0 g vand, H_2O

b. 10,0 g carbondioxid, CO_2

c. 25,0 g natriumchlorid, NaCl

Opgave 4: Beregn massen 5.3.4

Beregn massen af

a. 0,500 mol natriumchlorid, NaCl

b. 1,50 mol carbondioxid, CO_2

c. 0,250 mol glucose, $C_6H_{12}O_6$

Opgave 5: Udfyld skemaet 5.3.5

Udfyld de tomme felter.

Stof	Molarmasse *M*	Stofmængde *n*	Masse *m*
CH_4	16,04 g/mol		8,02 g
O_2	32,00 g/mol	0,200 mol	
NH_3	17,03 g/mol		51,1 g
$CaCO_3$	100,09 g/mol	0,150 mol	

Opgave 6: Et ukendt stof 5.3.6

Et glas indeholder 0,250 mol af en gas. Gassen vejer 11,0 g.

a. Beregn gassens molarmasse.

b. Gassen er enten oxygen, carbondioxid eller methan. Hvilken?

Opgave 7: Hvor mange molekyler? 5.3.7

Et glas indeholder 0,50 mol vand. Hvor mange vandmolekyler er der i glasset?

Opgave 8: Jern og guld 5.3.8

Ét mol jern vejer 55,85 g, og ét mol guld vejer 196,97 g.

a. Hvilken af de to portioner indeholder flest atomer?

b. Forklar, hvorfor de to portioner ikke vejer det samme.

NOTER

5.4 Ækvivalente mængder

En opskrift

Skriv opskriften på en hotdog som et forhold. Hvor meget skal der bruges til fem hotdogs?

Reaktionsskemaet er en opskrift

Udfyld skemaet for dannelsen af vand. Gælder koefficienterne stofmængder eller masser?

	2 H_2	**+ O_2**	**→ 2 H_2O**
Antal molekyler			
Stofmængde			
Tre gange så meget			

Ækvivalente mængder

Forklar, hvad ækvivalente mængder er. Hvordan regner du fra stofmængden af ét stof til stofmængden af et andet?

Eksempel: fremstilling af ammoniak
Hvor meget hydrogen skal der bruges til 4,0 mol nitrogen, og hvor meget ammoniak dannes der?

$$N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$$

Den begrænsende faktor

Forklar ordene begrænsende faktor og i overskud. Brug 4 pølser og 3 brød som eksempel.

Eksempel: hvilket stof slipper op?
4,0 mol H_2 blandes med 3,0 mol O_2 og antændes. Hvilket stof er den begrænsende faktor, og hvor meget vand dannes der?

$$2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$$

OPGAVER

5.4 Ækvivalente mængder

Opgave 1: Opskriften 5.4.1

En hotdog laves af 1 pølse, 1 brød og 2 agurkeskiver. Der skal laves hotdogs af 12 pølser.

a. Hvor mange brød skal der bruges?

b. Hvor mange agurkeskiver skal der bruges?

c. Hvor mange hotdogs bliver der?

Opgave 2: Læs reaktionsskemaet 5.4.2

Ammoniak fremstilles af nitrogen og hydrogen.

$$N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$$

a. Hvad er koefficienten for hvert af de tre stoffer?

b. Udfyld sætningen: 1 mol N_2 reagerer med … mol H_2 og bliver til … mol NH_3.

Opgave 3: Vand 5.4.3

$$2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$$

Udfyld de tomme felter med ækvivalente stofmængder.

$n(H_2)$	$n(O_2)$	$n(H_2O)$
2 mol	1 mol	2 mol
4,0 mol		
	0,30 mol	
		10 mol

Opgave 4: Naturgas brænder 5.4.4

Naturgas består mest af methan, som brænder med oxygen.

$$CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$$

Der brændes 3,0 mol methan. Beregn stofmængden af

a. det oxygen, der bruges

b. det carbondioxid, der dannes

c. det vand, der dannes

Opgave 5: Aluminium og oxygen 5.4.5

Aluminium reagerer med oxygen og bliver til aluminiumoxid.

$$4\ Al + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Al_2O_3$$

Der bruges 2,0 mol aluminium. Beregn stofmængden af

a. det oxygen, der bruges

b. det aluminiumoxid, der dannes

Opgave 6: Hvad slipper op? 5.4.6

I køkkenet er der 10 pølser, 8 brød og 20 agurkeskiver. En hotdog laves af 1 pølse, 1 brød og 2 agurkeskiver.

a. Hvor mange hotdogs kan der laves?

b. Hvad er den begrænsende faktor?

c. Hvad bliver der tilovers?

Opgave 7: Den begrænsende faktor 5.4.7

6,0 mol H_2 blandes med 2,0 mol O_2 og antændes.

$$2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$$

a. Hvor stor en stofmængde H_2 skal der til for at reagere med 2,0 mol O_2?

b. Hvilket stof er den begrænsende faktor?

c. Hvor stor en stofmængde vand dannes der?

d. Hvor meget bliver der tilovers af det stof, der er i overskud?

NOTER

5.5 Mængdeberegning

Vejen fra gram til gram

Skriv, hvad du gør, når du går ned, på tværs og op, og tegn et mængdeberegningsskema med de tre pile.

Eksempel: magnesium brænder

2,43 g magnesium brændes af. Hvor meget magnesiumoxid dannes der? Skriv tallene i skemaet og beregningerne under det.

	2 Mg(s)	**+ O_2(g)**	**→ 2 MgO(s)**
m			
M			
n			

Trin	**Beregning**
1. Ned	
2. På tværs	
3. Op	
Konklusion	

Eksempel: benzin brænder

1,00 L benzin (regnet som octan, C_8H_{18}) vejer 750 g. Hvor meget carbondioxid dannes der, når den brænder?

	2 C_8H_{18}(l)	**+ 25 O_2(g)**	**→ 16 CO_2(g)**	**+ 18 H_2O(g)**
m				
M				
n				

To kendte masser

Du kender massen af begge de stoffer, der reagerer. Forklar, hvordan du finder ud af, hvilket stof der slipper op, og hvordan du regner videre.

Vejeanalyse

Skriv, hvad en vejeanalyse bruges til, og hvad der sker i hvert af de fire trin.

Trin	**Det sker der**
1. Fældning	
2. Filtrering	
3. Tørring	
4. Vejning	

OPGAVER

5.5 Mængdeberegning

Regn i tre trin: ned, på tværs og op. Atommasserne står i det periodiske system.

Opgave 1: Kul brænder

5.5.1

Carbon brænder med oxygen og bliver til carbondioxid. Hvor meget carbondioxid dannes der, når 6,00 g carbon brænder?

	C(s)	**+**	**O_2(g)**	**→**	**CO_2(g)**
m	6,00 g				
M	12,01 g/mol				44,01 g/mol
n					

a. Trin 1, ned: Beregn stofmængden af carbon.

b. Trin 2, på tværs: Find stofmængden af carbondioxid.

c. Trin 3, op: Beregn massen af carbondioxid.

Opgave 2: Jern ruster 5.5.3

Når jern ruster, reagerer det med oxygen og bliver til jern(III)oxid. Hvor meget jern(III)oxid kan der dannes af 11,17 g jern?

	4 Fe(s)	**+**	**3 O_2(g)**	**→**	**2 Fe_2O_3(s)**
m	11,17 g				
M	55,85 g/mol				
n					

Opgave 3: Kalk brændes 5.5.4

Når kalk, $CaCO_3$, varmes kraftigt op, bliver det til brændt kalk, CaO, og carbondioxid. Hvor meget brændt kalk dannes der af 50,0 g kalk?

$$CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$$

Opgave 4: Baglæns 5.5.5

Der skal fremstilles 10,0 g magnesiumoxid. Hvor meget magnesium skal der bruges?

$$2\ Mg(s) + O_2(g) \rightarrow 2\ MgO(s)$$

Opgave 5: To kendte masser 5.5.7

4,86 g magnesium opvarmes sammen med 1,60 g oxygen i en lukket beholder.

$$2\ Mg(s) + O_2(g) \rightarrow 2\ MgO(s)$$

a. Beregn stofmængden af magnesium og af oxygen.

b. Hvilket stof er den begrænsende faktor?

c. Hvor meget magnesiumoxid dannes der?

Opgave 6: Vejeanalyse trin for trin

5.5.8

Indholdet af chlorid i en vandprøve skal bestemmes ved en vejeanalyse. Chloridionerne fældes ud som sølvchlorid med en opløsning af sølvnitrat.

a. Skriv ionskemaet for fældningen.

b. Sæt de fire trin i den rigtige rækkefølge: tørring, fældning, vejning og filtrering.

c. Hvorfor tilsættes der mere sølvnitrat, end der er brug for?

d. Hvorfor skylles bundfaldet med lidt vand, mens det ligger i filteret?

e. Bundfaldet bliver vejet, før det er helt tørt. Bliver resultatet for højt eller for lavt? Begrund svaret.

NOTER

5.6 Gasser

Gasser fylder meget

Tegn molekylerne i en væske og i en gas. Hvorfor fylder gassen mest?

Væske

Gas

Fire størrelser hænger sammen

Udfyld skemaet: Bliver gassens volumen større eller mindre?

Ændring	Gassens volumen bliver
Der kommer flere molekyler i cylinderen	
Gassen varmes op	
Trykket bliver større	

Temperaturen skal stå i kelvin

Skriv formlen for omregningen fra grader celsius til kelvin, og regn 20 °C om til kelvin.

Idealgasligningen

Skriv idealgasligningen, og udfyld skemaet. Skriv også formlen for volumenet og for stofmængden.

Symbol	Størrelse	Enhed
p		
V		
n		
T		
R		

Eksempel: volumenet af ét mol gas

Hvor meget fylder 1,00 mol gas ved 20 °C og 1,013 bar?

Gasser i en mængdeberegning

Hvad gør du i stedet for at gå op til massen? Regn bogens eksempel: 1,00 g zink reagerer med saltsyre. Hvor mange liter hydrogen dannes der ved 20 °C og 1,013 bar?

$$Zn(s) + 2\ HCl(aq) \rightarrow ZnCl_2(aq) + H_2(g)$$

OPGAVER

5.6 Gasser

Gaskonstanten er R = 0,0831 L · bar/(mol · K). Atommasserne står i det periodiske system.

Opgave 1: Fra celsius til kelvin

5.6.1

a. Regn temperaturerne om til kelvin: 0 °C, 20 °C, 100 °C og 225 °C.

b. Kroppens temperatur er 310 K. Hvor mange grader celsius er det?

Opgave 2: Beregn volumenet

5.6.4

Hvor meget fylder 2,00 mol gas ved 20 °C og 1,013 bar?

ØVELSE 5.5A

Ståluld på vægten

Formål

Du skal undersøge, hvad der sker med massen, når ståluld brænder. Bagefter skal du sammenligne din måling med en mængdeberegning.

Ståluld er næsten rent jern. Når jern brænder, reagerer det med oxygen fra luften og bliver til et jernoxid, som er et fast stof. I øvelsen regner du med, at der dannes jern(II)oxid, FeO.

$$2\ Fe(s) + O_2(g) \rightarrow 2\ FeO(s)$$

Apparatur og kemikalier: porcelænsskål, vægt, trefod med trådnet, bunsenbrænder, digeltang og 1 til 2 g ståluld.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller, og sæt langt hår op. Stålulden kan sende gnister ud, så fjern papir og andet, der kan brænde, fra bordet. Skålen er meget varm længe efter, at stålulden er holdt op med at gløde, og må kun flyttes med digeltangen.

Fremgangsmåde



Figur 1: Stålulden vejes i skålen før og efter, at den er brændt.

1. Skriv først dit gæt i skemaet: Bliver massen større, mindre eller uændret, når stålulden brænder?
2. Vej den tomme porcelænsskål. Træk en tot ståluld på 1 til 2 g lidt fra hinanden, læg den i skålen, og vej igen.
3. Stil skålen på trefoden, og hold flammen skråt ned på stålulden, til den gløder (figur 1). Vend stålulden med digeltangen, så flammen når ind alle steder, og bliv ved i et par minutter.
4. Lad skålen køle af i mindst 5 minutter, og vej den igen på den samme vægt.
5. Skriv ned, hvordan stålulden så ud før og efter.

6. Smid den brændte ståluld i den beholder, din lærer viser dig, når skålen er helt kold.

Resultater

Måling	Masse
Tom skål	g
Skål med ståluld før forsøget	g
Skål med indhold efter forsøget	g

	Det skrev jeg ned
Mit gæt: større, mindre eller uændret masse?	
Stålulden før forsøget	
Stålulden efter forsøget	

Efterbehandling

1. Beregn massen af stålulden før forsøget.

$$m(\text{ståluld}) = m(\text{skål med ståluld}) - m(\text{skål}) = \square\,\text{g} - \square\,\text{g} = \square\,\text{g}$$

2. Beregn massen af det stof, der ligger i skålen efter forsøget.

$$m(\text{efter}) = m(\text{skål med indhold}) - m(\text{skål}) = \square\,\text{g} - \square\,\text{g} = \square\,\text{g}$$

3. Blev massen større eller mindre? Passede dit gæt?

4. Reaktionsskemaet viser, at jernet har reageret med et stof fra luften. Hvilket stof er det?

5. Beregn, hvor mange gram jern(II)oxid der kan dannes af din ståluld, hvis alt jernet reagerer. Skriv først massen af din ståluld i skemaet. Regn så ned, på tværs og op med de fire beregninger under skemaet, og skriv tallene i skemaet undervejs.

	2 Fe(s)	+ O_2(g)	→ 2 FeO(s)
m i g		–	
M i g/mol	55,85	–	
n i mol		–	

$$n(\text{Fe}) = \frac{m(\text{Fe})}{M(\text{Fe})} = \frac{\square\,\text{g}}{55{,}85\ \text{g/mol}} = \square\,\text{mol}$$

$$n(\mathrm{FeO}) = n(\mathrm{Fe}) = \square\ \mathrm{mol}$$

$$M(\mathrm{FeO}) = 55{,}85\ \mathrm{g/mol} + 16{,}00\ \mathrm{g/mol} = \square\ \mathrm{g/mol}$$

$$m(\mathrm{FeO}) = n(\mathrm{FeO}) \cdot M(\mathrm{FeO}) = \square\ \mathrm{mol} \cdot \square\ \mathrm{g/mol} = \square\ \mathrm{g}$$

6. Beregn afvigelsen mellem den masse, du målte efter forsøget, og den beregnede masse af jern(II)oxid. Den beregnede masse er den forventede værdi.

$$\text{afvigelse} = \frac{\text{målt værdi} - \text{forventet værdi}}{\text{forventet værdi}} \cdot 100\ \%$$

$$\text{afvigelse} = \frac{\square\ \mathrm{g} - \square\ \mathrm{g}}{\square\ \mathrm{g}} \cdot 100\ \% = \square\ \%$$

ØVELSE 5.5B

Natron i diglen

Formål

Du skal finde ud af, hvilket stof natron bliver til, når det varmes op. Det gør du ved at sammenligne den masse, du måler, med mængdeberegninger på de mulige reaktionsskemaer.

Natron er natriumhydrogencarbonat, $NaHCO_3$, og bruges som hævemiddel, fordi det afgiver gasser, når det varmes op. Tilbage i diglen bliver et fast stof, som indeholder natrium. Hvert muligt reaktionsskema giver sin egen masse af det faste stof, så vægten kan afgøre, hvilket skema der er det rigtige.

Apparatur og kemikalier: digel, digeltrekant, trefod, bunsenbrænder, digeltang, spatel, vægt og omkring 2 g natron.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller. Diglen er meget varm længe efter opvarmningen og må kun flyttes med digeltangen.

Fremgangsmåde



Figur 1: Natronen vejes i diglen før og efter opvarmningen.

1. Vej den tomme digel.
2. Kom 1,5 til 2 g natron i diglen, og vej igen.
3. Sæt diglen i digeltrekanten på trefoden (figur 1), og varm den kraftigt i mindst 5 minutter. Rør forsigtigt rundt med spatelen undervejs.
4. Lad diglen køle af i 5 minutter, og vej den igen på den samme vægt.
5. Skyl indholdet ud i vasken med vand.

Resultater

Måling	Masse
Tom digel	g
Digel med natron før opvarmningen	g
Digel med fast stof efter opvarmningen	g

Efterbehandling

Det faste stof kan være natriumoxid, Na_2O, natriumhydroxid, NaOH, eller natriumcarbonat, Na_2CO_3.

$$NaHCO_3(s) \rightarrow Na_2O(s) + H_2O(g) + CO_2(g)$$

$$NaHCO_3(s) \rightarrow NaOH(s) + CO_2(g)$$

$$NaHCO_3(s) \rightarrow Na_2CO_3(s) + H_2O(g) + CO_2(g)$$

1. Beregn massen af natron før opvarmningen og massen af det faste stof efter.

2. Afstem de tre reaktionsskemaer.

3. Beregn for hvert reaktionsskema, hvor meget fast stof der burde blive tilbage. Stil hver beregning op i et mængdeberegningsskema.

4. Beregn afvigelsen mellem den målte masse og hver af de tre beregnede masser, og afgør, hvilket reaktionsskema der passer bedst.

5. Giv en fejlkilde, og forklar, om den gør den målte masse for stor eller for lille.

Ekstraopgaver

Til dig, der bliver hurtigt færdig. Opgaverne følger afsnittene. Det periodiske system står bagest.

Til 5.1 Beregninger i kemi

Opgave 1: Flyder eller synker? 5.1.8

Vand har densiteten 1,00 g/mL. Afgør for hvert stof, om det flyder eller synker i vand.

Stof	Densitet
Is	0,92 g/mL
Jern	7,87 g/mL
Kork	0,24 g/mL
Glas	2,5 g/mL

Opgave 2: Mælk 5.1.mad.1

250 mL sødmælk vejer 258 g. Beregn mælkens densitet.

Til 5.2 Molarmasse

Opgave 3: To slags sukker 5.2.mad.1

Druesukker har formlen $C_6H_{12}O_6$, og almindeligt sukker har formlen $C_{12}H_{22}O_{11}$.

a. Beregn molarmassen for almindeligt sukker.

b. Molarmassen for druesukker er 180,16 g/mol. Hvilket af de to stoffer vejer mest for hvert mol?

Til 5.3 Stofmængde

Opgave 4: En sukkerknald 5.3.mad.1

En sukkerknald vejer 2,0 g og består af sukker, $C_{12}H_{22}O_{11}$.

a. Beregn stofmængden af sukker i sukkerknalden.

b. Hvor mange sukkermolekyler er der i sukkerknalden?

Til 5.4 Ækvivalente mængder

Opgave 5: Gæring 5.4.mad.1

Når gær omdanner glucose, dannes der ethanol og carbondioxid. Det sker, når dej hæver, og når øl og vin gærer.

$$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2$$

Gæren omdanner 3,0 mol glucose. Hvor store stofmængder ethanol og carbondioxid dannes der?

Til 5.5 Mængdeberegning

Opgave 6: Chlorid i havvand

5.5.9

Til 10,0 mL havvand fra Nordsøen tilsættes sølvnitrat i overskud. Bundfaldet af sølvchlorid filtreres fra og tørres. Filteret vejer 0,912 g, og filteret med det tørre bundfald vejer 1,700 g.

$$Ag^+(aq) + Cl^-(aq) \rightarrow AgCl(s)$$

a. Beregn massen af bundfaldet.

b. Trin 1, ned: Beregn stofmængden af sølvchlorid.

c. Trin 2, på tværs: Find stofmængden af chlorid i de 10,0 mL havvand.

d. Trin 3, op: Beregn massen af chlorid i de 10,0 mL havvand.

Opgave 7: Fra druesukker til alkohol


5.5.mad.1

Gær omdanner glucose til ethanol og carbondioxid. Hvor meget ethanol kan der dannes af 100,0 g glucose?

	$C_6H_{12}O_6$	→	$2\ C_2H_5OH$	+	$2\ CO_2$
m	100,0 g				
M	180,16 g/mol		46,07 g/mol		
n					

BILAG

Det periodiske system



Hvert felt viser grundstoffets atomnummer, symbol og atommasse i u. De grønne tal over kolonnerne er hovedgruppernes numre, og tallene til venstre er perioderne.