

**แบบสอบถามพื้นฐาน**  
**เรื่อง การติตราและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเอชไอวีในสถานบริการสุขภาพ**  
**สำหรับนักศึกษาแพทย์และพยาบาล**

(DRISTI MEDICAL & NURSING STUDENT BASELINE QUESTIONNAIRE)

**คำชี้แจง** แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามพื้นฐาน เรื่อง การติตราและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเอชไอวีในสถานบริการสุขภาพ สำหรับนักศึกษาแพทย์และพยาบาล โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ☐ และเติมข้อมูลลงในช่องว่างตามความเป็นจริง แบบสอบถามประกอบด้วย 10 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลประชากร	จำนวนคำถามทั้งหมด 3 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี / การตรวจหาเชื้อเอชไอวี	จำนวนคำถามทั้งหมด 9 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเรื่องพฤติกรรมทางวิชาชีพ	จำนวนคำถามทั้งหมด 10 ข้อ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเรื่องบรรทัดฐานชุมชนวิชาชีพ	จำนวนคำถามทั้งหมด 7 ข้อ
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเรื่องนโยบายด้านการดูแลสุขภาพ	จำนวนคำถามทั้งหมด 23 ข้อ
ส่วนที่ 6 แบบสอบถามเรื่องการดูแลประชากรกลุ่มต่างๆ	จำนวนคำถามทั้งหมด 8 ข้อ
ส่วนที่ 7 แบบประเมินความรู้เรื่องการแพร่เชื้อเอชไอวี	จำนวนคำถามทั้งหมด 9 ข้อ
ส่วนที่ 8 แบบประเมินความรู้ความรู้ในการป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน	จำนวนคำถามทั้งหมด 16 ข้อ
ส่วนที่ 9 แบบสอบถามเรื่องมาตรการป้องกัน	จำนวนคำถามทั้งหมด 7 ข้อ
ส่วนที่ 10 แบบสอบถามเรื่องความมั่นใจในการปฏิบัติ	จำนวนคำถามทั้งหมด 7 ข้อ
รวม 99 ข้อ	

**แบบสอบถามพื้นฐาน**  
**เรื่อง การติดตามและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเอชไอวีในสถานบริการสุขภาพ**  
**สำหรับนักศึกษาแพทย์และพยาบาล**

(DRISTI MEDICAL & NURSING STUDENT BASELINE QUESTIONNAIRE)

วันที่: __/__/__(วัน/เดือน/ปี)	
เลขที่ผู้เข้าร่วมทดสอบ#: _____	
<b>มหาวิทยาลัย:</b>  <input type="radio"/> 1. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  <input type="radio"/> 2. กรมแพทย์ทหารบก (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า/ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก)	<b>ประเภทผู้เข้าร่วมทดสอบ:</b>  <input type="radio"/> 1. นักศึกษาแพทย์  <input type="radio"/> 2. นักศึกษาพยาบาล

## 1. ข้อมูลประชากร (Demographic Data)

1.1 ปัจจุบันคุณอายุเท่าไร.....ปี

1.2 คุณเพศอะไร

- ☐ (ก) ชาย
- ☐ (ข) หญิง
- ☐ (ค) ไม่ระบุ

1.3 ภูมิลำเนาเดิมของคุณอยู่ที่ไหน

- ☐ (ก) กรุงเทพฯและปริมณฑล
- ☐ (ข) ภาคกลาง
- ☐ (ค) ภาคเหนือ
- ☐ (ง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ☐ (จ) ภาคตะวันออก
- ☐ (ฉ) ภาคตะวันตก
- ☐ (ช) ภาคใต้

## 2. การสัมผัสกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี / การตรวจหาเชื้อเอชไอวี (Contact with people living with HIV (PLHIV) / HIV Testing)

2.1 ตั้งแต่เริ่มเรียนแพทย์/พยาบาล คุณเคยให้การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือไม่

☐ (ก) เคย ☐ (ข) ไม่เคย (ข้ามไปทำข้อ 2.2)

2.1.1 โดยทั่วไปคุณสวมใส่ **ถุงมือสองชั้น** เมื่อทำการตรวจร่างกายหรือทำหัตถการอื่นๆ กับ **ผู้ติดเชื้อเอชไอวี** หรือไม่

☐ (ก) ใช่ ☐ (ข) ไม่ใช่

2.1.2 โดยทั่วไปคุณสวมใส่ **ถุงมือสองชั้น** เมื่อทำการตรวจร่างกายหรือทำหัตถการอื่นๆ กับ **ผู้ป่วยรายอื่น** หรือไม่

☐ (ก) ใช่ ☐ (ข) ไม่ใช่

2.1.3 โดยทั่วไปคุณเข้มงวดในการใช้มาตรการป้องกันควบคุมการติดเชื้อมากเป็นพิเศษ เมื่อให้การดูแล **ผู้ติดเชื้อเอชไอวี** หรือไม่

☐ (ก) ใช่ ☐ (ข) ไม่ใช่

2.1.4 โดยทั่วไปคุณเข้มงวดในการใช้มาตรการป้องกันควบคุมการติดเชื้อมากเป็นพิเศษ เมื่อให้การดูแล **ผู้ป่วยรายอื่น** หรือไม่

☐ (ก) ใช่ ☐ (ข) ไม่ใช่

2.2 ตั้งแต่เริ่มเรียนแพทย์/พยาบาล คุณเคยสัมผัสกับเสื้อผ้า เครื่องนอน หรือสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่

☐ (ก) เคย ☐ (ข) ไม่เคย

2.2.1 คุณจะมี ความกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีเพียงใด หากคุณต้องสัมผัสกับเสื้อผ้า เครื่องนอน หรือสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

☐ (ก) กังวลมาก ☐ (ข) ค่อนข้างกังวล ☐ (ค) กังวลเล็กน้อย ☐ (ง) ไม่กังวลเลย

2.3 ตั้งแต่เริ่มเรียนแพทย์/พยาบาล คุณเคยทำแผลให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่

☐ (ก) เคย ☐ (ข) ไม่เคย

2.3.1 คุณจะมี ความกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีเพียงใด หากคุณต้องทำแผลให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

☐ (ก) กังวลมาก ☐ (ข) ค่อนข้างกังวล ☐ (ค) กังวลเล็กน้อย ☐ (ง) ไม่กังวลเลย

2.4 ตั้งแต่เริ่มเรียนแพทย์/พยาบาล คุณเคยเจาะเลือดผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่

☐ (ก) เคย ☐ (ข) ไม่เคย

2.4.1 คุณจะมี ความกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีเพียงใด หากคุณต้องเจาะเลือดผู้ติดเชื้อเอชไอวี

☐ (ก) กังวลมาก ☐ (ข) ค่อนข้างกังวล ☐ (ค) กังวลเล็กน้อย ☐ (ง) ไม่กังวลเลย

2.5 คุณเคยได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีหรือไม่

- ☐ (ก) เคย ➤ ทำข้อ 2.6 ต่อ
- ☐ (ข) ไม่เคย ➤ ข้ามไปทำข้อ 2.9
- ☐ (ค) อาจจะ, ไม่แน่ใจ ➤ ข้ามไปทำคำถามชุดต่อไป (พฤติกรรมทางวิชาชีพ)

2.6 คนที่ได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี เป็นธรรมดาที่จะมีความกังวลว่า ผลตรวจจะเป็นบวก หรือกังวลว่าจะได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างออกไปหากผลการตรวจเชื้อเป็นบวก **ถ้าคุณได้รับการตรวจหาเชื้อ คุณจะมีความกังวลเพียงใด ว่า你会ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างออกไปหรือถูกเลือกปฏิบัติ**

- ☐ (ก) กังวลมาก
- ☐ (ข) ค่อนข้างกังวล
- ☐ (ค) กังวลเล็กน้อย
- ☐ (ง) ไม่กังวลเลย

2.7 คนที่ได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี เป็นธรรมดาที่จะมีความกังวลว่าผลตรวจจะเป็นบวก หรือกังวลว่าจะได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างออกไปหากผลการตรวจเชื้อเป็นบวก **ถ้าผลตรวจของคุณเป็นบวก คุณจะมีความกังวลเพียงใด ว่า你会ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างออกไปหรือถูกเลือกปฏิบัติ**

- ☐ (ก) กังวลมาก ➤ ทำข้อ 2.8 ต่อ
- ☐ (ข) ค่อนข้างกังวล ➤ ทำข้อ 2.8 ต่อ
- ☐ (ค) กังวลเล็กน้อย ➤ ทำข้อ 2.8 ต่อ
- ☐ (ง) ไม่กังวลเลย ➤ ข้ามไปทำคำถามชุดต่อไป (พฤติกรรมทางวิชาชีพ)

2.8 เพราะเหตุใด คุณจึงรู้สึกเป็นกังวล (ตอบเสร็จแล้ว ข้ามไปทำคำถามชุดต่อไป (พฤติกรรมทางวิชาชีพ))

- ☐ (ก) คนอื่นอาจคิดว่าฉันมีพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบหรือผิดศีลธรรม
- ☐ (ข) ฉันอาจได้รับการลงโทษจากโรงเรียนแพทย์/พยาบาล เพราะเขาคิดว่าฉันไม่ระวังตัวเอง
- ☐ (ค) ครอบครัวของฉันอาจจะไม่ยอมรับฉันหรือปฏิบัติต่อฉันไม่ดี
- ☐ (ง) ฉันจะนำความอับอายมาสู่ครอบครัว
- ☐ (จ) อื่นๆ (โปรดระบุ).....

2.9 เพราะเหตุใดคุณจึงไม่เคยตรวจหาเชื้อเอชไอวี (ตอบเสร็จแล้ว ข้ามไปทำคำถามชุดต่อไป (พฤติกรรมทางวิชาชีพ))

- ☐ (ก) ฉันไม่เห็นความจำเป็นในการตรวจ เพราะคิดว่าไม่เคยได้รับเชื้อเอชไอวี
- ☐ (ข) ฉันกลัวว่าคนอื่นจะคิดว่าฉันติดเชื้อเอชไอวี
- ☐ (ค) ฉันอาจได้รับการลงโทษจากโรงเรียนแพทย์/พยาบาล เพราะเขาคิดว่าฉันไม่ระวังตัวเอง
- ☐ (ง) ครอบครัวฉันไม่อนุญาต
- ☐ (จ) ฉันไม่มีเวลาและยุ่งกับการทำอย่างอื่น
- ☐ (ฉ) อื่นๆ (โปรดระบุ).....

### 3. พฤติกรรมทางวิชาชีพ

(Professional behaviors)

คุณรู้สึกอย่างไรกับภาระงานเหล่านี้ เมื่อต้องให้การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี หากคุณยังไม่มีประสบการณ์เหล่านี้ ให้ลองนึกภาพ/จินตนาการว่า คุณจะรู้สึกอย่างไร และจะทำอะไร เมื่อต้องปฏิบัติภาระงานต่อไปนี้

แพทย์/พยาบาล		
3.1 เจาะเลือด	3.1.1 คุณจะรู้สึกกังวลเพียงใด ในการเจาะเลือด ให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> (ก) กังวลมาก</li> <li><input type="radio"/> (ข) ค่อนข้างกังวล</li> <li><input type="radio"/> (ค) กังวลเล็กน้อย</li> <li><input type="radio"/> (ง) ไม่กังวลเลย</li> </ul>	3.1.2 คุณจะทำอะไร หากคุณถูกบอกให้เจาะเลือดผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> (ก) ฉันจะปฏิเสธ หรือพยายามหาคนอื่นทำแทน</li> <li><input type="radio"/> (ข) ฉันจะทำ แต่ฉันจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยให้มากที่สุด</li> <li><input type="radio"/> (ค) ฉันจะทำ แต่ทำโดยป้องกันเป็นพิเศษ มากกว่าการป้องกันตามปกติในการเจาะเลือด</li> <li><input type="radio"/> (ง) ฉันจะทำเหมือนกับที่ฉันทำให้ผู้ป่วยรายอื่น ๆ</li> </ul>
3.2 เปิดเส้นเลือดเพื่อให้สารน้ำ/ยาทางหลอดเลือดดำ	3.2.1 คุณจะรู้สึกกังวลเพียงใด ในการเปิดเส้นเลือดเพื่อให้สารน้ำ/ยาทางหลอดเลือดดำ แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> (ก) กังวลมาก</li> <li><input type="radio"/> (ข) ค่อนข้างกังวล</li> <li><input type="radio"/> (ค) กังวลเล็กน้อย</li> <li><input type="radio"/> (ง) ไม่กังวลเลย</li> </ul>	3.2.2 คุณจะทำอะไร เมื่อคุณถูกบอกให้เปิดเส้นเลือดเพื่อให้สารน้ำ/ยาทางหลอดเลือดดำ แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> (ก) ฉันจะปฏิเสธ หรือพยายามหาคนอื่นทำแทน</li> <li><input type="radio"/> (ข) ฉันจะทำ แต่ฉันจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยให้มากที่สุด</li> <li><input type="radio"/> (ค) ฉันจะทำ แต่ทำโดยป้องกันเป็นพิเศษ มากกว่าการป้องกันตามปกติในการเปิดเส้นเลือดเพื่อให้สารน้ำ/ยาทางหลอดเลือดดำ</li> <li><input type="radio"/> (ง) ฉันจะทำเหมือนกับที่ฉันทำให้ผู้ป่วยรายอื่น ๆ</li> </ul>

<p><b>3.3</b> <b>ทำแผลชนิดเปิด</b></p>	<p>3.3.1 คุณจะรู้สึกกังวลเพียงใด ในการทำแผลชนิดเปิด ให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี</p> <p><input type="radio"/> (ก) กังวลมาก</p> <p><input type="radio"/> (ข) ค่อนข้างกังวล</p> <p><input type="radio"/> (ค) กังวลเล็กน้อย</p> <p><input type="radio"/> (ง) ไม่กังวลเลย</p>	<p>3.3.2 คุณจะทำอะไร หากคุณถูกบอกให้ทำแผลชนิดเปิด ให้ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี</p> <p><input type="radio"/> (ก) ฉันจะปฏิเสธ หรือพยายามหาคนอื่นทำแทน</p> <p><input type="radio"/> (ข) ฉันจะทำ แต่ฉันจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยให้มากที่สุด</p> <p><input type="radio"/> (ค) ฉันจะทำ แต่ทำโดยป้องกันเป็นพิเศษ มากกว่าการป้องกันตามปกติในการทำแผลชนิดเปิด</p> <p><input type="radio"/> (ง) ฉันจะทำเหมือนกับที่ฉันทำให้ผู้ป่วยรายอื่น ๆ</p>
<p><b>3.4</b> <b>ช่วยในห้องผ่าตัดและห้องคลอด</b></p>	<p>3.4.1 คุณจะรู้สึกกังวลเพียงใด ในการช่วยในห้องผ่าตัดและห้องคลอด แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี</p> <p><input type="radio"/> (ก) กังวลมาก</p> <p><input type="radio"/> (ข) ค่อนข้างกังวล</p> <p><input type="radio"/> (ค) กังวลเล็กน้อย</p> <p><input type="radio"/> (ง) ไม่กังวลเลย</p>	<p>3.4.2 คุณจะทำอะไร หากคุณถูกบอกให้ช่วยงานในห้องผ่าตัดและห้องคลอด แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี</p> <p><input type="radio"/> (ก) ฉันจะปฏิเสธ หรือพยายามหาคนอื่นทำแทน</p> <p><input type="radio"/> (ข) ฉันจะทำ แต่ฉันจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยให้มากที่สุด</p> <p><input type="radio"/> (ค) ฉันจะทำ แต่ทำโดยป้องกันเป็นพิเศษ มากกว่าการป้องกันตามปกติในการช่วยในห้องผ่าตัดและห้องคลอด</p> <p><input type="radio"/> (ง) ฉันจะทำเหมือนกับที่ฉันทำให้ผู้ป่วยรายอื่น ๆ</p>
<p><b>3.5</b> <b>ทำการตรวจฟังเสียงทรวงอก</b></p>	<p>3.5.1 คุณจะรู้สึกกังวลเพียงใด เมื่อคุณต้องทำการตรวจฟังเสียงทรวงอกผู้ติดเชื้อเอชไอวี</p> <p><input type="radio"/> (ก) กังวลมาก</p> <p><input type="radio"/> (ข) ค่อนข้างกังวล</p> <p><input type="radio"/> (ค) กังวลเล็กน้อย</p> <p><input type="radio"/> (ง) ไม่กังวลเลย</p>	<p>3.5.2 คุณจะทำอะไร เมื่อคุณถูกบอกให้ทำการตรวจฟังเสียงทรวงอกผู้ติดเชื้อเอชไอวี</p> <p><input type="radio"/> (ก) ฉันจะปฏิเสธ หรือพยายามหาคนอื่นทำแทน</p> <p><input type="radio"/> (ข) ฉันจะทำ แต่ฉันจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยให้มากที่สุด</p> <p><input type="radio"/> (ค) ฉันจะทำ แต่ทำโดยป้องกันเป็นพิเศษ มากกว่าการป้องกันตามปกติในการตรวจฟังเสียงทรวงอก</p> <p><input type="radio"/> (ง) ฉันจะทำเหมือนกับที่ฉันทำให้ผู้ป่วยรายอื่น ๆ</p>

<p>3.6 เจาะท้อง</p>	<p>3.6.1 คุณจะรู้สึกกังวลเพียงใด ในการทำ/ช่วย เจาะท้อง แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี</p> <p><input type="radio"/> (ก) กังวลมาก</p> <p><input type="radio"/> (ข) ค่อนข้างกังวล</p> <p><input type="radio"/> (ค) กังวลเล็กน้อย</p> <p><input type="radio"/> (ง) ไม่กังวลเลย</p>	<p>3.6.2 คุณจะอย่างไร เมื่อถูกบอกให้ทำ/ช่วย ในการเจาะท้อง แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี</p> <p><input type="radio"/> (ก) ฉันจะปฏิเสธ หรือพยายามหาคนอื่น ทำแทน</p> <p><input type="radio"/> (ข) ฉันจะทำ แต่ฉันจะหลีกเลี่ยงการสัมผัส ผู้ป่วยให้มากที่สุด</p> <p><input type="radio"/> (ค) ฉันจะทำ แต่ทำโดยป้องกันเป็นพิเศษ มากกว่าการป้องกันตามปกติในการ ทำ/ช่วยเจาะท้อง</p> <p><input type="radio"/> (ง) ฉันจะทำเหมือนกับที่ฉันทำให้ผู้ป่วย รายอื่น ๆ</p>
<p>3.7 วัดความดันโลหิต</p>	<p>3.7.1 คุณจะรู้สึกกังวลเพียงใด เมื่อคุณต้องวัด ความดันโลหิต แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี</p> <p><input type="radio"/> (ก) กังวลมาก</p> <p><input type="radio"/> (ข) ค่อนข้างกังวล</p> <p><input type="radio"/> (ค) กังวลเล็กน้อย</p> <p><input type="radio"/> (ง) ไม่กังวลเลย</p>	<p>3.7.2 คุณจะอย่างไร เมื่อถูกบอกให้ทำการ วัดความดันโลหิต แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี</p> <p><input type="radio"/> (ก) ฉันจะปฏิเสธ หรือพยายามหาคนอื่น ทำแทน</p> <p><input type="radio"/> (ข) ฉันจะทำ แต่ฉันจะหลีกเลี่ยงการสัมผัส ผู้ป่วยให้มากที่สุด</p> <p><input type="radio"/> (ค) ฉันจะทำ แต่ทำโดยป้องกันเป็นพิเศษ มากกว่าการป้องกันตามปกติในการ วัดความดันโลหิต</p> <p><input type="radio"/> (ง) ฉันจะทำเหมือนกับที่ฉันทำให้ผู้ป่วย รายอื่น ๆ</p>
<p>3.8 ฉีดยา</p>	<p>3.8.1 คุณจะรู้สึกกังวลเพียงใด เมื่อคุณต้องฉีด ยา แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี</p> <p><input type="radio"/> (ก) กังวลมาก</p> <p><input type="radio"/> (ข) ค่อนข้างกังวล</p> <p><input type="radio"/> (ค) กังวลเล็กน้อย</p> <p><input type="radio"/> (ง) ไม่กังวลเลย</p>	<p>3.8.2 คุณจะอย่างไร เมื่อถูกบอกให้ฉีดยา แก่ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี</p> <p><input type="radio"/> (ก) ฉันจะปฏิเสธ หรือพยายามหาคนอื่น ทำแทน</p> <p><input type="radio"/> (ข) ฉันจะทำ แต่ฉันจะหลีกเลี่ยงการสัมผัส ผู้ป่วยให้มากที่สุด</p> <p><input type="radio"/> (ค) ฉันจะทำ แต่ทำโดยป้องกันเป็นพิเศษ มากกว่าการป้องกันตามปกติในการ ฉีดยา</p> <p><input type="radio"/> (ง) ฉันจะทำเหมือนกับที่ฉันทำให้ผู้ป่วย รายอื่น ๆ</p>



<p>3.9 เจาะน้ำไขสันหลัง</p>	<p>3.9.1 คุณจะรู้สึกกังวลเพียงใด เมื่อคุณต้องทำ/ช่วยในการเจาะน้ำไขสันหลัง แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี</p> <p><input type="radio"/> (ก) กังวลมาก</p> <p><input type="radio"/> (ข) ค่อนข้างกังวล</p> <p><input type="radio"/> (ค) กังวลเล็กน้อย</p> <p><input type="radio"/> (ง) ไม่กังวลเลย</p>	<p>3.9.2 คุณจะอย่างไร เมื่อถูกบอกให้ทำ/ช่วยในการเจาะน้ำไขสันหลัง แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี</p> <p><input type="radio"/> (ก) ฉันจะปฏิเสธ หรือพยายามหาคนอื่นทำแทน</p> <p><input type="radio"/> (ข) ฉันจะทำ แต่ฉันจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยให้มากที่สุด</p> <p><input type="radio"/> (ค) ฉันจะทำ แต่ทำโดยป้องกันเป็นพิเศษมากกว่าการป้องกันตามปกติในการทำ/ช่วยในการเจาะน้ำไขสันหลัง</p> <p><input type="radio"/> (ง) ฉันจะทำเหมือนกับที่ฉันทำให้ผู้ป่วยรายอื่น ๆ</p>
<p>3.10 ใส่สายสวนปัสสาวะ</p>	<p>3.10.1 คุณจะรู้สึกกังวลเพียงใด เมื่อคุณต้องใส่สายสวนปัสสาวะ แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี</p> <p><input type="radio"/> (ก) กังวลมาก</p> <p><input type="radio"/> (ข) ค่อนข้างกังวล</p> <p><input type="radio"/> (ค) กังวลเล็กน้อย</p> <p><input type="radio"/> (ง) ไม่กังวลเลย</p>	<p>3.10.2 คุณจะอย่างไร เมื่อถูกบอกให้ทำการใส่สายสวนปัสสาวะ แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี</p> <p><input type="radio"/> (ก) ฉันจะปฏิเสธ หรือพยายามหาคนอื่นทำแทน</p> <p><input type="radio"/> (ข) ฉันจะทำ แต่ฉันจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยให้มากที่สุด</p> <p><input type="radio"/> (ค) ฉันจะทำ แต่ทำโดยป้องกันเป็นพิเศษมากกว่าการป้องกันตามปกติในการใส่สายสวนปัสสาวะ</p> <p><input type="radio"/> (ง) ฉันจะทำเหมือนกับที่ฉันทำให้ผู้ป่วยรายอื่น ๆ</p>

#### 4. บรรทัดฐานชุมชนวิชาชีพ (Professional Community Norms)

ข้อความต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและผู้ติดเชื้อเอชไอวี  
กรุณาอ่านและแสดงความคิดเห็น (ไม่มีคำตอบที่ ถูก หรือผิด)

		ไม่มี	บางคน	ส่วนใหญ่	ทั้งหมด
4.1	ในบรรดาเพื่อนร่วมงาน มีกี่คนที่จะใช้จานหรือแก้วน้ำ ร่วมกับ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
4.2	ในบรรดาเพื่อนร่วมงาน มีกี่คนที่จะรู้สึกสะอวใจ ที่จะให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทำอาหารให้พวกเขารับประทาน	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
4.3	ในบรรดาเพื่อนร่วมงาน มีกี่คนที่จะหลีกเลี่ยงการไปเยี่ยมบ้าน ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
4.4	ในบรรดาเพื่อนร่วมงาน มีกี่คนที่จะคิดว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเกิด จากการมีพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบหรือผิดศีลธรรม	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
4.5	ในบรรดาเพื่อนร่วมงาน มีกี่คนที่จะคิดว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีสมควร แล้วที่จะติดเชื้อนี้	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
4.6	ในบรรดาเพื่อนร่วมงาน มีกี่คนที่จะคิดว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีควร รู้สึกผิดกับการติดเชื้อของพวกเขา	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
4.7	ในบรรดาเพื่อนร่วมงาน มีกี่คนที่จะคิดว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีนำ ความอับอายมาสู่ครอบครัวของพวกเขา	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง

## 5. นโยบายด้านการดูแลสุขภาพ (Healthcare Policies)

คุณเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไรกับข้อความต่อไปนี้ (ไม่มีคำตอบที่ถูก หรือผิด)

		ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง	ไม่ค่อย เห็นด้วย	ค่อนข้าง เห็นด้วย	เห็นด้วย อย่างยิ่ง
5.1	บุคลากรทางการแพทย์ควรที่จะสามารถปฏิเสธการ ให้การรักษาแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
5.2	ผู้ติดเชื้อเอชไอวีควรมีสิทธิตัดสินใจ ที่จะเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง ต่อผู้ให้ การรักษาพยาบาล	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
5.3	นายจ้างไม่ควรที่จะสามารถเลิกจ้างลูกจ้างที่ติดเชื้อ เอชไอวี	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
5.4	<b>ผู้หญิง</b> ที่ติดเชื้อเอชไอวี <b>ไม่ควร</b> ได้รับอนุญาตให้ ทำการสมรส	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
5.5	<b>ผู้ชาย</b> ที่ติดเชื้อเอชไอวี <b>ไม่ควร</b> ได้รับอนุญาตให้ทำ การสมรส	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
5.6	เจ้าของบ้านเช่า <b>ไม่ควร</b> มีสิทธิที่จะปฏิเสธการเช่า ห้องจากผู้ติดเชื้อเอชไอวี	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
5.7	ผู้ชายที่ติดเชื้อเอชไอวีควรมีสิทธิตัดสินใจ ที่จะ เปิดเผยหรือไม่เปิดเผยการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง ต่อคู่สมรส	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
5.8	ผู้หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวีควรมีสิทธิตัดสินใจ ที่จะ เปิดเผยหรือไม่เปิดเผยการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง ต่อคู่สมรส	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
5.9	ผู้ที่มีอาชีพขายบริการทุกคนควรได้รับการตรวจหา เชื้อเอชไอวี	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
5.10	ผู้หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวีควรมีสิทธิที่จะมีบุตร	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
5.11	ผู้ติดเชื้อเอชไอวีควรมีสิทธิตัดสินใจ ที่จะเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยการติดเชื้อเอชไอวีของตนเองต่อ ครอบครัว (นอกเหนือจากคู่สมรส)	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง

		ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง	ไม่ค่อย เห็นด้วย	ค่อนข้าง เห็นด้วย	เห็นด้วย อย่างยิ่ง
5.12	เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีควรมีสถานที่ที่จะเข้าเรียนในโรงเรียน	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
5.13	ผู้ป่วยทุกคนที่ได้รับการผ่าตัดควรได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
5.14	บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ผ่าตัดควรได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีอย่างสม่ำเสมอ	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
5.15	ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีควรที่จะมีสัญญาณระบุถึงการติดเชื้อเอชไอวีบนแฟ้มข้อมูลทางการแพทย์ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
5.16	ผู้ป่วยรายอื่นมีสิทธิ์ที่จะรับทราบ หากมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีในหอผู้ป่วยเดียวกัน	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
5.17	ผู้ติดเชื้อเอชไอวีควรมีสถานที่ในการสมรสกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยกันเท่านั้น	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
5.18	การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีโดย <b>ไม่ได้รับการยินยอม</b> จากผู้ป่วย ถือเป็นเรื่องที่ยอมรับได้	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
5.19	โรงพยาบาลที่คุณฝึกปฏิบัติ มีเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอในการลดความเสี่ยงของคุณจากการติดเชื้อเอชไอวี	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
5.20	ผู้ติดเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่ <b>ไม่สนใจ</b> ว่าพวกเขาสามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
5.21	ผู้ติดเชื้อเอชไอวีควรละอายกับสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของพวกเขา	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
5.22	ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีเกิดจากการมีพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบหรือผิดศีลธรรม	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
5.23	ผู้หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวีควรได้รับอนุญาตให้มีบุตรได้หากพวกเขาต้องการ	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง

## 6. การดูแลประชากรกลุ่มต่างๆ (Caring for different populations)

6.1 คุณจะสะดวใจเพียงใดในการดูแลบุคคลตามภาพนี้ในโรงพยาบาล



- ☐ (ก) ไม่สะดวกใจมาก
- ☐ (ข) ค่อนข้างไม่สะดวกใจ
- ☐ (ค) ค่อนข้างสะดวกใจ
- ☐ (ง) สะดวกใจมาก

6.2 คุณจะสะดวใจเพียงใดในการดูแลบุคคลตามภาพนี้ในโรงพยาบาล



- ☐ (ก) ไม่สะดวกใจมาก
- ☐ (ข) ค่อนข้างไม่สะดวกใจ
- ☐ (ค) ค่อนข้างสะดวกใจ
- ☐ (ง) สะดวกใจมาก

6.3 คุณจะสะดวใจเพียงใดในการดูแลบุคคลตามภาพนี้ในโรงพยาบาล



- ☐ (ก) ไม่สะดวกใจมาก
- ☐ (ข) ค่อนข้างไม่สะดวกใจ
- ☐ (ค) ค่อนข้างสะดวกใจ
- ☐ (ง) สะดวกใจมาก

6.4 คุณจะสะดวใจเพียงใดในการดูแลบุคคลตามภาพนี้ในโรงพยาบาล



- ☐ (ก) ไม่สะดวกใจมาก
- ☐ (ข) ค่อนข้างไม่สะดวกใจ
- ☐ (ค) ค่อนข้างสะดวกใจ
- ☐ (ง) สะดวกใจมาก

6.5 คุณจะสะดวใจเพียงใดในการดูแลบุคคลตามภาพนี้ในโรงพยาบาล



- ☐ (ก) ไม่สะดวกใจมาก
- ☐ (ข) ค่อนข้างไม่สะดวกใจ
- ☐ (ค) ค่อนข้างสะดวกใจ
- ☐ (ง) สะดวกใจมาก

6.6 คุณจะสะดวใจเพียงใดในการดูแลบุคคลตามภาพนี้ในโรงพยาบาล



- ☐ (ก) ไม่สะดวกใจมาก
- ☐ (ข) ค่อนข้างไม่สะดวกใจ
- ☐ (ค) ค่อนข้างสะดวกใจ
- ☐ (ง) สะดวกใจมาก

6.7 คุณจะสะดวใจเพียงใดในการดูแลบุคคลตามภาพนี้ในโรงพยาบาล



- ☐ (ก) ไม่สะดวกใจมาก
- ☐ (ข) ค่อนข้างไม่สะดวกใจ
- ☐ (ค) ค่อนข้างสะดวกใจ
- ☐ (ง) สะดวกใจมาก

6.8 คุณจะสะดวใจเพียงใดในการดูแลบุคคลตามภาพนี้ในโรงพยาบาล



- ☐ (ก) ไม่สะดวกใจมาก
- ☐ (ข) ค่อนข้างไม่สะดวกใจ
- ☐ (ค) ค่อนข้างสะดวกใจ
- ☐ (ง) สะดวกใจมาก

## 7. การแพร่เชื้อเอชไอวี (HIV Transmission)

ข้อความต่อไปนี้ ถูก หรือ ผิด

		ถูก	ผิด
7.1	เชื้อเอชไอวี <b>ไม่น่าจะติดต่อ</b> ได้ หากใช้ถุงยางอนามัย ในการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อเอชไอวี	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข
7.2	เชื้อเอชไอวีสามารถติดต่อได้ หาก <b>ไม่</b> ใช้ถุงยางอนามัย ในการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อเอชไอวี	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข
7.3	เชื้อเอชไอวีสามารถติดต่อได้ จากการฉีดยาด้วยกระบอกฉีดและเข็มที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข
7.4	เชื้อเอชไอวีสามารถติดต่อได้ จากการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข
7.5	เชื้อเอชไอวีสามารถติดต่อได้ จากการใช้แก้วน้ำร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข
7.6	เชื้อเอชไอวีสามารถติดต่อได้ จากการใช้ห้องน้ำสาธารณะต่อจากผู้ติดเชื้อเอชไอวี	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข
7.7	เชื้อเอชไอวีสามารถติดต่อได้ จากการวัดความดันโลหิตให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีโดยไม่สวมถุงมือ	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข
7.8	เชื้อเอชไอวีสามารถติดต่อได้ จากการถูกเข็มหรือวัตถุที่มีคมที่เคยใช้กับผู้ติดเชื้อเอชไอวีบาด หรือทิ่มตำ	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข
7.9	เชื้อเอชไอวีสามารถติดต่อได้ จากการสัมผัสเลือดที่มีเชื้อเอชไอวีเข้าสู่ผิวหนังที่มีแผลเปิด	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข



## 8. ความรู้ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน (Standard Precautions Knowledge)

ข้อความต่อไปนี้ ถูก หรือผิด ตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน

		ถูก	ผิด
8.1	การล้างมือก่อนและหลังให้การรักษา/พยาบาลผู้ป่วย เป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข
8.2	การลดการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยการสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE) เป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข
8.3	การสวมใส่ <b>ถุงมือชั้นเดียว</b> ในการทำหัตถการที่ต้องมีการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วย เป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข
8.4	การสวมใส่ <b>ถุงมือสองชั้น</b> ในการทำหัตถการที่ต้องมีการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วย เป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข
8.5	การฆ่าเชื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์หลังใช้งาน เป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข
8.6	การใช้กระบอกฉีดและเข็มแบบใช้แล้วทิ้ง เป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข
8.7	การใช้ผงฟอกขาว/ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ เพื่อฆ่าเชื้อผ้าเปื้อนและขยะปนเปื้อนที่สัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วย เป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข
8.8	การทิ้งเครื่องมือ/อุปกรณ์และวัสดุมีคมลงในภาชนะที่จัดไว้โดยเฉพาะ เป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข
8.9	การแยกกำจัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์ออกจากขยะอื่น เป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข
8.10	การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์มีคมอย่างระมัดระวัง เป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข
8.11	การให้ผู้ป่วยทิ้งขยะติดเชื้อที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งของตนเอง เป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข

- 8.12 การที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องปฏิบัติตามการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน เมื่อสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วย เช่น เลือดของผู้ป่วยที่เป็น **โรคหัวใจ** มีความสำคัญเพียงใด
- ☐ (ก) สำคัญมาก
  - ☐ (ข) ค่อนข้างสำคัญ
  - ☐ (ค) ไม่ค่อยสำคัญ
  - ☐ (ง) ไม่สำคัญเลย
- 8.13 การที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องปฏิบัติตามการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน เมื่อสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วย เช่น เลือดของผู้ป่วยที่ **สงสัยว่าติดเชื้อ** มีความสำคัญเพียงใด
- ☐ (ก) สำคัญมาก
  - ☐ (ข) ค่อนข้างสำคัญ
  - ☐ (ค) ไม่ค่อยสำคัญ
  - ☐ (ง) ไม่สำคัญเลย
- 8.14 การที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องปฏิบัติตามการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน เมื่อสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่น เลือดของผู้ป่วยที่เป็น **โรคเบาหวาน** มีความสำคัญเพียงใด
- ☐ (ก) สำคัญมาก
  - ☐ (ข) ค่อนข้างสำคัญ
  - ☐ (ค) ไม่ค่อยสำคัญ
  - ☐ (ง) ไม่สำคัญเลย
- 8.15 การที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องปฏิบัติตามการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน เมื่อสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่น เลือดของผู้ป่วยที่ **ติดเชื้อเอชไอวี** มีความสำคัญเพียงใด
- ☐ (ก) สำคัญมาก
  - ☐ (ข) ค่อนข้างสำคัญ
  - ☐ (ค) ไม่ค่อยสำคัญ
  - ☐ (ง) ไม่สำคัญเลย
- 8.16 การที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องปฏิบัติตามการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน เมื่อสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่น เลือดของผู้ป่วยที่เป็น **วัณโรค** มีความสำคัญเพียงใด
- ☐ (ก) สำคัญมาก
  - ☐ (ข) ค่อนข้างสำคัญ
  - ☐ (ค) ไม่ค่อยสำคัญ
  - ☐ (ง) ไม่สำคัญเลย

## 9. มาตรการป้องกัน

(Protective measures)

เมื่อต้องดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี คุณมีความมั่นใจเพียงใดว่า มาตรการต่อไปนี้จะป้องกันคุณจากการติดเชื้อเอชไอวีได้

		ไม่มั่นใจ	ไม่ค่อยมั่นใจ	ค่อนข้างมั่นใจ	มั่นใจมาก
9.1	การล้างมือก่อนและหลังทำการตรวจร่างกายผู้ติดเชื้อเอชไอวี จะป้องกันคุณจากการติดเชื้อเอชไอวี	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
9.2	การสวมถุงมือชั้นเดียวเมื่อทำการเจาะเลือดผู้ติดเชื้อเอชไอวี จะป้องกันคุณจากการติดเชื้อเอชไอวี	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
9.3	การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อหลังการใช้งาน จะป้องกันคุณจากการติดเชื้อเอชไอวี	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
9.4	การใช้กระบอกฉีดและเข็มแบบใช้แล้วทิ้ง จะป้องกันคุณจากการติดเชื้อเอชไอวี	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
9.5	การทิ้งเครื่องมือ/อุปกรณ์และวัตถุมีคมลงในภาชนะที่จัดไว้เฉพาะ จะป้องกันคุณจากการติดเชื้อเอชไอวี	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
9.6	การแยกกำจัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์ออกจากขยะอื่น จะป้องกันคุณจากการติดเชื้อเอชไอวี	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
9.7	การใช้ยา PEP (Post Exposure Prophylaxis) หลังจากถูกเข็มที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งที่มด้า จะป้องกันคุณจากการติดเชื้อเอชไอวี	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง

## 10. ความมั่นใจในการปฏิบัติ (Confidence)

สถานการณ์ต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี **คุณมีความมั่นใจเพียงใดว่าคุณสามารถปฏิบัติพฤติกรรม เหล่านี้ได้**

		ทำได้ แน่นอน	คิดว่า ทำได้	คิดว่าทำ ไม่ได้	ทำไม่ได้ เลย
10.1	ฉันสามารถสังเกตได้ว่ามีผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของ ฉัน เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
10.2	ฉันสามารถบอก/คุยกับนักศึกษาคนอื่นๆได้ เมื่อพวกเขา แสดงความคิดเห็น ที่สื่อถึงการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอช ไอวี	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
10.3	ฉันสามารถสนทนากับผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้ โดยไม่รู้สึกลัว	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
10.4	ฉันสามารถรับฟังผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้ โดยไม่ตัดสินพวกเขา	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
10.5	ฉันสามารถสัมผัสผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่โรงพยาบาลได้ โดยไม่ กังวลว่าจะติดเชื้อ	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
10.6	ฉันสามารถเจาะเลือดผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้ โดยไม่ติดเชื้อ เอชไอวี	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง
10.7	ฉันสามารถทำแผลให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้ โดยไม่ติดเชื้อเอช ไอวี	<input type="radio"/> ก	<input type="radio"/> ข	<input type="radio"/> ค	<input type="radio"/> ง

**ขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่เข้าร่วมทำแบบประเมินครั้งนี้**