



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Московский государственный технический  
университет имени Н.Э. Баумана»  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

---

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

---

## Домашняя работа № 1

Дисциплина	Математическая статистика.
Студент	Сиденко А.Г.
Группа	ИУ7-63Б
Вариант	22
Оценка (баллы)	
Преподаватель	Власов П.А.

Москва, 2020 г.

# 1 Задача 1 (Предельные теоремы теории вероятностей)

## Условие

Известно, что 80% изготовленных заводом электроламп выдерживают гарантийный срок службы. Найти вероятность того, что в партии из 500 электроламп число выдержавших гарантийный срок службы находится в пределах от 380 до 420. Использовать неравенство Чебышева и интегральную теорему Муавра-Лапласа.

## Решение

1. С использованием неравенства Чебышева.

$$A = \{\text{Лампа выдержала гарантийный срок}\}$$

$$P(A) = 0.8$$

Так как отдельные испытания независимы, то значит испытания проводятся по схеме Бернулли  $n = 500$ , вероятность успеха  $p = 0.8$ .

Тогда

$$K_n - \text{число успехов в рассмотренной серии}$$

$$K_n \sim B(n, p)$$

$$MK_n = n \cdot p = 500 \cdot 0.8 = 400$$

$$DK_n = n \cdot q \cdot p = n \cdot (1 - p) \cdot p = 500 \cdot 0.2 \cdot 0.8 = 80$$

$$\begin{aligned} P\{380 \leq K_n \leq 420\} &= P\{380 - 400 \leq K_n - MK_n \leq 420 - 400\} = \\ &= P\{-20 \leq K_n - MK_n \leq 20\} = P\{|K_n - MK_n| \leq 20\} \geq 1 - \frac{DK_n}{\epsilon^2} = \\ &= 1 - \frac{80}{20 \cdot 20} = \frac{4}{5} = 0.8 \end{aligned}$$

2. С использованием теоремы Муавра-Лапласа.

$$\begin{aligned} P\{K_1 \leq K_n \leq K_2\} &\approx \Phi_0\left(\frac{K_2 - n \cdot p}{\sqrt{n \cdot p \cdot q}}\right) - \Phi_0\left(\frac{K_1 - n \cdot p}{\sqrt{n \cdot p \cdot q}}\right) = \Phi_0\left(\frac{420 - 500 \cdot 0.8}{\sqrt{500 \cdot 0.8 \cdot 0.2}}\right) - \\ &- \Phi_0\left(\frac{380 - 500 \cdot 0.8}{\sqrt{500 \cdot 0.8 \cdot 0.2}}\right) = 2 \cdot \Phi_0\left(\frac{20}{\sqrt{80}}\right) = 2 \cdot \Phi_0\left(\frac{20}{4\sqrt{5}}\right) = 2 \cdot \Phi_0(\sqrt{5}) = 2 \cdot 0.4861 = \\ &= 0.9722 \end{aligned}$$

**Ответ:**

1. С использованием неравенства Чебышева.  $P\{380 \leq K_n \leq 420\} \geq 0.8$
2. С использованием теоремы Муавра-Лапласа.  $P\{380 \leq K_n \leq 420\} = 0.9722$

## 2 Задача 2 (метод моментов)

**Условие**

С использованием метода моментов для случайной выборки  $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$  из генеральной совокупности  $X$  найти точечные оценки указанных параметров заданного закона распределения.

Закон распределения:

$$f_X(x) = \frac{1}{4^\Theta \Gamma(\Theta)} x^{\Theta-1} e^{-\frac{x}{4}}, x > 0$$

**Решение**

1. Неизвестный параметр:  $\Theta \Rightarrow r = 1$

Следовательно, найдем момент 1-ого порядка.

$$f_X(x) = \frac{1}{4^\Theta \Gamma(\Theta)} x^{\Theta-1} e^{-\frac{x}{4}} = \frac{\left(\frac{1}{4}\right)^\Theta x^{\Theta-1} e^{-\frac{1}{4} \cdot x}}{\Gamma(\Theta)}$$

$$\begin{aligned}
MX &= \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{x(\frac{1}{4})^\Theta x^{\Theta-1} e^{-\frac{1}{4}x}}{\Gamma(\Theta)} dx = \left| \begin{array}{l} \text{Замена:} \\ t = \frac{x}{4}, \quad dx = 4dt \\ x = 4t \end{array} \right| = \\
&= \int_0^{+\infty} \frac{(4t)^\Theta (\frac{1}{4})^\Theta e^{-t}}{\Gamma(\Theta)} 4dt = \frac{4}{\Gamma(\Theta)} \underbrace{\int_0^{+\infty} t^\Theta e^{-t} dt}_{\Gamma(\Theta+1)} = \frac{4\Gamma(\Theta+1)}{\Gamma(\Theta)} = \\
&= \left| \begin{array}{l} \text{По свойству} \\ \text{гамма-распределения} \end{array} \right| = \frac{4\Gamma(\Theta)\Theta}{\Gamma(\Theta)} = 4\Theta
\end{aligned}$$

2. Приравняв теоретические моменты к их выбранным аналогам, найдем неизвестный параметр

$$MX = \bar{x} = 4\Theta \Rightarrow \Theta = \frac{\bar{x}}{4}$$

**Ответ:**  $\Theta = \frac{\bar{x}}{4}$

### 3 Задача 3 (метод максимального правдоподобия)

#### Условие

С использованием метода максимального правдоподобия для случайной выборки  $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$  из генеральной совокупности  $X$  найти точечные оценки указанных параметров заданного закона распределения. Вычислить выборочные значения найденных оценок для выборки  $\vec{x}_5 = (x_1, \dots, x_5)$ .

Закон распределения:

$$f_X(x) = \frac{\Theta^5}{4!} x^4 e^{-\Theta x}, x > 0$$

Выборка  $\vec{x}_5 = (7, 4, 11, 5, 3)$

#### Решение

1.

$$\begin{aligned}
\alpha(x_1, \dots, x_n, \Theta) &= P\{X = x_1\} \cdot \dots \cdot P\{X = x_n\} = \frac{\Theta^5}{4!} x_1^4 e^{-\Theta x_1} \cdot \dots \cdot \frac{\Theta^5}{4!} x_n^4 e^{-\Theta x_n} = \\
&= \left( \frac{\Theta^5}{4!} \right)^n \cdot e^{-\Theta \sum_{i=1}^n x_i} \cdot (x_1^4 \cdot \dots \cdot x_n^4)
\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}\ln \alpha &= n \ln \frac{\Theta^5}{4!} - \Theta \sum_{i=1}^n x_i + \ln(x_1^4 \cdot \dots \cdot x_n^4) = \\ &= 5n \ln \Theta - n \ln 4! - \Theta \sum_{i=1}^n x_i + \ln(x_1^4 \cdot \dots \cdot x_n^4) \rightarrow \max\end{aligned}$$

3. Необходимое условие экстремума:

$$\frac{\partial \ln \alpha}{\partial \Theta} = - \sum_{i=1}^n x_i + \frac{5n}{\Theta}$$

$$\Theta = \frac{5n}{\sum_{i=1}^n x_i} = \frac{5}{\bar{x}}$$

$$\hat{\Theta} = \frac{5}{\bar{x}}$$

Достаточное условие экстремума:

$$\frac{\partial^2 \ln \alpha}{\partial \Theta^2} = - \frac{5n}{\Theta^2} \Big|_{\Theta=\hat{\Theta}=\frac{5}{\bar{x}}} = - \frac{5n\bar{x}^2}{25} = - \frac{n\bar{x}^2}{5} = \begin{vmatrix} \bar{x}^2 \geq 0 \\ n > 0 \end{vmatrix} \Rightarrow - \frac{n\bar{x}^2}{5} < 0 \Rightarrow$$

$\Theta = \hat{\Theta}$  – Точка максимума

4. Вычислим выборочные значения найденных оценок для выборки

$$\vec{x}_5 = (7, 4, 11, 5, 3).$$

$$\hat{\Theta} = \frac{5 \cdot 5}{x_1 + \dots + x_5} = \frac{25}{7 + 4 + 11 + 5 + 3} = \frac{25}{30} = \frac{5}{6}$$

**Ответ:**

1.  $\hat{\Theta} = \frac{5}{\bar{x}}$

2.  $\hat{\Theta} = \frac{5}{6}$

## 4 Задача 4 (доверительные интервалы)

### Условие

После  $n = 8$  измерений давления в баке с горючим получены следующие результаты: 3.25, 2.82, 3.07, 3.12, 2.93, 2.87, 3.09, 3.17. Считая ошибки измерений подчиненными нормальному закону, построить 90%-ные доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратичного отклонения давления в баке.

### Решение

### Ответ: