
PSYCHOÉDUCATION · TROUBLES ANXIEUX

Les médicaments de l'anxiété

L'essentiel à retenir de la séance, et des outils pour être acteur de son traitement.



Trois grandes familles de traitements

Anxiolytiques

Benzodiazépines, hydroxyzine, buspirone…

Ils soulagent vite, pour une durée courte.

Antidépresseurs

Sertraline, escitalopram, venlafaxine…

Un traitement de fond, qui agit en quelques semaines.

Autres

Bêta-bloquants, prégabaline…

Choisis selon les symptômes et la situation.

Les benzodiazépines : ce que je retiens


- Elles agissent **vite** : elles renforcent le « frein » du cerveau (le GABA).
- Avec le temps, le cerveau **s'habitue** : l'effet diminue.
- L'arrêt **se prépare dès le début**, et se fait **progressivement**, jamais d'un coup.
- Elles ne se ressemblent pas toutes : chacune a **son profil**.

12 **semaines maximum dans l'anxiété**

Alcool = danger
Il appuie sur le même frein. Les effets s'additionnent : somnolence, accidents, surdosage.

Les antidépresseurs : ce que je retiens

- Ils agissent sur les **messagers du cerveau** : sérotonine, noradrénaline, dopamine.
- Des **effets secondaires au début** ? J'en parle à mon médecin **avant d'arrêter**.
- Ça va mieux ? Je **continue** : l'arrêt se décide avec mon médecin.
- Il existe **plusieurs molécules** : le traitement s'ajuste à chacun.



L'effet arrive **en 2 à 4 semaines**. Si la dose augmente, il faut de nouveau patienter.

Les autres traitements en bref

Hydroxyzine
Effet calmant rapide. Plutôt pour un usage ponctuel.

Bêta-bloquants
Calment les signes physiques (cœur qui bat, tremblements), par exemple avant une prise de parole.

Buspirone
Agit en plusieurs semaines. Pas de dépendance.

Prégabaline
Vigilance : ordonnance sécurisée, risque de dépendance. Pas d'alcool.

Médicaments et psychothérapie ne s'opposent pas : les médicaments ne remplacent pas la psychothérapie, les deux se complètent.

Être acteur de mon traitement : 4 questions à me poser

- [ ] Est-ce que je sais pourquoi je prends ce traitement, et pour combien de temps ?
- [ ] Si je veux arrêter, en ai-je parlé avec mon médecin, ou est-ce que je le fais seul ?
- [ ] Si j'ai des effets secondaires au début, dois-je m'inquiéter ou attendre un peu ?
- [ ] Est-ce que je connais les autres options, si celle-ci ne me convient pas ?

Mon traitement (à remplir)

Médicament	Dose	Depuis le	À réévaluer le

Mes 3 réflexes

1. Je ne modifie et n'arrête jamais mon traitement seul.
2. Vigilance avec l'alcool et les psychotropes.
3. Je signale tout effet gênant à mon médecin ou à mon pharmacien.

Pour aller plus loin

psychotropes.fr
Une fiche par médicament, avec une partie « fiche patient ».

Revoir la séance
La présentation, en ligne.