

---

## Cours

---

### Équation différentiels partiels

**Enseignant :**  
M. François CASTELLA

**Étudiant :**  
Nathan HASCOET

5 février 2026

# Table des matières

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Dynamique de <math>N</math> particules en interaction</b> | <b>2</b>  |
| 1.1      | Formulation . . . . .                                        | 2         |
| 1.2      | Limite Faible Couplage . . . . .                             | 3         |
| 1.2.1    | Fonction de répartition . . . . .                            | 5         |
| 1.2.2    | Marginale de $f$ . . . . .                                   | 10        |
| 1.2.3    | Passage à la limite . . . . .                                | 12        |
| 1.3      | Limite Faible Densité . . . . .                              | 15        |
| <b>2</b> | <b>TD</b>                                                    | <b>19</b> |
| 2.1      | De 1.1 à 1.4 . . . . .                                       | 19        |


# 1 Dynamique de $N$ particules en interaction

## 1.1 Formulation


!  $N$  particules identiques, décrites classiquement par les équations de Newton !

On ne part pas des équations de Schrödinger.

Donnons nous la fonction  $F(x)$  qui est la force d'interaction entre 2 particule, c'est-à-dire :




### Exemple 1 (Attraction gravitationnelle)



$$\text{Force subie par la terre du fait du Soleil : } -G \frac{Mm}{\|x\|^2} \frac{x}{\|x\|} = -\frac{GMm}{\|T-S\|^3} (T-S).$$

$$\text{Force subie par le Soleil du fait de la Terre : } -G \frac{Mm}{\|x\|^2} \frac{x}{\|x\|} = -\frac{GMm}{\|T-S\|^3} (T-S).$$



On a (Newton) :  $\underbrace{\text{masse}}_{= 1, \text{ par soucis de normalisation}} \times \text{accélération} = \text{force pour toutes les particules}$

$$\text{particule } 1 : \begin{cases} \frac{d^2x}{dt^2}(t) = T(x_1(t) - x_2(t)) + F(x_1(t) - x_3(t)) + \dots + F(x_1(t) - x_N(t)) \\ \vdots \\ \frac{d^2x_N}{dt^2}(t) = F(x_N(t) - x_1(t)) + F(x_N(t) - x_2(t)) + \dots + F(x_N(t) - x_{N-1}(t)) \end{cases}$$

Soit :

$$\left\{ \begin{array}{l} \forall i = 1, \dots, N, \frac{d^2 x_i(t)}{dt^2} = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N F(x_i(t) - x_j(t)) \\ \oplus \text{ données initiales à } t = 0 \\ x_1(0) = x_1^0, \dots, x_N(0) = x_N^0(0) \\ v_1(0) = v_1^0, \dots, v_N(0) = v_N^0(0) \end{array} \right.$$

avec  $x_1^0, \dots, x_N^0$ , positions initiales, données, chacune dans  $\mathbb{R}^3$

$v_1^0, \dots, v_N^0$ , vitesses initiales, données, chacune dans  $\mathbb{R}^3$

→ EDO d'ordre 2, en dimension  $3N$ , avec typiquement,  $N \simeq$  nombre d'Avogadro  $\simeq 10^{23}$ .

**Calcul effectif inatteignable.**

Cauchy-Lipschitz affirme que ce système admet une solution unique : d'où,  $x_1(t), v_1(t)$ , etc. sont entièrement déterminés par les données initiales.

**Question :** Que se passe-t'il lorsque  $N \rightarrow +\infty$  ?

On a ici 2 limites naturelles :


1. limite faible couplage (weak coupling limit) : hard sphere (sphère dure)

Cas où les valeurs physiques font que  $F$  est de l'ordre de  $\frac{1}{N}$ , dans les unités physiquement pertinentes.

On part alors de  $\frac{d^2 x_i}{dt^2}(t) = \frac{1}{N} \sum_{j \neq i} F(x_i(t) - x_j(t))$  et on passe à la limite  $N \rightarrow \infty$

2. limite faible densité (low density limit) :

exemple typique de boule de billard de rayon  $\epsilon$ .



On assure  $N\epsilon^2 = 1$  ( $N\epsilon^2$  = sommes de valeurs explorées par chaque particule), ceci assure (à vue de nez au moins) que en temps 1 on a de l'ordre 1 collision.

→ Dans ce régime de convergence, on a convergence, lorsque  $N \rightarrow +\infty$  vers l'équation de Boltzmann.

## 1.2 Limite Faible Couplage

On part de Newton.

$$\frac{d^2 x_i}{dt^2}(t) = \sum_{j=1}^F (x_i(t) - x_j(t)) \text{ pour } i = 1, \dots, N \text{ et } F \text{ connue, avec par exemple : } F(x) = -Gm^2 \frac{x}{\|x\|^3},$$

avec  $x_i(0) = x_i^0$  connue.

**Soit  $T$  l'ordre de grandeur de l'échelle temporelle**

$v_i(0) = v_i^0$  connue.

**$X$  l'ordre de grandeur de l'échelle spatiale** (si le travail a été bien fait).

les  $v_i^0$  et les  $v_i(t)$  vont demeurer de l'ordre de  $\frac{X}{T}$ .

Soit  $\mathcal{F}$  l'ordre de grandeur de  $F$ .

Introduisons la notation suivante :

$$X_N(t) = (x_1(t), \dots, x_N(t)) \in \mathbb{R}^{3 \times N}, X_N^0 = (x_1^0, \dots, x_N^0).$$

$$V_N(t) = (v_1(t), \dots, v_N(t)) \in \mathbb{R}^{3 \times N}, V_N^0 = (v_1^0, \dots, v_N^0).$$

$$z_i(t) = (x_i(t), v_i(t)) \in \mathbb{R}^6 \text{ (variable de l'espace des phases).}$$

$$z_i^0 = (x_i^0, v_i^0).$$

$$Z_N(t) = (z_1(t), \dots, z_N(t)) \in \mathbb{R}^{6 \times N}, Z_N^0 = (z_1^0, \dots, z_N^0)$$

Avec ces notations, les équations de Newton s'écrivent :

$$\begin{cases} m \frac{d^2 X_N}{dt^2}(t) = f(X_N(t)) \text{ où } f : \alpha \mapsto \left( \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^N F(\alpha_1 - \alpha_j), \dots, \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq N}}^N F(\alpha_N - \alpha_j) \right) \\ X_N(0) = X_N^0, V_N(0) = V_N^0 \end{cases}$$

Adimensionnons ce système : Posons  $t = T\tilde{t}$  où  $\tilde{t}$  est d'ordre 1 et  $\tilde{t}$  est sans dimension.

$$x_i(t) = X_i(\tilde{t}) = X_i\left(\frac{t}{T}\right)$$

De manière équivalente, on pose :  $x_n(T) := x\tilde{X}_N\left(\frac{t}{T}\right)$ .

$$\tilde{X}_N(\mathcal{F}) = \frac{X_N(T\mathcal{F})}{X}$$

$$\text{Soit } \tilde{V}_N(\mathcal{F}) := \frac{d\tilde{X}_N(t)}{d\tilde{t}} = \frac{T}{X} V_N(T\mathcal{F})$$

$$\begin{aligned} \text{Enfin, pour ce qui concerne le champ de force, on définit : } \tilde{f}(\tilde{\alpha}) &= \frac{f(X\tilde{\alpha})}{\mathcal{F}} \\ &= \left( \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq 1}}^N \frac{F(X(\tilde{\alpha}_i - \tilde{\alpha}_j))}{\mathcal{F}}, \dots \right) \end{aligned}$$

Ainsi partant de :

$$m \frac{d^2 X_N(t)}{dt^2} = f(X_N(t))$$

On obtient, pour  $\tilde{X}(\tilde{t}) = \frac{X_N(T\mathcal{F})}{X}$ , la relation :

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \tilde{X}_N(t)}{d\tilde{t}^2} &= \frac{T^2}{X} (T\mathcal{F}) \\ &= \frac{T^2}{X} \frac{1}{m} f(X_N(T\mathcal{F})) \\ &= \frac{T^2 \mathcal{F}}{Xm} \tilde{f}(\tilde{X}_N(\mathcal{F})) \end{aligned}$$

$$\text{c'est-à-dire : } \frac{d^2 \tilde{X}_N(\tilde{t})}{d\tilde{t}^2} = \frac{T^2 \mathcal{F}}{Xm} \tilde{f}(\tilde{X}_N)$$

$$\boxed{+} \quad \tilde{X}_N(0) = \tilde{X}_N^0, \tilde{V}_N(0) = \tilde{V}_N^0 \quad \boxed{+} \quad \tilde{f}(\tilde{\alpha}) = \left( \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^N \frac{F(X(\tilde{\alpha}_1 - \tilde{\alpha}_j))}{\mathcal{F}}, \dots \right)$$

Nous faisons désormais l'hypothèse que  $\frac{T^2 \mathcal{F}}{X_m}$  est de l'ordre de  $\frac{1}{N}$ .

Partons des équations de Newton adimensionnées (en laissant tomber les tildes).

$$\frac{d^2 X_N}{dt^2}(t) = \frac{1}{N} G(X_N(t))$$

où  $G : \alpha \in \mathbb{R}^{3 \times N} \mapsto G(\alpha) = \left( \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^N F(x_1 - x_j), \dots, \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq N}}^N F(\alpha_N - \alpha_j) \right)$

et  $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  de classe  $\mathcal{C}^k$  avec  $k \geq 1$ .

On souhaite procéder à la limite  $N \rightarrow \infty$  dans ces équations (EDO en dimension  $3 \times$  (gros problème topologique, non linéaires)).

### 1.2.1 Fonction de répartition

**Idée profonde :** au lieu de se donner un jeu de données inutiles dans notre équation de Newton, on se donne une fonction  $f^0(x_1^0, v_1^0, x_2^0, v_2^0, \dots, x_N^0, v_N^0)$ , dite fonction de répartition (ou fonction de densité) qui permet de dire :

$$\mathbb{P} \left( x_1^0 \in \Omega_1, v_1^0 \in O_1, \dots, x_N^0 \in \Omega_N, v_N^0 \in O_N \right) = \int_{\Omega_1 \times O_1 \times \dots \times \Omega_N \times O_N} f^0(x_1^0, v_1^0, \dots, x_N^0, v_N^0) dx_1^0 dv_1^0 \dots dx_N^0 dv_N^0$$

Affirmation :

La fonction de répartition  $f(t, x_1, t_1, \dots, x_N, t_N)$  et le flot des équations de Newton :  
 $(X_1(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), V_1(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), \dots, X_N(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), V_N(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0))$

Vérifie :

$$\begin{aligned} f(t, X_1(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), V_1(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), \dots, X_N(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), V_N(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0)) \\ = \\ f^0(x_1^0, v_1^0, \dots, x_N^0, v_N^0) \end{aligned}$$

**Notation :**  $N$  particules

$$\left( \overbrace{X_1(t, 0, \dots), V_1(t, 0, \dots)}^{\text{flot}}, \dots, X_n(t, 0, \dots), V_N(t, 0, \overbrace{x_1^0, v_1^0}^{=z_1^0 \in \mathbb{R}^6}, \dots, \overbrace{x_N^0, v_N^0}^{=z_N^0 \in \mathbb{R}^6}) \right) = Z_N(t, 0, Z_N^0)$$

,où  $Z_n^0 = (z_1^0, \dots, z_N^0) \in \mathbb{R}^{6N}$ .

Et  $Z_N(t, 0, Z_N^0)$  est le flot des équations de Newtons que nous considérons.

**Reformulation :** Nous avons introduit la répartition initiales des particules :

$$f^0(x_1^0, v_1^0, \dots, x_N^0, v_N^0) = f^0(Z_N^0)$$

et la répartition à l'instant  $t$  associée  $f(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) = f(t, Z_N^0)$

$$f(t, Z_N(t, 0, Z_N^0)) = f^0(Z_N^0)$$

Affirmation :




En effet :  $Z_N^0 \in \Omega \iff Z_N(t, 0, Z_N^0) \in Z_N(t, 0, \Omega)$  car le flot :  
est, par exemple,  $f^0(\alpha) = 1_\Omega(\alpha)$  pour un certain ouvert  $\Omega \subset \mathbb{R}^{6N}$ .

$$\alpha \mapsto Z_N(t, 0, \alpha)$$

est une bijection

et dire que le système, à l'instant  $t$ , est dans  $\Omega_t$  est équivalent à dire que le système est dans  $\Omega$  à l'instant 0.




Soit  $f^0(\alpha) = 1 \iff f(t, Z_N(t, 0, \alpha)) = 1$ .  
c'est-à-dire  $\forall \alpha \in \mathbb{R}^{6N}$   
 $f(t, Z_N(t, 0, \alpha)) = f^0(\alpha)$

**NB :** mathématiquement à l'horizon :  $f^0(\alpha), f(t, \alpha) \in L^1(\mathbb{R}^{6N}, l\alpha)$  ou  $\in L^1 \cap L^\infty$

**Petit Calcul :** Soit l'EDO  $x'(t) = g(x(t))$  où  $g$  est donnée, par exemple, par :  $g(\alpha) = \alpha(1 - \alpha)$  ;  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

→ Son flot est noté  $X(t, 0, x_0)$ . On se donne une répartition :  $f^0(x_0)$



et on se donne une fonction  $f(t, x)$  qui vérifie  $f(t, X(t, 0, x_0)) = f^0(x_0)$

$$\text{Or : } \frac{d}{dt} f(t, X(t, 0, x_0)) \stackrel{\text{chain rule}}{=} 1 \left( \frac{\partial f}{\partial t} \right) (t, X(t, 0, x_0)) + \underbrace{\left( \frac{dX(t, 0, x_0)}{dt} \right)}_{=g(X(t, 0, x_0))} \cdot \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right) (t, X(t, 0, x_0))$$

$$\stackrel{EDO}{=} \left( \frac{\partial f}{\partial t} \right) (t, X(t, 0, x_0)) + g(X(t, 0, x_0)) \cdot \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right) (t, X(t, 0, x_0))$$

$$\stackrel{\text{rappel}}{=} 0$$

**Conclusion :**  $\forall t, x$

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, x) + g(x) \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) = \left( \frac{\partial f}{\partial t} + g \frac{\partial f}{\partial x} \right) (t, \underbrace{X(t, 0, \overbrace{X(0, t, x)}^{(det) = x_0})}_{\text{(rel de groupe pour le flot)}}) = 0$$

**Conclusion :** l'EDO  $x'(t) = g(x(t))$  se traduit, pour la fonction  $f$ , transposée par le flot grâce à :




$$f(t, X(t, 0, x_0)) = f^0(x_0) \text{ , par l'EDP}$$

(Dites du transport)

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) + g(x) \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) = 0 \\ f(t = 0, x) = f^0(x) \end{cases}$$

**Exemple 2** ( $g(\alpha) = 1$ )

$$\boxed{g(\alpha) = 1} \left\{ \begin{array}{l} \text{EDO : } \begin{cases} x'(t) = 1 \\ x(0) = x_0 \end{cases} \quad d'où \ X(t, 0, x_0) = x_0 + t \\ \text{EDP } \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) + \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) = 0 \\ f(t = 0, x) = f^0(x) \end{cases} \quad \rightarrow f(t, x) = f^0(x - t) \end{array} \right.$$



**Exemple 3** ( $g(\alpha) = \alpha(1 - \alpha)$ )

L'équation de transport :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) + g(x) \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) = 0 \\ f(t = 0, x) = f^0(x) \end{cases}$$

ici, dans notre exemple on a donc l'EDO :

$$x'(t) = x(t)(1 - x(t))$$

se trouve transformée en l'EDP :

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, x) + x(1 - x) \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) = 0$$



Extension de ce propos en dimension supérieure.

Soit l'EDO dans  $\mathbb{R}^d$  :  $\begin{cases} x'(t) = g(t, x(t)) \\ x(0) = x_0 \in \mathbb{R}^d \end{cases}$ , où  $g : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$  est donnée.  
 $(t, \alpha) \mapsto g(t, \alpha)$

**Exemple 4 (Newton)** On considère :

$$\begin{cases} X'(t) = V(t) \\ V'(t) = G(t, X(t)) \\ X(0) = x_0, V(0) = v_0 \end{cases}$$

, où  $G : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ . Soit  $f^0 : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$  (ou  $\mathbb{R}_+$ ).  
 $(t, \alpha) \mapsto G(t, \alpha)$

On définit  $f(t, x)$  à travers :

$$(2) f(t, X(t, 0, x)) = f^0(x)$$

Dérivons (2) par rapport à  $t$  :

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{dt}(f^0(x)) = \frac{d}{dt}(f(t, \underbrace{X(t, 0, x)}_{=(X_1(t, 0, x), \dots, X_d(t, 0, x)) \in \mathbb{R}^d})) \\ &= 1 \left( \frac{\partial f}{\partial t} \right) (t, X(t, 0, x)) + \frac{dX_1}{dt} \cdot \left( \frac{\partial f}{\partial x_1} \right) (t, X(t, 0, x)) + \dots + \frac{dX_d}{dt}(t, 0, x) \cdot \left( \frac{\partial f}{\partial x_1} \right) (t, X(t, 0, x)) \\ &= \left( \frac{\partial f}{\partial t} \right) (t, X(t, 0, x)) + g_1(t, X(t, 0, x)) \cdot \left( \frac{\partial f}{\partial x_1} \right) (t, X(t, 0, x)) + \dots + g_d(t, X(t, 0, x)) \left( \frac{\partial f}{\partial x_d} \right) (t, X(t, 0, x)) \\ &= \left( \frac{\partial f}{\partial t} \right) (t, X(t, 0, x)) + \underbrace{\sum_{i=1}^d g_i(t, X(t, 0, x)) \cdot \left( \frac{\partial f}{\partial x_i} \right) (t, X(t, 0, x))}_{=g(t, X(t, 0, x)) \cdot \nabla_x f(t, X(t, 0, x))} \\ &= \frac{\partial f}{\partial t}(t, X(t, 0, x)) + g(t, X(t, 0, x)) \cdot (\nabla_x f)(t, X(t, 0, x)) \end{aligned}$$

**Conclusion :**  $\forall t, \forall x$

$$0 = \left( \frac{\partial f}{\partial t}(t, z) + g(t, z) \nabla_z f(t, z) \right) (t, z = X(t, 0, x))$$

Soit  $(t, x)$  fixé. Posons :  $z = X(t, 0, x)$  (  $\Longleftrightarrow x = X(0, t, z)$  )

On a par (3) :

$$\forall t, \forall z, \frac{\partial f}{\partial t}(t, z) + g(t, z) \cdot (\nabla_x f)(t, z) = 0$$

Pour recoller tout cela nous avons montré :

**Théorème 1 (Méthode des caractéristiques)**

Soit l'EDO  $x'(t) = g(t, x(t))$  de flot  $X(t, 0, x)$ .

Soit  $f(t, x)$  satisfaisant :  $f(t, X(t, 0, x)) = f^0(X)$ .

On a :

$$\begin{cases} \forall t, \forall x, \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) + f(t, x) \cdot \nabla_x f(t, x) = 0 \\ \forall x, f(t = 0, x) = f^0(x) \end{cases}$$

Dans le cas de Newton, tout cela donne :

$$f^0(x, v) = f(t, X(t, 0, v), V(t, 0, x, v))$$

$$\begin{aligned} \implies 0 &= \frac{d}{dt}(f^0(x, v)) \\ &= \left( \frac{\partial f}{\partial t} \right)(t, \dots) + V(t, 0, x, v) \cdot (\nabla_x f)(t, \dots) + G(t, X(t, 0, x, v)) \cdot (\nabla_v f)(t, \dots) \end{aligned}$$

A la fin on obtient :

$$\forall t, \forall x, \forall v, \frac{\partial f}{\partial t}(t, x, v) + v \cdot \nabla_x f(t, x, v) + G(t, x) \cdot \nabla_v f(t, x, v) \quad (4)$$

Ici nous disons que l'EDP provient de l'EDO :  $\begin{cases} X'(t) = V(t) \\ V'(t) = G(t, X(t)) \end{cases}$

avec  $z = (x_1, v_1, \dots, x_N, v_N)$ .

$$X_i(t = 0, 0, z) = x_i$$

$$V_i(t = 0, 0, z) = v_i$$

On a déjà vu que, si  $f(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N)$  = la densité de particule à l'instant  $t$  en  $(x_1, v_1, \dots, x_N, v_N)$

qui  $f(t, X_1(t, 0, z), V_1(t, 0, z), \dots, X_d(t, 0, z), V_d(t, 0, z)) = f^0(z)$ , où  $f^0$  = la densité de particules à l'instant 0. Nous en déduisons que  $f(z)$  vérifie l'EDP de transport :

$$f(t = 0, z) = f^0(z) \text{ (donnée de l'équation de transport)}$$

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, x_1, v_1, \dots, v_N, v_N) + \sum_{k=1}^N v_k \cdot \nabla_{x_k} f + \sum_{k=1}^N \left[ \frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^N F(x_k - x_j) \right] \cdot \nabla_{v_k} f = 0$$

→ EDP linéaire d'inconnue  $f(t, z)$ .

avec, typiquement,  $f(t, z) \in C^1(t \in \mathbb{R}, L^1(\mathbb{R}^{6N}))$

### 1.2.2 Marginale de $f$

**Idée :** introduire les marginales de  $f$ , définies par :

$$f_N^1(t, x_1, v_1) = \int_{\mathbb{R}^6 \times \mathbb{R}^6 \times \dots \times \mathbb{R}^6} f(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) dx_2 dv_2 \cdots dx_N dv_N$$

$\vdots$

$$f_N^k(t, x_1, v_1, \dots, x_k, v_k) = \int_{\mathbb{R}^{6(N-k)}} f(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) dx_k dv_k \cdots dx_N dv_N$$

$\vdots$

Il est naturel d'affirmer que chaque fonction  $f_N^K$  possède une limite (faible)  $f^k$  lorsque  $N \rightarrow \infty$ . Pour calculer la limite de  $f_N^k$  pour chaque  $k = 1, \dots, N$ , écrivons l'EDP satisfaisant pour chacune de ces fonctions. Pour ce faire, supposons que pour toute *permutation*  $\sigma \in \mathcal{S}_N$  :

$$f^0(x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) = f^0(x_{\sigma(1)}, v_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(N)}, v_{\sigma(N)}) \quad (1)$$

→ les particules sont interchangeables.

Les numéros des particules sont interchangeable initialement à  $t = 0$ .

$$f^0(x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) = g^0(x_1, v_1) \cdots g^0(x_N, v_N) \quad (2)$$

pour une certaine fonction  $g^0$  (on suppose que les particules sont initialement réparties indépendamment et selon la même loi).

**Théorème 2 (Admis à ce stade)** *Sous l'hypothèse de l'équation (1),  $\forall t$  :*

$$f(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) = f(t, x_{\sigma(1)}, v_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(N)}, v_{\sigma(N)})$$

*La propriété d'interchangeabilité est conservée avec le temps.*

Fort de cette information écrivons l'équation satisfaite par  $f_N^1$ , on part de :

$$\underbrace{\frac{\partial f}{\partial t}(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N)}_{(1)} + \underbrace{\sum_{k=1}^N v_k \cdot \nabla_{x_k} f}_{(2)} + \underbrace{\sum_{k=1}^N \left[ \frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^N F(x_k - x_j) \right] \cdot \nabla_{v_k} f}_{(3)} = 0$$

On observe que :

$$\begin{aligned}
(1) \quad \frac{\partial}{\partial t} f_N^1(t, x_1, v_1) &= \frac{\partial}{\partial t} \int f(t, \dots) dx_2 dv_2 \dots dx_N dv_N \\
&= \int \frac{\partial f}{\partial t}(t, \dots) dx_2 dv_2 \dots dx_N dv_N \\
(2) \quad (k=1), \quad \int v_1 \cdot \nabla_{x_1} f(t, \dots) dx_2 dv_2 \dots dx_N dv_N &= v_1 \cdot \nabla_{x_1} \left[ \int f(t, \dots) dx_1 \dots dv_N \right] = v_1 \cdot \nabla_{x_1} f_N^1 \\
(k \neq 1), \quad \int v_k \cdot \nabla_{x_k} f(t, \dots) dx_2 dv_2 \dots dx_N dv_N &= - \int f(t, \dots) \operatorname{div}_{x_1}(v_k) dx_2 \dots dv_N = 0
\end{aligned}$$

Rappel :  $\int_{\mathbb{R}^d} u(y) \cdot \nabla_y \phi(y) dy = - \int \phi(y) \operatorname{div}_y(u(y)) dy$

$$\begin{aligned}
(3) \quad (k=1), \quad \int \frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^N F(x_1 - x_j) \cdot \nabla_{v_1} f dx_1 \dots dv_N \\
&= \frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^N \int F(x_1 - x_j) \cdot \nabla_{v_1} f(t, \dots) \\
&= \frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^N \int F(x_1 - x_j) \nabla_{v_1} f(t, x_1, v_1, x_j, v_j, \dots, x_2, v_2, \dots, x_N, v_N) \\
&= \frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^N \underbrace{\int F(x_1 - x_j) \cdot \nabla_{v_1} f(t, x_1, v_1, \dots)}_{\text{pas d'indice j!}} \\
&= \frac{N-1}{N} \int F(x_1 - x_2) \cdot \nabla_{v_1} f(t, \dots) dx_2 \dots dv_N \\
&= \frac{N-1}{N} \int F(x_1 - x_2) \nabla_{v_1} f(t, \dots) dx_3 \dots dv_N dx_2 dv_2 \\
&= \frac{N-1}{N} \int F(x_1 - x_2) \cdot \nabla_{v_1} \int f_N^2(t, \dots) dx_2 dv_2 \\
(k \neq 1), \quad \frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^N F(x_k - x_j) \nabla_{v_k} f(t, x_1, \dots, x_N) \\
&\stackrel{IPP}{=} \frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^N - \underbrace{\int \operatorname{div}_{v_j}(F(x_k - x_j)) \cdot f(t, \dots) dx_2 \dots dv_N}_{=0}
\end{aligned}$$

C'est-à-dire, on a :  $\frac{\partial}{\partial t} f_N^1(t, x_1, v_1) + v_1 \cdot \nabla_{x_1} f_N^1 + \frac{N-1}{N} \int F(x_1 - x_2) \cdot \nabla_{v_1} f_N^2(t, x_1, v_1, \dots) dx_2 dv_2 = 0$ .

De même :

$$\begin{aligned}
0 &= \frac{\partial}{\partial t} f_N^2(t, x_1, v_1, x_2, v_2) + v_1 \cdot \nabla_{x_1} f_N^2 + v_2 \cdot \nabla_{x_2} f_N^2 \\
&\quad + \frac{N-2}{N} \int F(x_1 - x_4) \nabla_{v_1} f_N^3(\dots) dx_4 dv_3 + \frac{N-2}{N} \int F(x_2 - x_3) \nabla_{v_2} f_N^3(\dots) dx_4 dv_3 \\
&\quad + \frac{1}{N} F(x_1 - x_2) \nabla_{v_2} f_N^2 + \frac{1}{N} F(x_2 - x_1) \nabla_{v_1} f_N^2
\end{aligned}$$

On récupère ainsi une famille d'équation de transport de la forme :  $\frac{\partial}{\partial t} f_N^1 = \dots f_N^2 \dots$

$$\frac{\partial}{\partial t} f_N^2 = \dots f_N^3 \dots$$

$\vdots$

$$\frac{\partial}{\partial t} f_N^k = \dots f_N^{k+1} \dots$$

### 1.2.3 Passage à la limite

On a vu que les marginales  $f_N^k(t, x_1, v_1, \dots, x_k, v_k)$  vérifient :

$$\frac{\partial f_N^1}{\partial t}(t, x_1, v_1) + v_1 \cdot \nabla_{x_1} f_N^1 + \frac{N-1}{N} \int F(x_1 - x_2) \nabla_{v_1} f_N^2(t, x_1, v_1, x_2, v_2) = 0$$

$$\frac{\partial f_N^2}{\partial t} + v_1 \nabla_{x_2} f_N^2 + \frac{N-2}{N} \left[ \int F(x_1 - x_3) \nabla_{v_1} f_N^3 + F(x_2 - x_3) \nabla_{v_2} f_N^3 \right] + \frac{1}{N} \nabla_{v_1} f_N^2 + \frac{1}{N} F(x_2 - x_1) \cdot \nabla_{v_2} f_N^2 = 0$$

Quand  $N \rightarrow \infty$  :

1. Chaque suite de fonction  $f_N^k$  possède naturellement une limite (faible, au sens des distributions), lorsque  $N \rightarrow \infty$ , notée  $f^k$ .
2. On saura donc passer à la limite (faible) dans les EDP linéaires satisfaites par les  $f_N^k$ .

A la limite on a :

$$(S) \begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} f^1(t, x_1, v_1) + v_1 \cdot \nabla_{x_1} f^1 + \int_{\mathbb{R}^6} F(x_1 - x_2) \cdot \nabla_{v_1} f^2(t, x_1, v_1, x_2, v_2) dx_2 dv_2 = 0 \\ \frac{\partial}{\partial t} f^2(t, x_1, v_1, x_2, v_2) + v_1 \nabla_{x_1} f^2 + v_2 \nabla_{x_2} f^2 + \int \left[ F(x_1 - x_3) \cdot \nabla_{v_1} f^3 + F(x_2 - x_3) \nabla_{v_2} f^3 \right] dx_3 v_3 = 0 \end{cases}$$

❗ le terme d'**autointeraction** disparaît ❗

Nous avons supposé  $f^0(x, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) = g^0(x_1, v_1) \times \dots \times g^0(x_N, v_N)$  (indépendance des particules).

D'où :  $f^1(t=0, x_1, v_1) = g^0(x_1, v_1)$

$f^2(t, x_1, v_1, x_2, v_2) = g^0(x_1, v_1) g^0(x_2, v_2)$

etc.

**Si** l'indépendance initiale des particules demeure vraie aux instants  $t > 0$  ultérieure, ainsi que l'hypothèse de distribution identique,

**Alors**  $f^2(t, x_1, v_1, x_2, v_2) = f^1(t, x_1, v_1) \times f^1(t, x_2, v_2)$  et  $\forall k, f^k(t, x_1, v_1, \dots, x_k, v_k) = f^1(t, x_1, v_1) \times \dots \times f^1(t, x_k, v_k)$ .

Ainsi nécessairement, l'eq sur  $f^1$  devient :

$$\frac{\partial f^1}{\partial t}(t, x_1, v_1) + v_1 \nabla_{x_1} f^1 + \int_{\mathbb{R}^6} F(x_1 - x_2) \nabla_{v_1} \left[ f^1(t, x_1, v_1) f^1(t, x_2, v_2) \right] = 0 \quad (\text{Vlasov})$$

Ce qui nous donne une équation sur  $f^1$ .

Ainsi prouver que l'équation de Vlasov sur  $f^1$  nous donne une unique solution  $f^1(t, x_1, v_1)$  (ok, admis), on connaît  $f^1$ , mais  $f^2, \dots, f^k, \dots$  : On connaît la limite des  $f_N^k, \forall k$ .

Ayant ainsi défini  $f^k$  comme  $f^1(t, x_1, v_1) \times \dots \times f^1(t, x_k, v_k)$  vérifiant, réciproquement, que ce choix de  $f^k$  vérifie (S).

l'Equation sur  $f^1$  en posant  $f^1$  solution de Vlasov et  $f^2 = f^1(t, x_1, v_1) \times f^1(t, x_2, v_2)$

$$\begin{aligned} & \frac{\partial f^1}{\partial t}(t, x_1, v_1) + v_1 \nabla_{x_1} f^1 + \int F(x_1 - x_2) \cdot \nabla_{v_1} f^2(t, x_1, v_1, x_2, v_2) dx_2 dv_2 \\ &= \frac{\partial f^1}{\partial t} + v_1 \nabla_{x_1} f^1 + \int F(x_1 - x_2) \nabla_{v_1} f^1(t, x_1, v_1) f^1(t, x_2, v_2) dx_2 dv_2 \\ &= 0 \quad (\text{par Vlasov}) \end{aligned}$$

l'Equation sur  $f^2$

$$\underbrace{\frac{\partial f^2}{\partial t}}_{(1)} + \underbrace{v_1 \nabla_{x_1} f^2}_{(2)} + \underbrace{v_2 \nabla_{v_2} f^2}_{(3)} + \underbrace{\int [F(x_1 - x_2) \nabla_{v_1} f^3 + F(x_2 - x_3) \nabla_{v_2} f^3] dx_3 dv_3}_{(4)} = 0$$

On réécrit en fonction de  $f^1$  chacun des membres :

$$(1) \quad \frac{\partial f^1(t, x_1, v_1)}{\partial t} f^1(t, x_2, v_2) + \frac{\partial f^1(t, x_2, v_2)}{\partial t} f^1(t, x_1, v_1)$$

$$(2) \quad [v_1 \nabla_{x_1} f^1(t, x_1, v_1)] f^1(t, x_2, v_2)$$

$$(3) \quad f^1(t, x_1, v_1) [\nabla_{x_2} f^1(t, x_2, v_2)]$$

$$(4) \quad \int [F(x_1 - x_2) \nabla_{v_1} f^1(t, x_1, v_1)] f^1(t, x_2, v_2) f^1(t, x_3, v_3) \\ + \underbrace{[F(x_2 - x_3) \nabla_{v_2} f^1(t, x_2, v_2)] f^1(t, x_1, v_1) f^1(t, x_3, v_3)}_{(5)} dx_3 dv_3$$

$$(5) f^1(t, x_2, v_2) \left[ \frac{\partial f^1}{\partial t}(t, x_1, v_1) + v_1 \nabla_{x_1} f^1(t, x_1, v_1) + \int F(x_1 - x_3) \nabla_{v_1} f^1(t, x_2, v_2) f^1(t, x_3, v_3) dx_3 dv_3 \right] \\ + f^1(t, x_1, v_1) \left[ \frac{\partial f^1}{\partial t}(t, x_1, v_1) + v_2 \nabla_{x_2} f^1(t, x_2, v_2) + \int F(x_2 - x_3) \nabla_{v_2} f^1(t, x_2, v_2) f^1(t, x_3, v_3) dx_3 dv_3 \right] \\ = \\ \text{par Vlasov sur } f^1 \quad f^1(t, x_2, v_2) \times 0 + f^1(t, x_1, v_1) \times 0 = 0$$

Même calcul avec les  $f^k$ ...

**Question :** Le système (S) possède-t'il d'autres solutions qui ne sont pas sous forme produit tensoriel ?

**Théorème 3 (Point dur de cette analyse : Admis)**

*Le système (S) possède une solution unique si :*

$$f^k(t = 0, x_1, v_1, \dots, x_k, v_k) = f^1(t = 0, x_1, v_1) \times \dots \times f^1(t, x_k, v_k)$$

**Conclusion :** par unicité de la solution de (S), on a unicité des valeurs limites  $f^k$  des  $f_N^k$ .

**Exemple 5** Soit l'EDO :

$$x'(t) = x(t)^2$$

Posons  $x_k(t) = x(t)^k$ . On a :

$$\begin{cases} x_1'(t) = x_2(t) \\ x_2'(t) = 2x_3(t) \\ x_3'(t) = 3x_4(t) \\ \vdots \\ \vdots \end{cases} \quad \text{soit avec : } X(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_k(t) \\ \vdots \end{bmatrix} \quad \text{on a :}$$

$$X'(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & & & \\ & \ddots & 2 & & & \\ & & \ddots & 3 & & \\ & & & \ddots & \ddots & \\ (0) & & & & \ddots & k \\ & & & & \ddots & \ddots \end{bmatrix} X(t)$$


### 1.3 Limite Faible Densité

On a vu comment passer à la limite dans la limite faible couplage :

$$\begin{cases} \frac{dX_i}{dt} = v_i \\ \frac{dV_i}{dt} = \frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N F(x_i - x_j) \end{cases} \quad \text{et } N \rightarrow \infty$$

Maintenant on va passer à la limite suivant la même méthodologie sur la limite faible densité.

$$\begin{cases} \frac{dX_i}{dt} = V_i \\ \frac{dV_i}{dt} = \underbrace{\sum_{j \neq i}}_1 F\left(\frac{X_i - X_j}{\epsilon}\right) \end{cases}$$




Soit  $f(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N)$  = la "densité" de particules en  $(x_1, v_1), \dots, (x_N, v_N)$ .

Dans le cas des sphères dures (collisions élastiques, avec conservation de l'énergie au cours de chaque choc). L'équation sur  $f$  est :

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) + \sum_{i=1}^N v_i \cdot \nabla_{x_i} f = \underbrace{\frac{1}{2}}_{\substack{\text{On compte 2 fois} \\ \text{les collisions dans la somme} \\ \rightarrow \text{Armand}}} \sum_{i,j=1}^N \underbrace{\mathcal{L}_{i,j}[f]}_{\substack{\text{terme de} \\ \text{collision entre } i \text{ et } j}}$$

où :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{i,j}[f](t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) &= \int_{\mathbb{S}^2} \left[ f(t, x_1, v_1, \dots, x_i, v'_i, \dots, x_j = x_i + \epsilon \omega, v'_j, \dots, x_N, v_N) \epsilon^2 \langle v_j - v_i | \omega \rangle_+ \right. \\ &\quad \left. - f(t, x_1, v_1, \dots, x_i, v_i, \dots, x_j = x_i + \epsilon \omega, v_j, \dots, x_N, v_N) \epsilon^2 \langle v_j - v_i | \omega \rangle_- \right] d\omega \\ &= +\text{terme de gain} - \text{terme de perte} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \text{avec } &\begin{cases} v'_i + v'_j = v_i + v_j \\ (v'_i)^2 + (v'_j)^2 = v_i^2 + v_j^2 \end{cases} \\ &\quad \text{conservation de l'énergie cinétique} \\ \text{où } &\begin{cases} \omega \in \mathbb{R}^3 \\ \|\omega\| = 1 \end{cases} \quad \text{Donc } \omega \in \mathbb{S}^2. \end{aligned}$$

**Théorème 4 (Pas facile, admis)** On a :

$$v'_i = v_i - \langle v_i - v_j | \omega \rangle \omega \quad v'_j = v_j + \langle v_i - v_j | \omega \rangle \omega$$



**Remarque 1** Notons que le terme  $\mathcal{L}_{i,j}$ , qui prend en compte l'interaction, ne contient pas de  $\nabla_v f$ , et en plus c'est un terme intégral.

**Notation :**  $\mathcal{L}_{i,j} [f] = \varepsilon^2 \int_{\mathbb{S}^2} \left[ f'_{i,j} \langle v_j - v_i | \omega \rangle_+ - f_{i,j} \langle v_j - v_i | \omega \rangle_- \right] \delta(x_j = x_i + \varepsilon \omega)$

**Théorème 5** Si  $f(t = 0, x_1, v_1, \dots, x_i, v_i, \dots, x_j, v_j, \dots, x_N, v_N)$   
 $= f(t = 0, x_1, v_1, \dots, x_j, v_j, \dots, x_i, v_i, \dots, x_N, v_N)$

$\implies$  Alors  $f$  à l'instant  $t$  vérifie la même propriété.

**Preuve 1** Écrivons l'EDP satisfaite par les marginales :

$$f_N^k(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) = \int f(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) dx_{k+1} dv_{k+1} \dots dx_N dv_N$$

On a, en intégrant l'équation sur  $f$  par rapport à  $(x_2, v_2, \dots, x_N, v_N)$  :

$$\underbrace{\frac{\partial f_N^1}{\partial t}}_{= \int \frac{\partial f}{\partial t}} + \underbrace{v_1 \cdot \nabla_{x_1} f_N^1}_{\int v_1 \cdot \nabla_{x_1} f} + \underbrace{0}_{= \sum_{j \geq 2} v_j \cdot \nabla_{x_j} f = - \sum_{j \geq 2} \int \operatorname{div}_{x_j}(v_j) f = 0} = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N \int \mathcal{L}_{i,j} [f] dx_2 \dots dx_N$$

Pour  $i = 1, j \neq 1$

$$\begin{aligned} \int \mathcal{L}_{i,j} [f] dx_2 \dots dx_N &= \varepsilon^2 \int \int_{\mathbb{S}^2} \left[ f'_{1,j} \langle v_j - v_i | \omega \rangle_+ - f_{1,j} \langle v_j - v_i | \omega \rangle_- \right] \delta(x_j = x_i + \varepsilon \omega) \\ &\stackrel{j \leftrightarrow 2}{=} \varepsilon^2 \int \int_{\mathbb{S}^2} \left[ f'_{1,2} \langle v_2 - v_1 | \omega \rangle_+ - f_{1,2} \langle v_2 - v_1 | \omega \rangle_- \right] \delta(x_2 = x_1 + \varepsilon \omega) \\ &\quad \text{OK car } f \text{ est symétrique} \\ &= \varepsilon^2 \int \int \left[ \underbrace{(f_N^2)'_{1,2}}_{f_N^2(t, x_1, v'_1, x_2, v'_2)} \langle v_2 - v_1 | \omega \rangle_+ - \underbrace{(f_N^2)_{1,2}}_{f_N^2(., x_1, v_1, x_2, v_2)} \langle v_2 - v_1 | \omega \rangle_- \right] \delta(x_2 = x_1 + \varepsilon \omega) dx_2 dv_2 d\omega \end{aligned}$$

Et même chose avec  $\int \mathcal{L}_{j,1} [f] dx_2 \dots dv_N$  pour  $j \geq 2$ .

!! Si  $g(x, y) \in L^1(dx dy)$   
 que dire de  $g(x, x) \rightarrow$  mal défini  
 $g(x, x + \varepsilon y) \in L^1(dx dy)$

Reste à étudier, pour  $i \neq j$ ,  $i \geq 2$ ,  $j \geq 2$  :

$$\begin{aligned} \int \mathcal{L}_{i,j}[f] dx_2 \cdots dv_N &= \varepsilon^2 \int \left[ f'_{i,j} \langle v_j - v_i | \omega \rangle_+ - f_{i,j} \langle v_j - v_i | \omega \rangle_- \right] \delta(x_j = x_i + \varepsilon \omega) d\omega dx_2 \cdots dv_N \\ &\stackrel{\substack{\text{par échange} \\ i \leftrightarrow 2j \leftrightarrow 3}}{=} \varepsilon^2 \int \left[ \underbrace{f'_{2,3}}_{f(t, x_1, v_1, x_2, v'_2, \dots)} \langle v_3 - v_2 | \omega \rangle_+ - f_{2,3} \langle v_3 - v_2 | \omega \rangle_- \right] \delta(x_3 - x_2 - \varepsilon \omega) d\omega dx_2 \cdots dv_N \end{aligned}$$

$$\text{avec } \begin{cases} v'_2 = v_2 - \langle v_2 - v_3 | \omega \rangle \omega \\ v'_3 = v_3 + \langle v_2 - v_3 | \omega \rangle \omega \end{cases} \quad \text{c'est-à-dire } \begin{cases} v_2 = v'_2 - \langle v'_2 - v'_3 | \omega \rangle \omega \\ v_3 = v'_3 + \langle v'_2 - v'_3 | \omega \rangle \omega \end{cases}$$

Pour "alléger, notons  $(v'_2, v'_3) = \mathbf{T}_\omega(\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$  opérateur linéaire en  $(v_2, v_3)$  et on a :

$(v_2, v_3) = T_\omega(v'_2, v'_3)$ . Et dans l'intégrale en  $dv_2 dv_3$  on change de variable et on intègre selon  $dv'_2 dv'_3$ .

$$\begin{aligned} \int \mathcal{L}_{i,j}[f] dx_2 \cdots dv_N &= \varepsilon^2 \int \left[ f(t, x_1, v_1, x_2, v'_2, x_3, v'_3, \dots) \langle v_3(v'_2, v'_3, \omega) - v_2(v'_2, v'_3, \omega) | \omega \rangle_+ \right. \\ &\quad \left. - f(t, x_1, v_1, x_2, v_2(v'_2, v'_3, \omega), x_3, v_3(v'_2, v'_3, \omega), \dots) \langle v_3(\dots) - v_2(\dots) | \omega \rangle_- \right] \\ &\quad \times \delta(x_3 = x_2 + \varepsilon \omega) d\omega dx_2 dx_3 \boxed{\underbrace{|\det(DT_\omega(v'_2, v'_3))|}_{dv_2 dv_3} dv'_2 dv'_3} dx_4 \cdots dv_N \end{aligned}$$

Or  $T_\omega \circ T_\omega = Id$  donc  $(\det(T_\omega))' = 1$  donc  $|\det(T_\omega)| = +1$  avec  $\det(T_\omega) = \det(DT_\omega)$ .

De plus  $\langle v_3(\dots) - v_2(\dots) | \omega \rangle = \langle v'_3 - v'_2 | \omega \rangle + 2\langle v'_2 - v'_3 | \omega \rangle \langle \omega | \omega \rangle = -\langle v'_3 - v'_2 | \omega \rangle$

$$\begin{aligned} \int \mathcal{L}_{i,j}[f] dx_2 \cdots dv_N &= \varepsilon^2 \int \left[ f(t, x_1, v_1, x_2, v'_2, x_3, v'_3, \dots) \cdot (-\langle v'_3 - v'_2 | \omega \rangle)_+ \right. \\ &\quad \left. - f(t, x_1, v_1, x_2, v_2(\dots), x_3, v_3(\dots), \dots) \cdot (-\langle v'_3 - v'_2 | \omega \rangle)_- \right] \delta(x_3 = x_2 + \varepsilon \omega) \\ &\quad d\omega dx_2 dv'_2 dx_3 dv'_3 dx_4 \cdots dv_N \end{aligned}$$

et on change de notation  $(v'_2, v'_3)$  noté  $(v_2, v_3)$ .

$$\begin{aligned} \int \mathcal{L}_{i,j}[f] dx_2 \cdots dv_N &= \varepsilon^2 \int \left[ f(t, x_1, v_1, x_2, v_2, x_3, v_3, \dots) \langle v_1 - v_2 | \omega \rangle_- \right. \\ &\quad \left. - f(t, x_1, v_1, x_2, v_2 - \langle v_2 - v_3 | \omega \rangle \omega, x_3, v_3 + \langle v_2 - v_3 | \omega \rangle \omega, \dots) \langle v'_3 - v'_2 | \omega \rangle_+ \right] \\ &\quad \times \delta(x_3 = x_2 + \varepsilon \omega) d\omega dx_2 dv_2 \cdots dv_N \end{aligned}$$

$$\text{Or } \begin{bmatrix} v_2 - \langle v_2 - v_3 | \omega \rangle \omega \\ v_3 + \langle v_2 - v_3 | \omega \rangle \omega \end{bmatrix} = T_\omega \begin{bmatrix} v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v'_2 \\ v'_3 \end{bmatrix} \text{ en tant que fonction de } \omega, v_2, v_3$$

$\text{où } \begin{bmatrix} v'_2 \\ v'_3 \end{bmatrix} = T_\omega \begin{bmatrix} v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned} \int \mathcal{L}_{i,j}[f] dx_2 \cdots dv_N &= \varepsilon^2 \int \left[ f(\dots) \langle v_3 - v_2 | \omega \rangle_- - f(t, x_1, v_1, v'_2, \underbrace{x_3, v'_3}_{\dots}, \dots) \langle v_3 - v_2 | \omega \rangle_+ \right] \\ &\quad \delta(x_3 = x_2 + \varepsilon \omega) d\omega dx_2 \cdots dv_N \\ &= - \int \mathcal{L}_{i,j}[f] dx_2 \cdots dv_N \end{aligned}$$

Donc :  $\forall i \neq j \geq 2, \int \mathcal{L}_{i,j}[f] dx_2 \cdots dv_N = 0$

## 2 TD

### 2.1 De 1.1 à 1.4

#### Exercice 1

$$\begin{cases} x'(t) = y(t) \\ y'(t) = x(t) \end{cases}, \text{ flot} : (X(t, 0, x, y), Y(t, 0, x, y)).$$

$f^0$  est donnée et on pose :  $f(t, X(t, 0, x, y), Y(t, 0, x, y)) = f^0(x, y)$ .

1. Quelle est l'EDP satisfaite par  $f$  ?
2. A-t-on :  $f(t, x, y) = f(t, y, x)$  ?
3. Si  $f^0(x, y) = g^0(x)g^0(y)$ , a-t-on :  $f(t, x, y) = f^1(t, x)f^1(t, y)$  ?

#### Brouillon 1

1. On dérive la fonction  $t \mapsto f(t, X(t, 0, x, y), Y(t, 0, x, y))$  en  $t$ ,

$$\frac{d}{dt}f(t, X_0(t), Y_0(t)) = \frac{\partial f}{\partial t}(t, X_0(t), Y_0(t)) + \frac{\partial f}{\partial x}(t, X_0(t), Y_0(t))\frac{\partial X_0}{\partial t}(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, X_0(t), Y_0(t))\frac{\partial Y_0}{\partial t}(t)$$

Où :  $X_0(t) = X(t, 0, x, y)$  et  $Y_0(t) = Y(t, 0, x, y)$

Or :  $X'_0(t) = Y_0(t)$  et  $Y'_0(t) = X_0(t)$  et  $f$  ne dépend pas du "temps" d'après les hypothèses. Donc :

$$0 = \frac{d}{dt}f(t, X_0(t), Y_0(t)) = \frac{\partial f}{\partial t}(t, X_0(t), Y_0(t)) + \frac{\partial f}{\partial x}(t, X_0(t), Y_0(t))Y_0(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, X_0(t), Y_0(t))X_0(t)$$

#### Solution 1

On commence par résoudre explicitement l'EDO :

$$(EDO) \iff z'(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} z(t) \text{ où } z(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}.$$

$$D'où  $z(t) = e^{tA} z_0$  où  $z_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$$$

Or  $A$  a pour valeurs propres 1 et -1.

$$D'où (...) : \begin{cases} x(t) = x_0 \cosh(t) + y_0 \sinh(t) \\ y(t) = y_0 \cosh(t) + x_0 \sinh(t) \end{cases}.$$

$$(EDO) \begin{cases} x'(t) = y(t); & x(0) = x_0 \\ y'(t) = x(t); & y(0) = y_0 \end{cases}$$

Donc le flot de l'EDO vaut :  $X(t, 0, x_0, y_0) = x_0 \cosh(t) + y_0 \sinh(t)$ .

$$Y(t, 0, x_0, y_0) = y_0 \cosh(t) + x_0 \sinh(t)$$

Ou encore  $Z(t, 0, z_0) = \begin{pmatrix} \cosh & \sinh \\ \sinh & \cosh \end{pmatrix} z_0$ .

Posons  $f^0(x, y) = f(t, X(t, 0, x, y), Y(t, 0, x, y))$ . Dérivons cette relation par rapport à  $t$  :

$$0 = \frac{d}{dt} f^0(x, y) = \frac{d}{dt} f(t, X_0(t), Y_0(t)) \text{ (en reprenant les notations du brouillon). Donc :}$$

$$0 = \frac{\partial f}{\partial t}(t, X_0(t), Y_0(t)) + \frac{\partial f}{\partial x}(t, X_0(t), Y_0(t)) \frac{\partial X_0}{\partial t}(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, X_0(t), Y_0(t)) \frac{\partial Y_0}{\partial t}(t)$$

$$\text{Ainsi : } 0 = \frac{d}{dt} f(t, X_0(t), Y_0(t)) = \frac{\partial f}{\partial t}(t, X_0(t), Y_0(t)) + \frac{\partial f}{\partial x}(t, X_0(t), Y_0(t)) Y_0(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, X_0(t), Y_0(t)) X_0(t)$$

Finalement : pour tout  $\bar{x}, \bar{y}, t$  :

$$0 = \left( \frac{\partial f}{\partial t} + y \frac{\partial f}{\partial x} + x \frac{\partial f}{\partial y} \right) (t, x, y)$$

et où  $\bar{x} = X_0(t)$  et  $\bar{y} = Y_0(t)$ . Donc  $\begin{cases} x = X(0, t, x, y) \\ y = Y(0, t, x, y) \end{cases}$

**Autre approche :**

On peut aussi utiliser le flot explicite :

$$(1) \implies f^0(x, y) = f(t, \underbrace{x \cosh(t) + y \sinh(t)}_{=X(t,0,x,y)}, \underbrace{y \cosh(t) + x \sinh(t)}_{=Y(t,0,x,y)})$$

Et on fait  $\frac{\partial}{\partial t}$  :

$$0 = \left( \frac{\partial}{\partial t} \right) (\dots) + \underbrace{(x + \sinh(t) + y \cosh(t))}_{=Y(t,0,x,y)} (\dots) + \dots$$

**Troisième approche :**

$$(1) \implies f(t, \underbrace{X(t, 0, x, y)}_{x'}, \underbrace{Y(t, 0, x, y)}_{y'}) = f^0(x, y)$$

$$\implies f(t, x', y') = f^0(X(0, t, x', y'), Y(0, t, x', y'))$$

$$\implies f(t, x, y) = f^0(X(0, t, x, y), Y(0, t, x, y))$$

Et on fait  $\frac{\partial}{\partial t}$ .

Ceci crée le besoin de calculer  $\frac{d}{dt} (X(0, t, x, y))$ .

**Problème :** On dérive par rapport à l'instant initial !! Et on a pas de valeur évidente de  $\frac{d}{dt} X(0, t, x, y)$ .

**Quatrième approche :** on exploite la formule :

$$f(t, x, y) = f^0(X(0, t, x, y), Y(0, t, x, y))$$

On repart de l'EDO :  $\begin{cases} x'(t) = y(t) \\ y'(t) = x(t) \end{cases}$ , avec  $\begin{cases} x(t_0) = x_0 \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$ .

$$\dots \rightarrow \begin{cases} x(t) = x \cosh(t - t_0) + y \sinh(t - t_0) \\ y(t) = y \cosh(t - t_0) + x \sinh(t - t_0) \end{cases}$$

$$D'où : \begin{cases} X(0, t, x, y) = x \cosh(0 - t) + y \sinh(0 - t) \\ Y(0, t, x, y) = y \cosh(0 - t) + x \sinh(0 - t) \end{cases}$$

$$D'où (ici) : f(t, x, y) = f^0(x \cosh(t) - y \sinh(t), y \cosh(t) - x \sinh(t)) \quad (3).$$

$$D'où (ici) : \frac{\partial f}{\partial t}(t, x, y) = y \frac{\partial f}{\partial x} + x \frac{\partial f}{\partial y} = 0$$

**Question 2 :** A-t-on  $f^0(x, y) = f^0(y, x) \implies f(t, x, y) = f(t, y, x)$  ?

réponse 1 : sur la formule (3) on le constate.

$$f(t, y, x) = f^0(y \cosh(t) - x \sinh(t), x \cosh(t) - y \sinh(t)) = f^0(x \cosh(t) - y \sinh(t), \dots) = f(t, x, y).$$

réponse 2 : sans formule.

$$\text{On part de } f(t, x, y) = f^0(X(0, t, x, y), Y(0, t, x, y)) \text{ et } f(t, y, x) = f^0(X(0, t, y, x), Y(0, t, y, x)).$$

On ait ainsi ramener à la question : A-t-on :  $(Y(0, t, x, y), X(0, t, x, y)) = (X(0, t, y, x), Y(0, t, y, x))$  ?

OUI

$$\textbf{Preuve 2} \text{ On montre : } (Y(z, t, x, y), X(s, t, x, y)) = (X(s, t, y, x), Y(s, t, y, x))$$

$$\text{Quand } s = t : (Y(s = t, t, x, y), X(s = t, t, x, y)) = (y, x)$$

$$\text{Evolution avec } s : (X(s = t, t, y, x), Y(s = t, t, y, x)) = (y, x)$$

$$\text{Evolution avec } s : \frac{d}{ds} \begin{bmatrix} Y(s, t, x, y) \\ X(s, t, x, y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X(z, t, x, y) \\ Y(s, t, x, y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y(s, t, x, y) \\ X(s, t, x, y) \end{bmatrix}$$

$$\text{et } \frac{d}{ds} \begin{bmatrix} X(s, t, y, x) \\ Y(s, t, y, x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X(s, t, y, x) \\ Y(s, t, y, x) \end{bmatrix}$$

$$\text{C'est-à-dire : } \begin{bmatrix} Y(s, t, x, y) \\ X(s, t, x, y) \end{bmatrix} \text{ et } \begin{bmatrix} X(s, t, y, x) \\ Y(s, t, y, x) \end{bmatrix}$$

$$\text{satisfont la même EDO } Z' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} Z, \text{ avec la même donnée initiale en } s = t \text{ ces}$$

deux quantités sont égales  $\forall s$ .

$$\text{On a ainsi montré : } (Y(0, t, x, y), X(0, t, x, y)) = (X(0, t, y, x), Y(0, t, y, x)).$$

$$\text{Et par suite : } f(t, x, y) = f(t, y, x)$$

**Remarque :**  $f(t, x, y)$  et  $f(t, y, x)$  satisfont la même EDP avec la même donnée initiale (car  $f^0(x, y) = f^0(y, x)$ ) sous réserve de l'unicité de la solution à l'EDP satisfaite par  $f$  on peut en déduire  $f(t, x, y) = f(t, y, x)$

**Question 3 :** A-t-on  $f^0(x, y) = g^0(x)g^0(y) \implies f(t, x, y) = g(t, x)g(t, y)$  ?

$$\text{Réponse : } f(t, x, y) = f^0(X(0, t, x, y), Y(0, t, x, y)) = g^0(x \cosh(t) - y \sinh(t))g^0(y \cosh(t) - x \sinh(t)).$$

on ne voit pas comment (pour une fonction  $g^0$  générale) ceci pourrait se mettre sous la forme d'un produit  $g(t, x)g(t, y)$ .

## Exercice 2

$$\begin{cases} x'(t) = G(x(t) - y(t)) + G(x(t) - z(t)) \\ y'(t) = G(y(t) - x(t)) + G(y(t) - z(t)) \\ z'(t) = G(z(t) - x(t)) + G(z(t) - y(t)) \end{cases}, \text{ où } G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ est donnée.}$$

$f^0$  est donnée et on pose :  $f(t, X(t, 0, x, y), Y(t, 0, x, y)) = f^0(x, y)$ .

1. Quelle est l'EDP satisfaite par  $f$  ?
2. A-t-on :  $f(t, x, y) = f(t, y, x)$  ?
3. A-t-on :  $f(t, x, y) = f^1(t, x)f^1(t, y)$  ?
4. Quelle sont les équations sur les marginales :  $f^1, f^2$  et  $f^3$  ?

## Solution 2

**Question 1 :** quelle EDP satisfait  $f$  ?

On a (méthode habituelle) :

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, x, y, z) + [G(x - y) + G(x - z)] \frac{\partial f}{\partial x} + [G(y - x) + G(y - z)] \frac{\partial f}{\partial y} + [G(z - x) + G(z - y)] \frac{\partial f}{\partial z} = 0$$

On a :  $f^0(x, y, z) = f^0(y, x, z) \implies$  même propriété pour  $f(t, x, y, z)$ .

En effet :  $f(t, x, y, z) = f^0(X(0, t, x, y, z), Y(\dots), Z(\dots))$ .

Et on a :  $(X(0, t, x, y, z), Y(0, t, x, y, z), Z(0, t, x, y, z)) = (Y(0, t, x, y, z), X(0, t, x, y, z), Z(0, t, x, y, z))$

par unicité dans Cauchy-Lipschitz.

Enfin on a :

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, x, y, z) + [G(x - y) + G(x - z)] \frac{\partial f}{\partial x} + [G(y - x) + G(y - z)] \frac{\partial f}{\partial y} + [G(z - x) + G(z - y)] \frac{\partial f}{\partial z} = 0$$

(On pose  $f^1(t, x) = \int f(t, x, y, z) dy dz, \dots$ , etc.)

Ainsi :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f^1}{\partial t}(t, x) + \underbrace{\int [G(x - y) + G(x - z)] \frac{\partial f}{\partial x}(t, x, y, z) dy dz}_{= 2 \int G(x - y) \frac{\partial f^2}{\partial t}(t, x, y) dy} + \underbrace{\int [G(y - x) + G(y - z)] \frac{\partial f}{\partial x}(t, x, y, z) dy dz}_{= - \int [G'(y - x) + G'(y - z)] f(t, x, y, z) dy} \\ = - \int G'(y - x) f^2(t, x, y) dy + \int G'(y - z) f(t, x, y, z) dy \\ + \dots \end{aligned}$$