

FICHAMENTO DE ARTIGO CIENTÍFICO

Referência:

ANDRADE, Júnia Amorim et al. Estudo comparativo entre os métodos de estimativa visual e goniometria para avaliação das amplitudes de movimento da articulação do ombro. *Acta fisiátrica*, v. 10, n. 1, p. 12-16, 2003.

DOI: <https://doi.org/10.11606/issn.2317-0190.v10i1a102409>

Resumo:

O artigo apresenta o delineamento da pesquisa, cujo objetivo é comparar os métodos de medida utilizados pelos fisioterapeutas, são eles o manual da AAOS (American Academy of Orthopaedic Surgeons) e o da Norkin e White. O método da AAOS admite a utilização de análises visuais por parte do especialista, podendo ou não se fazer uso do goniômetro, além de que não há uma padronização dos movimentos para averiguar os dados, ou seja, há variações de paciente para paciente. Já o método da Norkin e White, que padroniza sistematicamente a posição do indivíduo a ser testado e do goniômetro, detalhando inclusive a colocação do eixo e braços fixo e móvel do mesmo, o qual não é visto no método AAOS. Os resultados se mostraram muito favoráveis ao manual da Norkin e White.

Citações:

“As medidas de amplitude de movimento (ADM) são muito utilizadas e necessitam ser precisas.” (ANDRADE et al., 2003, p. 13)

Comentário: Desse trecho, depreende-se que as medidas tem de ser precisas, logo é necessário se fazer uso de métodos que garantem essa precisão, então entre as duas opções, manual da AAOS e da Norkin e White, os resultados do estudo indicam maior confiabilidade no método de Norkin e White, devido à padronização das medidas.

“Pouca informação pode ser encontrada na literatura comparando a acuidade das medidas articulares com e sem o uso do goniômetro.” (ANDRADE et al., 2003, p. 13)

Comentário: A citação demonstra que existe uma lacuna no quanto se sabe da diferença da precisão de se realizar medidas goniométricas com ou sem o goniômetro, logo o artigo faz-se necessário quando vem propor, por meio de dados as vantagens de se utilizar do goniômetro.

“Comparações entre os métodos apresentaram diferenças significativas para todos os movimentos.” (ANDRADE et al., 2003, p. 14)

Comentário: Nesse fragmento, o autor demonstra que há uma grande diferença entre se basear em estimativas visuais e usar goniômetro, além de se ter ou não ter posições padronizadas para a medida. Deixando a deduzir que é função do terapeuta avaliar qual o mais recomendado, tendo em vista os dados.

“A goniometria é até o momento, o melhor método para avaliar diferenças discretas entre as medidas.” (ANDRADE et al., 2003, p. 16)

Comentário: Deste excerto, vê-se a necessidade de se fazer uso da goniometria para realizar medidas goniométricas precisas e que garantam uma acurácia tolerável. Assim os achados do estudo indicam a relevância da goniometria, abrindo possibilidade para pesquisas futuras voltadas à automatização e ao armazenamento digital dessas medidas, com vistas ao aumento da precisão e eficiência na prática clínica.