



PENGATURAN MAKAN



DIET ✓

Rendah Protein

Bahan Makanan	Diperbolehkan	Dibatasi	Dihindari
SUMBER KARBOHIDRAT	Nasi, jagung, kentang, macaroni atau pasta, havermount, ubi / talas		
SUMBER PROTEIN HEWANI	Daging, ayam, ikan dan telur	Hati, keju, udang dan kuning telur	Abon, kornet, sosis, sarden, telur asin, pindang, ikan asin, terasi, petis
SUMBER PROTEIN NABATI		Tahu, tempe, oncom, kacang tanah, kacang merah, kacang tolo, kacang hijau, kacang kedelai	
SAYURAN	Semua sayuran kecuali untuk pasien hiperkalemia	Sayuran tinggi kalium: buncis, bayam, daun pepaya muda	
BUAH-BUAHAN	Semua buah kecuali untuk pasien hiperkalemia		Buah-buahan tinggi kalium: belimbing, alpukat, jeruk, pisang, pepaya, melon, semangka
LEMAK	Minyak jagung, minyak kacang tanah, minyak kelapa, minyak kedelai dan margarine	Minyak kelapa sawit, santan kental, mentega	





Diet Rendah Protein

Diberikan kepada pasien yang mengalami penurunan fungsi ginjal

Tujuan Diet Rendah Protein

- 1 Mencukupi kebutuhan zat gizi agar status gizi optimal sesuai dengan fungsi ginjal
- 2 Mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit
- 3 Memperlambat penurunan fungsi ginjal
- 4 Menjaga agar pasien dapat beraktivitas normal

Syarat DIET



- 1 Bentuk makanan disesuaikan dengan kondisi pasien
- 2 Protein 0,6 - 0,75 g/kg BB, 50 % hewani 50 % nabati
- 3 Kebutuhan cairan sesuai dengan jumlah urine 24 jam + 500 ml
- 4 Kalium dibatasi jika terjadi hiperkalemia
Garam/Natrium dibatasi jika terjadi edema/ bengkak karena penumpukan cairan serta hipertensi

Cara mengatur diet :

- Hidangkan makanan yang menarik, sehingga menimbulkan selera makan
- Makanan diberikan porsi kecil, padat kalori dan sering (6x sehari)
- Pilih makanan sumber protein hewani dan protein nabati sesuai jumlah yang ditentukan
- Cairan lebih baik dibuat dalam bentuk minuman
- Makanan lebih baik dibuat tidak berkuah, seperti ditumis, dipanggang, dikukus, atau dibakar
- Bila harus membatasi garam, gunakan lebih banyak bumbu (gula, asam, dan bumbu dapur lainnya)

Hal - Hal Yang Perlu Diperhatikan

- Sirup, madu, permen baik sebagai penambah energi, tetapi tidak diberikan dekat dengan waktu makan karena dapat mengurangi nafsu makan
- Bila ada edema (bengkak dikaki) / tekanan darah tinggi perlu mengurangi garam dan menghindari bahan makanan sumber natrium (soda, kaldu instan, ikan asin, telur asin dan makanan yang diawetkan)
- Jumlah cairan yang masuk harus seimbang dengan cairan yang keluar (urin). Cairan yang berlebihan akan membebani kerja ginjal

Kebutuhan Energi Dan Zat Gizi

Energi :
 Protein :
 KH :
 Lemak :

Pembagian Makan Sehari

Waktu	Menu	Berat (g)	Urt
Pagi	Nasi		
	Telur ayam/ penerkar		
	Tempe/bahan penerkar		
	Sayuran A		
	Minyak		
10.00 Siang	Buah		
	Nasi		
	Ikan/penerkar		
	Tempe/bahan penerkar		
	Sayuran B		
	Buah		
16.00 Malam	Minyak		
	Buah		
	Nasi		
	Ayam/ penerkar		
	Tahu/bahan penerkar		
	Sayuran B		
	Buah		
	Minyak		

