

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчёт по дисциплине

Теоретические основы баз данных

Курсовая работа

«Каталог объектов дальнего космоса»

Часть работы	Подпись преподавателя
Часть I	
Часть II	
Часть III	

Выполнил:

студент группы 5130201/40003

Гумницкий К. С.

Принял:

К. тех. наук, доц., Попов С. Г.

«_____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Описание предметной области	3
2	Цели	8
2.1	Описание сущностей	8
2.2	ER-диаграмма	10
2.3	Иерархическая модель данных	12
2.4	Структурная схема БД	14
3	Проектирование	15
3.1	Таблицы данных	15
3.2	Схема базы данных	18
3.3	Генерация записей	21

1 Описание предметной области

Космические объекты вне солнечной системы достаточно разнообразны по целому ряду параметров: звёзды, галактики, туманности и так далее. Различных космических тел в дальнем космосе десятки миллиардов, о большинстве из них нам пока неизвестно. Чтобы ориентироваться в постоянно обновляющихся данных, они нуждаются в классификации и каталогизации. Для этого используются различные каталоги небесных тел.

Самым первым из таких каталогов был Meisser, это список из 110 астрономических объектов, составленный французским астрономом Шарлем Мессье и впервые опубликованный в 1771 году. Последняя редакция каталога относится к 1966 году. Из 110 объектов каталога — 40 галактик, 29 шаровых звёздных скоплений, 28 рассеянных звёздных скоплений, 6 галактических туманностей, 4 планетарные туманности и 3 звёздных поля. Наиболее удалёнными от Земли объектами каталога являются галактики (М 58, М 59, М 60, М 61, М 49, М 87, М 89, М 84, М 86 и другие), принадлежащие скоплению Девы, наиболее близким — туманность М 78. Предельная звёздная величина каталога для отдельных объектов составляет 11m; большинство же из них намного ярче.

На данный момент самым популярным среди астрономов-любителей является New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars (NGC). Каталог является одним из крупнейших неспециализированных каталогов, поскольку включает в себя все типы объектов далёкого космоса (он не специализируется, например, только на галактиках). Содержит 7840 записей. Каталог был составлен в 1880-х годах Джоном Людвигом Эмилем Дрейером в основном по данным наблюдений Уильяма Гершеля, а затем последовательно расширен двумя Индекс-каталогами (IC I и IC II), добавившими ещё 5326 записей.

Объекты небосвода Южного полушария были каталогизированы в меньшей степени, но многие наблюдались Джоном Гершелем. «Новый общий каталог» содержал много ошибок, которые в большинстве своём были устранены в «Пересмотренном Новом общем каталоге».

Общее название для объектов за пределами солнечной системы - объекты глубокого космоса. Это наименование используют любители астрономии, однако оно не является строго научным. Все объекты разделяются на типы, которые в свою очередь могут делиться на подтипы. Ниже приведён небольшой перечень самых основных объектов:

- Звёздное скопление (рассеянное, шаровое);
- туманность (светлая туманность, Тёмная туманность);
- квазар;
- галактика (спиральная, пекулярная).

Для описания космических объектов используются следующие основные параметры (У некоторых объектов может быть другой список, например Великий Аттрактор):

- Название или код объекта;
- тип объекта, его подтип;
- склонение;

Координата объекта на небесной сфере, которая не меняется при суточном вращении Земли. Склонение равно угловому расстоянию на небесной сфере от плоскости небесного экватора до светила, оно положительно для объектов в северном небесном полушарии и отрицательно — в южном.

- видимые размеры;

Размер объекта на небе в градусах.

- видимая звёздная величина.

Мера яркости небесного тела (точнее, освещённости, создаваемой этим телом) с точки зрения земного наблюдателя. Обычно используют величину, скорректированную до значения, которое она имела бы при отсутствии атмосферы. Чем ярче объект, тем меньше его звёздная величина.

Таким образом можно описать почти все объекты дальнего космоса. Например, галактика Андромеда (М 31), имеет следующие параметры:

- Название: Андромеда, М 31;
- спиральная галактика;
- склонение: $41^{\circ} 16' 7,50''$;
- видимые размеры: $3^{\circ} \times 1^{\circ}$;
- видимая звёздная величина: $+3,44^m$.

Благодаря такому стандарту в описании объектов, их можно удобно сортировать по определённым параметрам. Например, видимые невооружённым взглядом объекты имеют звёздную величину от $-1,46^m$ (звезда Сириус, самая яркая за пределами Солнечной системы) до $+6,0^m$ (предел возможностей для человеческого взгляда). Таким образом можно сортировать и по всем остальным параметрам.

Отдельная проблема в астрономии — измерение расстояния до объекта. Одним из самых современных способов — через красное смещение. Закон Хаб-

бла связывает расстояние до галактики с её скоростью удаления от наблюдателя. Красное смещение — это увеличение длины волны света, испущенного удаляющимся объектом, аналогичное эффекту Доплера для звука. Измерив красное смещение, можно определить скорость удаления и, применяя закон Хаббла, оценить расстояние до галактики. Для внутригалактических объектов подходит метод параллакса. Основан на наблюдении изменения положения объекта относительно более далёких объектов при наблюдении с разных точек орбиты Земли. Например, для измерения расстояния до ближайших звёзд используют годичный параллакс — изменение положения звезды из-за движения Земли по орбите.

В астрономии существует понятие эпох. Эпоха — выбранный момент времени, для которого определены астрономические координаты или элементы орбиты небесных тел. Так как видимые координаты объекта могут меняться от прецессии и нутации, а также собственного движения, при измерении координат нужно учитывать, в какой момент они были измерены. В данный момент используется эпоха J2000.0, которой соответствует момент 1 января 2000 в 12:00 ТТ. В 1976 году на ассамблее Международного Астрономического Союза было решено использовать эту эпоху с 1984 года; до этого по очереди использовались эпохи B1875.0, B1900.0 и B1950.0. Пересчёт координат производится домножением их на матрицу поворота, одинаковую для всех объектов и зависящую только от положения основной плоскости системы координат и точки отсчёта на ней.

Исследованиями в области дальнего космоса занимаются множество специалистов из самых разных областей и организаций. Над открытием новых объектов совместно работают учёные-астрономы, физики, химии и так далее. Именно они получают, обрабатывают и вносят новые данные в каталоги. Основным инструментом для исследований является телескоп. На данный

момент, классические оптические телескопы не отвечают всем требованиям для работы, ввиду физических ограничений. Для исследований также применяются радиотелескопы (Very Large Array) и космические аппараты, снабжённые необходимой аппаратурой (Hubble, James Webb). Они могут работать в полностью автоматическом режиме.

Все эти данные нужны в первую очередь для ведения дальнейшей работы в астрономии, космонавтики, физики, химии и так далее. В настоящее время эта информация малоприменимая на практике, это нужно для будущих исследований. Но сейчас этими могут пользоваться обычные люди, которым интересна тема космоса и астрономии.

2 Цели

Исходя из описания предметной области, можно сформулировать следующие задачи перед каталогом:

1. Управление каталогом.
2. Регистрация новых объектов.
3. Управление пользователями.
4. Создание локальных каталогов.

2.1 Описание сущностей

1. Объекты дальнего космоса:
 - Название или код объекта - наименование объекта;
 - тип объекта, его подтип - природа объекта;
 - склонение - Координата объекта на небесной сфере;
 - видимые размеры - размеры в градусах;
 - видимая звёздная величина - мера яркости.
2. Образовательное учреждение:
 - Название - формальное наименование организации;
 - тип - характер учреждения (колледж или университет);
 - страна - государство, в которой зарегистрирована организация;
 - бюджет - годовой капитал.

3. Учёные или группа учёных:

- Фамилия и имя - как зовут человека;
- страна - государство, в которой работает человек;
- организация - место работы учёного;
- специальность - сфера работы в науке;
- учёная степень - степень образования (магистр, к. н. и т.д.).

4. Исследовательская организация:

- Название - формальное наименование организации;
- страна - государство, в которой зарегистрирована организация;
- бюджет - годовой капитал;
- тип финансирования - откуда организация пополняет бюджет.

5. Автоматические телескопы:

- Название - наименование телескопа;
- организация-владелец - кому принадлежит телескоп;
- год введения в эксплуатацию - год начала работы;
- место развёртывания - где находится;
- тип телескопа - технология работы (например, радиотелескоп).

6. Астрономы-любители:

- Фамилия и имя - как зовут человека;
- страна - гражданство человека;
- возраст - количество лет человеку.

2.2 ER-диаграмма

На основе описания сущностей можно составить ER-диаграмму (рис. 1). Это модель данных, позволяющая описывать концептуальные схемы предметной области. Данная диаграмма построена по нотации Питера Чена.




Рис. 1: ER-диаграмма

Чтение диаграммы:

- **Учёный** работает в **исследовательской организации**;
- **Учёный** работает в **образовательном учреждении**;
- **Учёный** исследует **объект дальнего космоса**
- **Учёный** ищет **объект дальнего космоса** в каталоге;
- **Образовательное учреждение** исследует **объект дальнего космоса**
- **Образовательное учреждение** ищет **объект дальнего космоса**;
- **Астроном-любитель** учится в **образовательном учреждении**;
- **Астроном-любитель** составляет свои **каталоги**;
- **Астроном-любитель** следит за новостями об **исследовательской организации**;
- **Исследовательская организация** наблюдает в **телескоп**;
- **Телескоп** регистрирует **объекты дальнего космоса**;
- **Каталог** содержит в себе **объекты дальнего космоса**.

2.3 Иерархическая модель данных

Иерархическая модель данных — это способ организации информации в виде древовидной структуры с родительскими и дочерними элементами. Ниже приведена иерархическая модель для данной предметной области (рис. 2).




Рис. 2: Иерархическая модель данных.

2.4 Структурная схема БД




Рис. 3: Структурная схема БД.

3 Проектирование

3.1 Таблицы данных

Таблица 1: Объект дальнего космоса (Object)

Название RU	Название EN	Тип атрибута	Def	Тип ключа
ID-каталога	ID_Catalog	DECIMAL	-	PK
Тип	Type	VARCHAR(20)	-	FP
Склонение	Declension	DECIMAL	-	FP
Видимый размер	Size	DECIMAL	-	FP
Величина	Magnitude	DECIMAL	-	FP
Название	Object	VARCHAR(30)	-	FP

Таблица 2: Образовательное учреждение (Educational institution)

Название RU	Название EN	Тип атрибута	Def	Тип ключа
ID-организации	ID_Organisation	DECIMAL	-	PK
Тип	Type	VARCHAR(20)	-	FP
Страна	Country	VARCHAR(48)	-	FP
Бюджет	Budget	DECIMAL	-	FP
Название	Organisation	VARCHAR(100)	-	FP

Таблица 3: Учёный (Scientist)

Название RU	Название EN	Тип атрибута	Def	Тип ключа
ФИО	Person	VARCHAR(55)	-	PK
Страна	Country	VARCHAR(48)	-	FP
Специальность	Proffesion	VARCHAR(20)	-	FP
Учёная степень	Graduate	VARCHAR(20)	-	FP
ID-организации	ID_Organisation	DECIMAL	-	FP
ID-каталога	ID_Catalog	DECIMAL	-	FP

Таблица 4: Исследовательская организация (Research organisation)

Название RU	Название EN	Тип атрибута	Def	Тип ключа
ID-организации	ID_Organisation	VARCHAR(100)	-	PK
Тип финансирования	Type	VARCHAR(15)	-	FP
Страна	Country	VARCHAR(48)	-	FP
Бюджет	Budget	DECIMAL	-	FP
Название	Organisation	VARCHAR(100)	-	FP

Таблица 5: Автоматический телескоп (Automatic telescope)

Название RU	Название EN	Тип атрибута	Def	Тип ключа
Название	Telescope	VARCHAR(32)	-	PK
Тип	Type	VARCHAR(32)	-	FP
ID-организации	ID _ Organisation	VARCHAR(100)	-	FP
Год введения в эксплуатацию	Year	DECIMAL	-	FP
Место развёртывания	Spot	VARCHAR(40)	-	FP
ID-каталога	ID _ Catalog	DECIMAL	-	FP

Таблица 6: Астроном-любитель (Amateur astronomer)

Название RU	Название EN	Тип атрибута	Def	Тип ключа
ФИО	Person	VARCHAR(55)	-	PK
Страна	Country	VARCHAR(48)	-	FP
Возраст	Age	VARCHAR(3)	-	FP
ID-организации	ID _ Organisation	DECIMAL	-	FP
ID-каталога	ID _ Catalog	DECIMAL	-	FP

Таблица 7: Каталог (Catalog)

Название RU	Название EN	Тип атрибута	Def	Тип ключа
ID-каталога	ID _ Catalog	DECIMAL	-	PK
Количество объектов	Count	DECIMAL	-	FP
Название	CatalogName	VARCHAR(100)	-	FP

Выбранные размеры атрибутов типа `VARCHAR` обусловлены следующими факторами:

- `ФИО` - результат сложения длин самого длинного имени, отчества и фамилии в России;
- `Страна` - Самое длинное формальное название страны (Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
- `Название телескопа` - самое длинное название;
- `Тип телескопа` - самое длинное название;
- `Место развёртывания` - самое длинное название точки на карте, делённое пополам;
- `Организация` - в России зарегистрированы попытки создать организации с более чем 80 символами;
- `Название объекта дальнего космоса` - самое длинное название в SIMBAD;
- длина остальных атрибутов обусловлена средней длиной слов в русском языке и дополнительным запасом символов.

3.2 Схема базы данных

На основе ER-диаграммы и таблиц данных была составлена схема базы данных на русском (рис. 4) и английском (рис. 5) языках.




Рис. 4: Схема базы данных на русском




Рис. 5: Схема базы данных на английском

3.3 Генерация записей

Для заполнения базы данных PostgreSQL тестовыми записями был разработан скрипт на языке Python.

Для подключения к PostgreSQL и выполнения SQL-запросов использовалась библиотека `psycopg2`. Подключение к базе данных производилось через функцию `create_connection()`, использующую параметры конфигурации `DB_CONFIG`. Для генерации реалистичных тестовых данных, таких как имена, даты или адреса, использовалась библиотека `Faker`.