5

Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

Dr. Öğr. Üyesi Sinan ŞERMET

27 سؤال	**14** أساسي
13 للمراجعة	**17** امتحان

14 الأسئلة

ÖR (+) meme kanseri olan postmenopozal hastada tamoksifen kullanılmasının temel nedeni nedir?	K6-26 · 45	01
Prostat kanseri tedavisinde kullanılan "androjen reseptör antagonisti" antiandrojen ilaç hangisidir?	K6-26 · 46	02
"Metastatik kastrasyon dirençli prostat kanseri" tedavisinde kullanılan androjen biyosentez inhibitörü hangisidir?	K26 · 4	03
Androjen reseptör antagonisti olup prostat kanseri tedavisinde kullanılan ilaç hangisidir?	K6-25 · 52	04
Selektif östrojen reseptör modülatörleri (SERM) hakkında hangisi doğrudur?	K6-25 · 58	05
Östrojen reseptörü pozitif (ÖR (+)) meme kanseri tanısı konulan 60 yaşında kadın hastanın tedavisi için en uygun ilaç hangisidir?	K25 · 69	06
İlerlemiş prostat kanseri tedavisinde kullanılan GnRH analoğu hangisidir?	K6-24 · 57	07
Hem östrojenik hem antiöstrojenik aktiviteye sahip, ÖR(+) meme kanserinde kullanılan Selektif Östrojen Reseptörü Modülatörü (SERM) antineoplastik ajan ...	K23 · 89	08
İlerlemiş prostat kanserinde GnRH reseptörlerinin yarışmalı antagonisti olan ilaç hangisidir?	K6-22 · 56	09
Hormon pozitif meme kanserinde tamoksifen altında akciğer metastazı gelişen hastada tamoksifen yerine başlanan östrojen reseptör antagonisti hangisidir?	B21-2 · 64	10
Hormon pozitif meme kanserinde tamoksifen altında akciğer metastazı gelişen hastada tamoksifen yerine başlanan östrojen reseptör antagonisti hangisidir?	K6-22 · 64	11
Östrojen ve progesteron reseptörü pozitif meme karsinomu çıkarılan 50 yaşındaki kadın hangi ilacı alabilir?	K6-21 · 52	12
Aşağıdaki antiandrojenlerden hangisi androjen reseptör antagonistidir ve prostat kanserinin tedavisinde kullanılır?	F20 · 83	13
Uzun süre düzenli olarak tedavi dozunda prednizolon kullanımı aşağıdakilerden hangisi ile sonuçlanabilir?	F19 · 16	14

13 للمراجعة · آخر الملف

Romatoid artrit için oral prednizolon alan hastada hangi yan etkinin görülmesi en az olasıdır?	K6-26 · 44	15
Romatoid artrit için prednizolon kullanan 60 yaşındaki kadında hangi yan etkinin görülmesi en az olasıdır?	K6-25 · 54	16
Glukokortikoidler için hangisi yanlıştır?	K6-24 · 51	17
Yüksek dozlarda vagotomi ve dumping sendromuna bağlı diyareye karşı etkili antidiyareik hangisidir?	K5-24 · 58	18

Osteoporoz tedavisinde kullanılan selektif östrojen reseptör modülatörü (SERM) hangisidir?	**BF23 · 76**	19
Adrenal tümöre bağlı Cushing sendromlu 46 yaşındaki erkek hasta için uygun tedavi seçeneği hangisidir?	**BF23 · 77**	20
Overi baskılayarak östrojen ve progesteronu azaltan ve endometriozis tedavisinde kullanılan ilaç hangisidir?	**K6-23 · 72**	21
Pankreas tümörü (VIPoma) olan hastada sulu diyareyi kontrol altına almak için hangi ilaç uygundur?	**K6-21 · 44**	22
Kas güçsüzlüğü, karında yağ birikimi, ciltte incelme ve osteoporozu olan hastada hangi ilacın uzun süreli kullanımı bu tabloya neden olmuştur?	**K6-21 · 50**	23
Postmenopozal osteoporozlu kadında hangi ilacın kronik kullanımının osteoporoza katkısı en olasıdır?	**K3-20 · 11**	24
Postmenopozal osteoporozlu kadında hangi ilacın kronik kullanımının osteoporoza katkısı en olasıdır?	**K3-19 · 14**	25
Cerrahiye kısmen yanıt veren hipofizer tümörlü akromegali hastasında farmakolojik tedavide en olası ilaç hangisidir?	**K5-19 · 18**	26
Cerrahiye kısmen yanıt veren hipofizer tümörlü akromegali hastasında farmakolojik tedavide en olası ilaç hangisidir?	**K3-20 · 19**	27

45. Östrojen reseptör pozitif meme kanseri olan postmenopozal bir hastada tamoksifen kullanılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Selektif östrojen reseptör modülatörü olması ✓
B) Progesteron reseptör blokajı yapması
C) Aromataz inhibisyonu yapması
D) GnRH salınımını artırması
E) Prolaktin sekresyonunu baskılaması

K6-26 Kurul 2025–2026 • Soru 45

اتسأل بصيغ مختلفة في 5 امتحانات

الإجابة

A Selektif östrojen reseptör modülatörü olması

من الدرس 2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri **سلايد 14**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

2. Antiöstrojenler:

2.1. Seçici Östrojen Reseptör Modülatörleri (SERM'ler): tamoksifen, toremifen, raloksifen. Bu ilaçlar hedef hücrelerde östrojen reseptörlerini kompetitif (yarışarak) bloke ederler ve seçici östrojen reseptör modülatörleri (hem östrojenik hem anti-östrojenik etki) olarak isimlendirilirler.

Tamoksifen: Östrojenik aktivitesi olan bir östrojen antagonistidir ve seçici östrojen reseptör modülatörü (SERM) olarak sınıflandırılır. Özel durumlarda (ör. yüksek ERBB2/HER2 aktivitesi) tamoksifen-ÖR kompleksi ko-aktivatör proteinleri bağlayarak agonistik etkiye yol açar.

Östrojen reseptörü pozitif (ÖR (+)) meme kanseri tedavisinde ilk basamak ilaç olarak kullanılır Ayrıca yüksek riskli kadınlarda meme kanseri oluşumunu azaltmada profilaktik olarak da kullanılır.


Yan Etkileri: sıcak basması, bulantı, kusma, deri döküntüsü ve vajinal kanama, hiperkalsemidir. Kemiğe metastaz varsa ağrıya yol açabilir. Endometriyal kanser oluşturma riski vardır. Tromboemboli ve görme bozukluğu yapabilir.

Raloksifen: Östrojen reseptör modülatörüdür (SERM). Rahim ve meme dokusunda östrojen etkileri bloke eder. Oral kullanılır. Menopoz sonrası kadınlarda östrojen reseptörü pozitif invazif göğüs kanseri riskini azaltmak için kullanılır. Başlıca yan etkileri; sıcak basması, artralji ve miyaljidir.


Fulvestrant: Hormon reseptörü pozitif metastatik meme kanseri hastalarında kas içi enjeksiyon şeklinde verilir. (SERD: seçici östrojen reseptör indirgeyici) Östrojen reseptör antagonistidir. Östrojen agonistik etkinliği yoktur.

2.2. Aromataz İnhibitörleri: Over ve over dışı dokularda androjenik nitelikteki östradiol prekürsörlerinin östradiole dönüşümünü katalize eden «aromataz enzimini» inhibe ederler.

Eksemestan, Formestan, Anastrozol, Letrozol: Esas olarak **postmenopozal hormon reseptörü pozitif kadınlarda meme kanserinin tedavisi**nde kullanılırlar.



https://www.biorender.com/template/tamoxifen-mechanism-of-action-in-breast-cancer Erişim Tarihi: 17.11.2024)



5/21/2023 SİNAN ŞERMET

Smith 2008; https://www.uspharmacist.com/article/the-third-generation-aromatase-inhibitors (Erişim Tarihi: 19.11.2024) 14

46. **Aşağıdaki ilaçlardan hangisi prostat kanseri tedavisinde kullanılan "androjen reseptör antgonisti" bir antiandrojen ilaçtır?**

A) Bikalutamid ✓
B) Finasterid
C) Siproteron
D) Oksimetholon
E) Siproheptadin

K6-26 Kurul 2025–2026 • Soru 46

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

الإجابة **A** Bikalutamid

من الدرس 2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri **سلايد 15**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

3. Progestojenler (Progestinler): Progesteron benzeri etkisi olan sentetik hormonal ilaçlardır. Antiöstrojenik etkinlikleri vardır, endometriyum kanserinin tedavisinde kullanılırlar.

Endometriyum kanserinin oluşmasında aşırı östrojenik etkinlik olduğu belirtilmektedir. Östrojenlerin endometriyumda proliferatif etkinlikleri vardır, progestinler ise endometriyumun olgunlaşmasını ve apoptozu sağlarlar.

Meme kanseri tedavisinde de kullanılırlar. Prostat kanserinde kısıtlı etkinlikleri vardır.


Antineoplastik amaçlı olarak en sık kullanılan progestinler; oral «**megestrol asetat**», «**noretisteron**» ve i.m. «**medroksiprogesteron asetat**». Bu ilaçların antiandrojenik etkinlikleri de bulunmaktadır. Kansere bağlı anoreksi ve kaşeksinin tedavisinde kullanılabilirler.

4. Antiandrojenler:

Flutamid, Nilutamid ve Bikalutamid: Prostat kanserinin tedavisinde kullanılan sentetik, steroid olmayan anti-androjenlerdir (**androjen reseptör antagonistler**).

Hedef hücrelerdeki androjen (testosteron) reseptörüne bağlanarak, doğal hormonun çekirdeğe translokasyonunu engeller ve testosteronun etkisi bloke ederler. Oral olarak alınır ve böbrek yoluyla atılırlar. Flutamid günde 3 kez diğerleri ise günde 1 kez alınır.

Enzalutamid: Daha önce dosetaksel tedavisi görmüş **kastrasyona dirençli metastatik prostat kanserinde** kullanılır.



Lipincott's Illustrated Pharmacology Reviews

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 15

4. **Aşağıdaki ilaçlardan hangisi "metastatik kastrasyon dirençli prostat kanseri" tedavisinde kullanılan bir androjen biyosentez inhibitörüdür?**

A) Abirateron ✓
B) Lanreotid
C) Raloksifen
D) Prednizolon
E) Eksemestan

K26 Kurul 2025–2026 • Soru 4

الإجابة **A** **Abirateron**

من الدرس **سلايد 18** 2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL


2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

6. GnRH Antagonistleri:

Degareliks: İlerlemiş hormon bağımlı prostat kanserinin tedavisinde kullanılır. GnRH analoglarının aksine başlangıçta gonadotropin salıverilmesini stimüle etmez, bu nedenle tümörde alevlenme (flaring) yapmaz. Karın bölgesine cilt altına enjeksiyon suretiyle kullanılır.

7. Androjen Biyosentez İnhibitörü: Abirateron: Abirateron asetat; CYP17-bağımlı dehidroepiandrosteron (DHEA) sentezini inhibe eder.

Metastatik kastrasyona dirençli prostat kanseri tedavisinde kullanılır.



Vasdev vd., 2013

Abirateron asetat Etki Mekanizması

Saad ve ark., 2018

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 18

52

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi bir androjen reseptör antagonisti olup, prostat kanseri tedavisinde kullanılır?

- ✓ **A)** Flutamid
- **B)** Mesterolon
- **C)** Oksimetolon
- **D)** Finasterid
- **E)** Siproheptadin

K6-25 Kurul 2024–2025 • Soru 52

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

الإجابة **A** Flutamid

من الدرس **سلايد 15** 2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

3. Progestojenler (Progestinler): Progesteron benzeri etkisi olan sentetik hormonal ilaçlardır. Antiöstrojenik etkinlikleri vardır, endometriyum kanserinin tedavisinde kullanılırlar.

Endometriyum kanserinin oluşmasında aşırı östrojenik etkinlik olduğu belirtilmektedir. Östrojenlerin endometriyumda proliferatif etkinlikleri vardır, progestinler ise endometriyumun olgunlaşmasını ve apoptozu sağlarlar.

Meme kanseri tedavisinde de kullanılırlar. Prostat kanserinde kısıtlı etkinlikleri vardır.


Antineoplastik amaçlı olarak en sık kullanılan progestinler; oral «**megestrol asetat**», «**noretisteron**» ve i.m. «**medroksiprogesteron asetat**». Bu ilaçların antiandrojenik etkinlikleri de bulunmaktadır. Kansere bağlı anoreksi ve kaşeksinin tedavisinde kullanılabilirler.

4. Antiandrojenler:

Flutamid, Nilutamid ve Bikalutamid: Prostat kanserinin tedavisinde kullanılan sentetik, steroid olmayan anti-androjenlerdir (**androjen reseptör antagonistler**).

Hedef hücrelerdeki androjen (testosteron) reseptörüne bağlanarak, doğal hormonun çekirdeğe translokasyonunu engeller ve testosteronun etkisi bloke ederler. Oral olarak alınır ve böbrek yoluyla atılırlar. Flutamid günde 3 kez diğerleri ise günde 1 kez alınır.

Enzalutamid: Daha önce dosetaksel tedavisi görmüş **kastrasyona dirençli metastatik prostat kanserinde** kullanılır.



Lipincott's Illustrated Pharmacology Reviews

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 15

58

Aşağıdakilerden hangisi selektif östrojen reseptör modülatörleri (SERM) hakkında doğrudur?

- ✓ **A)** Tamoksifen meme dokusunda östrojen antagonisti olarak etki gösterir
- **B)** Her dokuda östrojen agonistidir
- **C)** Endometriyumda östrojen antagonisti olarak etki ederler
- **D)** Raloksifen meme dokusunda östrojen agonistidir
- **E)** Raloksifen fertilite tedavisinde kullanılır

K6-25 Kurul 2024–2025 • Soru 58

اتسأل بصيغ مختلفة في 5 امتحانات

الإجابة

A Tamoksifen meme dokusunda östrojen antagonisti olarak etki gösterir

من الدرس **سلايد 14** 2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

2. Antiöstrojenler:

2.1. Seçici Östrojen Reseptör Modülatörleri (SERM'ler): tamoksifen, toremifen, raloksifen. Bu ilaçlar hedef hücrelerde östrojen reseptörlerini kompetitif (yarışarak) bloke ederler ve seçici östrojen reseptör modülatörleri (hem östrojenik hem anti-östrojenik etki) olarak isimlendirilirler.

Tamoksifen: Östrojenik aktivitesi olan bir östrojen antagonistidir ve seçici östrojen reseptör modülatörü (SERM) olarak sınıflandırılır. Özel durumlarda (ör. yüksek ERBB2/HER2 aktivitesi) tamoksifen-ÖR kompleksi ko-aktivatör proteinleri bağlayarak agonistik etkiye yol açar.

Östrojen reseptörü pozitif (ÖR (+)) meme kanseri tedavisinde ilk basamak ilaç olarak kullanılır. Ayrıca yüksek riskli kadınlarda meme kanseri oluşumunu azaltmada profilaktik olarak da kullanılır.


Yan Etkileri: sıcak basması, bulantı, kusma, deri döküntüsü ve vajinal kanama, hiperkalsemidir. Kemiğe metastaz varsa ağrıya yol açabilir. Endometriyal kanser oluşturma riski vardır. Tromboemboli ve görme bozukluğu yapabilir.

Raloksifen: Östrojen reseptör modülatörüdür (SERM). Rahim ve meme dokusunda östrojen etkileri bloke eder. Oral kullanılır. Menopoz sonrası kadınlarda östrojen reseptörü pozitif invazif göğüs kanseri riskini azaltmak için kullanılır. Başlıca yan etkileri; sıcak basması, artralji ve miyaljidir.


Fulvestrant: Hormon reseptörü pozitif metastatik meme kanseri hastalarında kas içi enjeksiyon şeklinde verilir. (SERD: seçici östrojen reseptör indirgeyici) Östrojen reseptör antagonistidir. Östrojen agonistik etkinliği yoktur.

2.2. Aromataz İnhibitörleri: Over ve over dışı dokularda androjenik nitelikteki östradiol prekürsörlerinin östradiole dönüşümünü katalize eden «aromataz enzimini» inhibe ederler.

Eksemestan, Formestan, Anastrozol, Letrozol: Esas olarak postmenopozal hormon reseptörü pozitif kadınlarda meme kanserinin tedavisinde kullanılırlar.



https://www.biorender.com/template/tamoxifen-mechanism-of-action-in-breast-cancer Erişim Tarihi: 17.11.2024)



5/21/2023 SİNAN ŞERMET Smith 2008; https://www.uspharmacist.com/article/the-third-generation-aromatase-inhibitors (Erişim Tarihi: 19.11.2024) 14

69. **Östorjen reseptörü pozitif (ÖR (+) veya ER (+) olarak da ifade edilir) meme kanseri teşhisi konulan 60 yaşında bir kadın hastaya antineoplastik kemoterapi başlanması planlanmaktadır. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin seçilmesi hastanın tedavisi için en uygundur?**

A) Tamoksifen ✓
B) Bikalutamid
C) Prednizolon
D) Lantreotid
E) Mitotan

K25 Kurul 2024–2025 • Soru 69

اتسأل بصيغ مختلفة في 5 امتحانات

الإجابة **A** Tamoksifen

من الدرس 2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri **سلايد 14**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

2. Antiöstrojenler:

2.1. Seçici Östrojen Reseptör Modülatörleri (SERM'ler): tamoksifen, toremifen, raloksifen. Bu ilaçlar hedef hücrelerde östrojen reseptörlerini kompetitif (yarışarak) bloke ederler ve seçici östrojen reseptör modülatörleri (hem östrojenik hem anti-östrojenik etki) olarak isimlendirilirler.

Tamoksifen: Östrojenik aktivitesi olan bir östrojen antagonistidir ve seçici östrojen reseptör modülatörü (SERM) olarak sınıflandırılır. Özel durumlarda (ör. yüksek ERBB2/HER2 aktivitesi) tamoksifen-ÖR kompleksi ko-aktivatör proteinleri bağlayarak agonistik etkiye yol açar.

Östrojen reseptörü pozitif (ÖR (+)) meme kanseri tedavisinde ilk basamak ilaç olarak kullanılır. Ayrıca yüksek riskli kadınlarda meme kanseri oluşumunu azaltmada profilaktik olarak da kullanılır.


Yan Etkileri: sıcak basması, bulantı, kusma, deri döküntüsü ve vajinal kanama, hiperkalsemidir. Kemiğe metastaz varsa ağrıya yol açabilir. Endometriyal kanser oluşturma riski vardır. Tromboemboli ve görme bozukluğu yapabilir.

Raloksifen: Östrojen reseptör modülatörüdür (SERM). Rahim ve meme dokusunda östrojen etkileri bloke eder. Oral kullanılır. Menopoz sonrası kadınlarda östrojen reseptörü pozitif invazif göğüs kanseri riskini azaltmak için kullanılır. Başlıca yan etkileri; sıcak basması, artralji ve miyaljidir.


Fulvestrant: Hormon reseptörü pozitif metastatik meme kanseri hastalarında kas içi enjeksiyon şeklinde verilir. (SERD: seçici östrojen reseptör indirgeyici) Östrojen reseptör antagonistidir. Östrojen agonistik etkinliği yoktur.

2.2. Aromataz İnhibitörleri: Over ve over dışı dokularda androjenik nitelikteki östradiol prekürsörlerinin östradiole dönüşümünü katalize eden «aromataz enzimini» inhibe ederler.

Eksemestan, Formestan, Anastrozol, Letrozol: Esas olarak **postmenopozal hormon reseptörü pozitif kadınlarda meme kanserinin tedavisi**nde kullanılırlar.



https://www.biorender.com/template/tamoxifen-mechanism-of-action-in-breast-cancer Erişim Tarihi: 17.11.2024)



5/21/2023 SİNAN ŞERMET Smith 2008; https://www.uspharmacist.com/article/the-third-generation-aromatase-inhibitors (Erişim Tarihi: 19.11.2024) 14

57. Aşağıda verilen ilaçlardan hangisi ilerlemiş prostat kanseri tedavisinde kullanılan bir GnRH analoğudur?

A) Löprolid ✓
B) Dutasterid
C) Siproteron asetat
D) Spironolakton
E) Mesterolon

K6-24 Kurul 2023–2024 · Soru 57

الإجابة **A** Löprolid

من الدرس **سلايد 17** 2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

5. GnRH Analogları: GnRH; hipotalamus tarafından salgılanır ve ön hipofizi uyararak gonadotropik hormonları salgılatır;

Uzun etki süreli sentetik GnRH analogları; uygulamada geçici stimülasyondan sonra, hipofizde desentiziasyona (duyarsızlaşmaya) ve gonadotropin salgılanmasının durmasına neden olur.

Löprolid, Goserelin, Triptorelin: GnRH (gonadotropin salıverici hormon)'ın sentetik analoglarıdır, Bu ilaçlar kadınlarda meme kanseri ve endometriyozisde yararlıdır. Prostat kanserinde kullanılırlar, bu endikasyonda östrojen türevlerinin yerini almıştır.


Löprolid:

(a) Sürekli salınımlı intradermal implant

(b) Deri altı depo enjeksiyon

(c) Kas içine depo enjeksiyon şeklinde kullanılır.

Goserelin asetat: deri altına implant, Triptorelin pamoat: kas içine enjeksiyon suretiyle kullanılır.



https://www.centerforurologiccare.com/patient-education/prostate-cancer/ (Erişim Tarihi: 17.11.2024)

Başlangıçta androjen düzeylerinde yükselmeye, sonrasında ise konsantrasyon seviyelerinde düşmeye neden olabilir.

Yan Etkileri: iktidarsızlık, sıcak basması, östrojen tedavisi ile yaşananlara kıyasla en az düzeydedir.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 17

89- Aşağıdaki antineoplastik ajanlardan hangisi Selektif Östrojen Reseptörü (ÖR) Modülatörüdür (SERM), hem östrojenik hem de antiöstrojenik aktiviteye sahiptir ve ÖR(+) meme kanserinin tedavisinde kullanılır?

a) Siklofosfamid
b) Tamoksifen
c) Flutamid
d) Löprolid
e) Vinkristin

K23 Kurul 2022–2023 • Soru 89

اتسأل بصيغ مختلفة في 5 امتحانات

الإجابة **B** Tamoksifen

من الدرس **سلايد 14** 2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

2. Antiöstrojenler:

2.1. Seçici Östrojen Reseptör Modülatörleri (SERM'ler): tamoksifen, toremifen, raloksifen. Bu ilaçlar hedef hücrelerde östrojen reseptörlerini kompetitif (yarışarak) bloke ederler ve seçici östrojen reseptör modülatörleri (hem östrojenik hem anti-östrojenik etki) olarak isimlendirilirler.

Tamoksifen: Östrojenik aktivitesi olan bir östrojen antagonistidir ve seçici östrojen reseptör modülatörü (SERM) olarak sınıflandırılır. Özel durumlarda (ör. yüksek ERBB2/HER2 aktivitesi) tamoksifen-ÖR kompleksi ko-aktivatör proteinleri bağlayarak agonistik etkiye yol açar.

Östrojen reseptörü pozitif (ÖR (+)) meme kanseri tedavisinde ilk basamak ilaç olarak kullanılır. Ayrıca yüksek riskli kadınlarda meme kanseri oluşumunu azaltmada profilaktik olarak da kullanılır.


Yan Etkileri: sıcak basması, bulantı, kusma, deri döküntüsü ve vajinal kanama, hiperkalsemidir. Kemiğe metastaz varsa ağrıya yol açabilir. Endometriyal kanser oluşturma riski vardır. Tromboemboli ve görme bozukluğu yapabilir.

Raloksifen: Östrojen reseptör modülatörüdür (SERM). Rahim ve meme dokusunda östrojen etkileri bloke eder. Oral kullanılır. Menopoz sonrası kadınlarda östrojen reseptörü pozitif invazif göğüs kanseri riskini azaltmak için kullanılır. Başlıca yan etkileri; sıcak basması, artralji ve miyaljidir.


Fulvestrant: Hormon reseptörü pozitif metastatik meme kanseri hastalarında kas içi enjeksiyon şeklinde verilir. (SERD: seçici östrojen reseptör indirgeyici) Östrojen reseptör antagonistidir. Östrojen agonistik etkinliği yoktur.

2.2. Aromataz İnhibitörleri: Over ve over dışı dokularda androjenik nitelikteki östradiol prekürsörlerinin östradiole dönüşümünü katalize eden «aromataz enzimini» inhibe ederler.

Eksemestan, Formestan, Anastrozol, Letrozol: Esas olarak **postmenopozal hormon reseptörü pozitif kadınlarda meme kanserinin tedavisi**nde kullanılırlar.



https://www.biorender.com/template/tamoxifen-mechanism-of-action-in-breast-cancer Erişim Tarihi: 17.11.2024)



5/21/2023 SİNAN ŞERMET Smith 2008; https://www.uspharmacist.com/article/the-third-generation-aromatase-inhibitors (Erişim Tarihi: 19.11.2024) 14


56- Semptomları ilerlemiş prostat kanseri olan 71 yaşında bir erkek hastaya, gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) reseptörlerinin yarışmalı antagonisti bir ilaçla tedaviye başlanmışsa, bu hasta büyük olasılıkla aşağıdaki ilaçlardan hangisini almaktadır?

a) Degareliks ✔
b) Löprolid
c) Kabergolin
d) Pegvisomant
e) Mekasermin


K6-22 Kurul 2021–2022 · Soru 56

الإجابة **A** Degareliks

من الدرس 2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri **سلايد 16**



من الدرس 2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri **سلايد 18**



Soru 64 — 0,5 puan

Beş yıl önce, 54 yaşında bir kadına hormon pozitif meme kanseri teşhisi konuluyor. Radikal mastektomi ardından altı kür kemoterapi uygulanıyor. O zamandan beri tamoksifen ile hormonal tedavi gördüğü bilinen hastanın bilgisayarlı tomografi taramasında çoklu akciğer metastazı saptanıyor. Tamoksifen tedavisi durdurulan hastaya aşağıdaki ilaçlardan hangisi bir estrojen reseptör antagonisti olup tamoksifen yerine başlatılmıştır?

En az bir doğru yanıt seçin

- A Anastrazol
- B Danazol
- C Löprolid
- D Mifepriston
- E Fulvestrant ✓ *Doğru yanıt*

B21-2 Bütünleme 2020–2021 · Soru 64

K6-22 Kurul 2021–2022 · Soru جه كمان في 64

الإجابة **E** Fulvestrant

من الدرس **سلايد 14** 2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

2. Antiöstrojenler:

2.1. Seçici Östrojen Reseptör Modülatörleri (SERM'ler): tamoksifen, toremifen, raloksifen. Bu ilaçlar hedef hücrelerde östrojen reseptörlerini kompetitif (yarışarak) bloke ederler ve seçici östrojen reseptör modülatörleri (hem östrojenik hem anti-östrojenik etki) olarak isimlendirilirler.

Tamoksifen: Östrojenik aktivitesi olan bir östrojen antagonistidir ve seçici östrojen reseptör modülatörü (SERM) olarak sınıflandırılır. Özel durumlarda (ör. yüksek ERBB2/HER2 aktivitesi) tamoksifen-ÖR kompleksi ko-aktivatör proteinleri bağlayarak agonistik etkiye yol açar.

Östrojen reseptörü pozitif (ÖR (+)) meme kanseri tedavisinde ilk basamak ilaç olarak kullanılır. Ayrıca yüksek riskli kadınlarda meme kanseri oluşumunu azaltmada profilaktik olarak da kullanılır.


Yan Etkileri: sıcak basması, bulantı, kusma, deri döküntüsü ve vajinal kanama, hiperkalsemidir. Kemiğe metastaz varsa ağrıya yol açabilir. Endometriyal kanser oluşturma riski vardır. Tromboemboli ve görme bozukluğu yapabilir.

Raloksifen: Östrojen reseptör modülatörüdür (SERM). Rahim ve meme dokusunda östrojen etkileri bloke eder. Oral kullanılır. Menopoz sonrası kadınlarda östrojen reseptörü pozitif invazif göğüs kanseri riskini azaltmak için kullanılır. Başlıca yan etkileri; sıcak basması, artralji ve miyaljidir.


Fulvestrant: Hormon reseptörü pozitif metastatik meme kanseri hastalarında kas içi enjeksiyon şeklinde verilir. (SERD: seçici östrojen reseptör indirgeyici) Östrojen reseptör antagonistidir. Östrojen agonistik etkinliği yoktur.

2.2. Aromataz İnhibitörleri: Over ve over dışı dokularda androjenik nitelikteki östradiol prekürsörlerinin östradiole dönüşümünü katalize eden «aromataz enzimini» inhibe ederler.

Eksemestan, Formestan, Anastrozol, Letrozol: Esas olarak **postmenopozal hormon reseptörü pozitif kadınlarda meme kanserinin tedavisi**nde kullanılırlar.



https://www.biorender.com/template/tamoxifen-mechanism-of-action-in-breast-cancer Erişim Tarihi: 17.11.2024)



5/21/2023 SİNAN ŞERMET Smith 2008; https://www.uspharmacist.com/article/the-third-generation-aromatase-inhibitors (Erişim Tarihi: 19.11.2024) 14

من الدرس **سلايد 14** 2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

ISU ISTINYE UNIVERSITY İSTANBUL

2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

2. Antiöstrojenler:

2.1. Seçici Östrojen Reseptör Modülatörleri (SERM'ler): tamoksifen, toremifen, raloksifen. Bu ilaçlar hedef hücrelerde östrojen reseptörlerini kompetitif (yarışarak) bloke ederler ve seçici östrojen reseptör modülatörleri (hem östrojenik hem anti-östrojenik etki) olarak isimlendirilirler.

Tamoksifen: Östrojenik aktivitesi olan bir östrojen antagonistidir ve seçici östrojen reseptör modülatörü (SERM) olarak sınıflandırılır. Özel durumlarda (ör. yüksek ERBB2/HER2 aktivitesi) tamoksifen-ÖR kompleksi ko-aktivatör proteinleri bağlayarak agonistik etkiye yol açar.

Östrojen reseptörü pozitif (ÖR (+)) meme kanseri tedavisinde ilk basamak ilaç olarak kullanılır. Ayrıca yüksek riskli kadınlarda meme kanseri oluşumunu azaltmada profilaktik olarak da kullanılır.


Yan Etkileri: sıcak basması, bulantı, kusma, deri döküntüsü ve vajinal kanama, hiperkalsemidir. Kemiğe metastaz varsa ağrıya yol açabilir. Endometriyal kanser oluşturma riski vardır. Tromboemboli ve görme bozukluğu yapabilir.

Raloksifen: Östrojen reseptör modülatörüdür (SERM). Rahim ve meme dokusunda östrojen etkileri bloke eder. Oral kullanılır. Menopoz sonrası kadınlarda östrojen reseptörü pozitif invazif göğüs kanseri riskini azaltmak için kullanılır. Başlıca yan etkileri; sıcak basması, artralji ve miyaljidir.


Fulvestrant: Hormon reseptörü pozitif metastatik meme kanseri hastalarında kas içi enjeksiyon şeklinde verilir. (SERD: seçici östrojen reseptör indirgeyici) Östrojen reseptör antagonistidir. Östrojen agonistik etkinliği yoktur.

2.2. Aromataz İnhibitörleri: Over ve over dışı dokularda androjenik nitelikteki östradiol prekürsörlerinin östradiole dönüşümünü katalize eden «aromataz enzimini» inhibe ederler.

Eksemestan, Formestan, Anastrozol, Letrozol: Esas olarak **postmenopozal hormon reseptörü pozitif kadınlarda meme kanserinin tedavisi**nde kullanılırlar.



https://www.biorender.com/template/tamoxifen-mechanism-of-action-in-breast-cancer Erişim Tarihi: 17.11.2024)



5/21/2023 SİNAN ŞERMET Smith 2008; https://www.uspharmacist.com/article/the-third-generation-aromatase-inhibitors (Erişim Tarihi: 19.11.2024) 14

K6-22 Kurul 2021–2022 • Soru 64

B21-2 Bütünleme 2020–2021 · Soru 64 في كمان جه

الإجابة **E** Fulvestrant

64- Beş yıl önce, 54 yaşında bir kadına hormon pozitif meme kanseri teşhisi konuyor. Radikal mastektomi ardından altı kemoterapi döngüsü uygulanıyor. O zamandan beri tamoksifen ile hormonal tedavi görüyor. Bilgisayarlı tomografi taramasında çoklu akciğer metastazı saptanan hastanın tamoksifen kesiliyor. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi bir estrojen reseptör antagonisti olup tamoksifen yerine başlatılmıştır?

a) Anastrazol
b) Danazol
c) Löprolid
d) Mifepriston
e) Fulvestrant ✓

Soru 52 1 puan

Elli yaşında pozitif mamogramısı olan kadın hastada, küçük bir karsinom çıkarılarak inceleniyor. Estrojen ve projesteron reseptör pozitif ise aşağıdaki ilaçlardan hangisini alabilir?

En az bir doğru yanıt seçin

- A Klomifen
- B Löprolid
- C Tamoksifen ✓ *Doğru yanıt*
- D Etinil estradiol
- E Mitotan

K6-21 Kurul 2020–2021 • Soru 52

اتسأل بصيغ مختلفة في 5 امتحانات

الإجابة **C Tamoksifen**

من الدرس 2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri **سلايد 14**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

2. Antiöstrojenler:

2.1. Seçici Östrojen Reseptör Modülatörleri (SERM'ler): tamoksifen, toremifen, raloksifen. Bu ilaçlar hedef hücrelerde östrojen reseptörlerini kompetitif (yarışarak) bloke ederler ve seçici östrojen reseptör modülatörleri (hem östrojenik hem anti-östrojenik etki) olarak isimlendirilirler.

Tamoksifen: Östrojenik aktivitesi olan bir östrojen antagonistidir ve seçici östrojen reseptör modülatörü (SERM) olarak sınıflandırılır. Özel durumlarda (ör. yüksek ERBB2/HER2 aktivitesi) tamoksifen-ÖR kompleksi ko-aktivatör proteinleri bağlayarak agonistik etkiye yol açar.

Östrojen reseptörü pozitif (ÖR (+)) meme kanseri tedavisinde ilk basamak ilaç olarak kullanılır. Ayrıca yüksek riskli kadınlarda meme kanseri oluşumunu azaltmada profilaktik olarak da kullanılır.


Yan Etkileri: sıcak basması, bulantı, kusma, deri döküntüsü ve vajinal kanama, hiperkalsemidir. Kemiğe metastaz varsa ağrıya yol açabilir. Endometriyal kanser oluşturma riski vardır. Tromboemboli ve görme bozukluğu yapabilir.

Raloksifen: Östrojen reseptör modülatörüdür (SERM). Rahim ve meme dokusunda östrojen etkileri bloke eder. Oral kullanılır. Menopoz sonrası kadınlarda östrojen reseptörü pozitif invazif göğüs kanseri riskini azaltmak için kullanılır. Başlıca yan etkileri; sıcak basması, artralji ve miyaljidir.


Fulvestrant: Hormon reseptörü pozitif metastatik meme kanseri hastalarında kas içi enjeksiyon şeklinde verilir. (SERD: seçici östrojen reseptör indirgeyici) Östrojen reseptör antagonistidir. Östrojen agonistik etkinliği yoktur.

2.2. Aromataz İnhibitörleri: Over ve over dışı dokularda androjenik nitelikteki östradiol prekürsörlerinin östradiole dönüşümünü katalize eden «aromataz enzimini» inhibe ederler.

Eksemestan, Formestan, Anastrozol, Letrozol: Esas olarak **postmenopozal hormon reseptörü pozitif kadınlarda meme kanserinin tedavisi**nde kullanılırlar.



https://www.biorender.com/template/tamoxifen-mechanism-of-action-in-breast-cancer Erişim Tarihi: 17.11.2024)



5/21/2023 SİNAN ŞERMET Smith 2008; https://www.uspharmacist.com/article/the-third-generation-aromatase-inhibitors (Erişim Tarihi: 19.11.2024) 14

83 - Aşağıdaki antiandrojenlerden hangisi androjen reseptör antagonistidir ve prostat kanserinin tedavisinde kullanılır?

a) Flutamid (Doğru) ✓
b) Abirateron asetat
c) Finasterid
d) Goserelin
e) Löprolid

F20 Final 2019–2020 • Soru 83

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

الإجابة **A** Flutamid

من الدرس 2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri **سلايد 15**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

3. Progestojenler (Progestinler): Progesteron benzeri etkisi olan sentetik hormonal ilaçlardır. Antiöstrojenik etkinlikleri vardır, endometriyum kanserinin tedavisinde kullanılırlar.

Endometriyum kanserinin oluşmasında aşırı östrojenik etkinlik olduğu belirtilmektedir. Östrojenlerin endometriyumda proliferatif etkinlikleri vardır, progestinler ise endometriyumun olgunlaşmasını ve apoptozu sağlarlar.

Meme kanseri tedavisinde de kullanılırlar. Prostat kanserinde kısıtlı etkinlikleri vardır.


Antineoplastik amaçlı olarak en sık kullanılan progestinler; oral «**megestrol asetat**», «**noretisteron**» ve i.m. «**medroksiprogesteron asetat**». Bu ilaçların antiandrojenik etkinlikleri de bulunmaktadır. Kansere bağlı anoreksi ve kaşeksinin tedavisinde kullanılabilirler.

4. Antiandrojenler:

Flutamid, Nilutamid ve Bikalutamid: Prostat kanserinin tedavisinde kullanılan sentetik, steroid olmayan anti-androjenlerdir (**androjen reseptör antagonistler**).

Hedef hücrelerdeki androjen (testosteron) reseptörüne bağlanarak, doğal hormonun çekirdeğe translokasyonunu engeller ve testosteronun etkisi bloke ederler. Oral olarak alınır ve böbrek yoluyla atılırlar. Flutamid günde 3 kez diğerleri ise günde 1 kez alınır.

Enzalutamid: Daha önce dosetaksel tedavisi görmüş kastrasyona dirençli metastatik prostat kanserinde kullanılır.



Lipincott's Illustrated Pharmacology Reviews

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 15

16) Uzun süre düzenli olarak tedavi dozunda prednizolon kullanımı aşağıdakilerden hangisi ile sonuçlanabilir?

a) Kemik yoğunluğunda azalma ✓
b) Anemi
c) Serum kalsiyum düzeyinde yükselme
d) Adrenal kortekste zona fasikülata ve zona retükülaris de hiperplazi
e) Kadınlarda erkek tipi kıllanmada artış

F19 Final 2018–2019 • Soru 16

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

الإجابة

A Kemik yoğunluğunda azalma

من الدرس **سلايد 13** 2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

1. Glukokortikoidler:

Lenfoid dokuda proliferasyonu inhibe eder ve «**lenfolitik**» etki yaparlar. Mezenkimal dokunun proliferasyonunu engellerler. Antiproliferatif, apoptotik.

Glukokortikoidler; **akut lenfoblastik lösemi (ALL)** veya **akut farklılaşmamış lösemiler**, **Hodgkin ve Hodgkin-dışı (Non-Hodgkin) lenfomalar** ve **multipl miyeloma** tedavisinde kullanılırlar.

Bununla birlikte diğer antineoplastik ilaçların neden olduğu bulantı ve kusma (emezis), trombositopenide damar stabilizasyonu, hepatotoksik ilaçların neden olduğu karaciğer harabiyetine karşı karaciğeri koruyucu olarak, radyoterapi ve tanı sırasında tümöre bağlı ödemin sorun yarattığı durumlarda tümöre bağlı ödemin giderilmesi, antineoplastik ilaçlara bağlı alerji-anafilaksinin giderilmesi, fibrozisin önlenmesi amacıyla tedavide kullanılırlar.

Bu grupta en sık **prednizolon**dur. Antineoplastik tedavide bu ilaçlar **yüksek dozlarda** kullanılır.

Yüksek dozlarda yan tesirleri de şiddetlenir; su ve tuz tutulması, hiperglisemi, gastrik irritasyon, aydede yüz, hipertansiyon, osteoporoz immünsüpresyon ve enfeksiyona eğilim bu yan tesirlerden bazılarıdır. Ciddi sonuçlar doğuran adrenal korteks atrofisi de yaparlar.

Hiperglisemi, hiperlipidemi, pankreatit, duygudurum değişikliği, katarakt ve osteoporozdur.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 13

آخر الملف

للمراجعة

13 أسئلة مش متأكد إنها تبع الدرس ده بنسبة 100%، أو تبعه بس ملهاش إجابة في ملف الشرح.

من محاضرة تانية

السؤال جاي من مادة أو محاضرة تانية، بس إجابته موجودة في سلايدات الدرس ده.

مفيش إجابة في الشرح

السؤال تبع موضوع الدرس، بس ملف الشرح مفيهوش إجابته، فمحطوط من غير إجابة.

44. **50 yaşında bir erkek hasta 6 aydır romatoid artrit tedavisi için oral prednizolon tedavisi almakta ve hastalık prognozu iyi seyretmektedir. Aşağıdaki yan etkilerden hangisinin bu hastada görülmesi "en az olasıdır"?**

A) Hipotansiyon ✓

B) Enfeksiyon riskinde artış

C) Gastrointestinal kanalda irritasyon ve ülser

D) Osteoporoz

E) Glokom

K6-26 Kurul 2025–2026 · Soru 44

اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده من محاضرة الكورتيكوستيرويدات في كورول 6. سلايد 13 هنا بيعدّ آثار البريدنيزولون الجانبية: ارتفاع الضغط (مش هبوطه)، وهشاشة العظام، وتهيج المعدة، والعدوى. فالأقل احتمالاً هو هبوط الضغط.

الإجابة **A Hipotansiyon**

من الدرس **سلايد 13** 2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

1. Glukokortikoidler:

Lenfoid dokuda proliferasyonu inhibe eder ve «**lenfolitik**» etki yaparlar. Mezenkimal dokunun proliferasyonunu engellerler. Antiproliferatif, apoptotik.

Glukokortikoidler; **akut lenfoblastik lösemi (ALL)** veya **akut farklılaşmamış lösemiler**, **Hodgkin ve Hodgkin-dışı (Non-Hodgkin) lenfomalar** ve **multipl miyeloma** tedavisinde kullanılırlar.

Bununla birlikte diğer antineoplastik ilaçların neden olduğu bulantı ve kusma (emezis), trombositopenide damar stabilizasyonu, hepatotoksik ilaçların neden olduğu karaciğer harabiyetine karşı karaciğeri koruyucu olarak, radyoterapi ve tanı sırasında tümöre bağlı ödemin sorun yarattığı durumlarda tümöre bağlı ödemin giderilmesi, antineoplastik ilaçlara bağlı alerji-anafilaksinin giderilmesi, fibrozisin önlenmesi amacıyla tedavide kullanılırlar.

Bu grupta en sık **prednizolon**dur. Antineoplastik tedavide bu ilaçlar **yüksek dozlarda** kullanılır.

Yüksek dozlarda yan tesirleri de şiddetlenir; su ve tuz tutulması, hiperglisemi, gastrik irritasyon, aydede yüz, hipertansiyon, osteoporoz, immünsüpresyon ve enfeksiyona eğilim bu yan tesirlerden bazılarıdır. Ciddi sonuçlar doğuran adrenal korteks atrofisi de yaparlar.

Hiperglisemi, hiperlipidemi, pankreatit, duygudurum değişikliği, katarakt ve osteoporozdur.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 13

54

60 yaşındaki bir kadın hasta hafif seyreden romatoid artrit tedavisi için prednizolon kullanmaktadır. Hastanın bu ilacı kullanmasına bağlı olarak aşağıdaki yan etkilerden hangisinin görülmesi **en az olasıdır**?

- ✓ **A)** Hipotansiyon
- **B)** Hiperglisemi
- **C)** Osteoporoz
- **D)** Gastrointestinal kanalda irritasyon
- **E)** Glokom

K6-25 Kurul 2024–2025 • Soru 54

اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده من محاضرة الكورتيكوستيرويدات في كورول 6. سلايد 13 هنا بيقول إن البريدنيزولون بيعمل ارتفاع ضغط وارتفاع سكر وتهيج معدة وهشاشة عظام، فالأقل احتمالاً هو هبوط الضغط.

الإجابة **A** Hipotansiyon

من الدرس **سلايد 13** 2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

1. Glukokortikoidler:

Lenfoid dokuda proliferasyonu inhibe eder ve «**lenfolitik**» etki yaparlar. Mezenkimal dokunun proliferasyonunu engellerler. Antiproliferatif, apoptotik.

Glukokortikoidler; **akut lenfoblastik lösemi (ALL)** veya **akut farklılaşmamış lösemiler**, **Hodgkin ve Hodgkin-dışı (Non-Hodgkin) lenfomalar** ve **multipl miyeloma** tedavisinde kullanılırlar.

Bununla birlikte diğer antineoplastik ilaçların neden olduğu bulantı ve kusma (emezis), trombositopenide damar stabilizasyonu, hepatotoksik ilaçların neden olduğu karaciğer harabiyetine karşı karaciğeri koruyucu olarak, radyoterapi ve tanı sırasında tümöre bağlı ödemin sorun yarattığı durumlarda tümöre bağlı ödemin giderilmesi, antineoplastik ilaçlara bağlı alerji-anafilaksinin giderilmesi, fibrozisin önlenmesi amacıyla tedavide kullanılırlar.

Bu grupta en sık **prednizolon**dur. Antineoplastik tedavide bu ilaçlar **yüksek dozlarda** kullanılır.

Yüksek dozlarda yan tesirleri de şiddetlenir; su ve tuz tutulması, hiperglisemi, gastrik irritasyon, aydede yüz, hipertansiyon, osteoporoz, immünsüpresyon ve enfeksiyona eğilim bu yan tesirlerden bazılarıdır. Ciddi sonuçlar doğuran adrenal korteks atrofisi de yaparlar.

Hiperglisemi, hiperlipidemi, pankreatit, duygudurum değişikliği, katarakt ve osteoporozdur.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 13

51. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi glukokortikoidler için <u>yanlıştır</u>?

A) Sentetik glukokortikoidler, doğal glukokortikoidlerin mineralokortikoid etkilerini artırmak amacıyla geliştirilmiştir

B) Glukokortikoidler hiperglisemiye neden olur

C) Glukokortikoidlerin antianabolik ve katabolik etkileri vardır

D) Glukokortikoidler güçlü antiinflamatuar, antialerjik ve immünosüpresif etkilere sahiptir

E) Prednizolon sentetik bir glukokortikoiddir

K6-24 Kurul 2023–2024 · Soru 51

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

السؤال ده عن الجلوكوكورتيكويدات عموماً (من محاضرة الكورتيكوستيرويدات في كورول 6، وموجود كمان في درس 12). سلايد 13 هنا بيقول إن أشهرهم البريدنيزولون وإنهم بيعملوا ارتفاع سكر (يعني B و E صح)، بس مفيش كلام عن التأثير المينرالوكورتيكويد. الغلط هو A: الجلوكوكورتيكويدات الصناعية اتعملت عشان تقلّل التأثير المينرالوكورتيكويد مش تزوّده.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

58. **Aşağıda verilen antidiyareik ilaçlardan hangisi yüksek dozlarda vagotomi ve dumping sendromu sonucu oluşan diyareye karşı etkilidir?**

A) Oktreotit
B) Loperamid
C) Difenoksilat
D) Bizmut subsalisilat
E) Eluksadolin

K5-24 Kurul 2023–2024 · Soru 58

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح
الأوكتريوتيد متشرح في سلايد 19 (أورام الغدة النخامية، الكارسينويد، دوالي المريء، القيء...)، بس استخدامه في إسهال الـ dumping مش مكتوب.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

ملاحظات

76- Aşağıdaki ilaçlardan hangisi osteoporoz tedavisinde kullanılan bir selektif östrogen reseptör modulatörüdür (SERM)?

a) Raloksifen
b) Bisfosfonat
c) Strontyium
d) Östradiol
e) Denosumab

BF23 Bahar Final 2022–2023 • Soru 76

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده من محاضرة أدوية هشاشة العظام.
بس سلايد 14 هنا بيقول صراحة إن
الرالوكسيفين من مجموعة الـ SERM.

الإجابة **A** Raloksifen

من الدرس **سلايد 14** 2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

2. Antiöstrojenler:

2.1. Seçici Östrojen Reseptör Modülatörleri (SERM'ler): **tamoksifen, toremifen, raloksifen** Bu ilaçlar hedef hücrelerde östrojen reseptörlerini kompetitif (yarışarak) bloke ederler ve seçici östrojen reseptör modülatörleri (hem östrojenik hem anti-östrojenik etki) olarak isimlendirilirler.

Tamoksifen: Östrojenik aktivitesi olan bir östrojen antagonistidir ve seçici östrojen reseptör modülatörü (SERM) olarak sınıflandırılır. Özel durumlarda (ör. yüksek ERBB2/HER2 aktivitesi) tamoksifen-ÖR kompleksi ko-aktivatör proteinleri bağlayarak agonistik etkiye yol açar.

Östrojen reseptörü pozitif (ÖR (+)) meme kanseri tedavisinde ilk basamak ilaç olarak kullanılır. Ayrıca yüksek riskli kadınlarda meme kanseri oluşumunu azaltmada profilaktik olarak da kullanılır.


Yan Etkileri: sıcak basması, bulantı, kusma, deri döküntüsü ve vajinal kanama, hiperkalsemidir. Kemiğe metastaz varsa ağrıya yol açabilir. Endometriyal kanser oluşturma riski vardır. Tromboemboli ve görme bozukluğu yapabilir.

Raloksifen: Östrojen reseptör modülatörüdür (SERM). Rahim ve meme dokusunda östrojen etkileri bloke eder. Oral kullanılır. Menopoz sonrası kadınlarda östrojen reseptörü pozitif invazif göğüs kanseri riskini azaltmak için kullanılır. Başlıca yan etkileri; sıcak basması, artralji ve miyaljidir.


Fulvestrant: Hormon reseptörü pozitif metastatik meme kanseri hastalarında kas içi enjeksiyon şeklinde verilir. (SERD: seçici östrojen reseptör indirgeyici) Östrojen reseptör antagonistidir. Östrojen agonistik etkinliği yoktur.

2.2. Aromataz İnhibitörleri: Over ve over dışı dokularda androjenik nitelikteki östradiol prekürsörlerinin östradiole dönüşümünü katalize eden «aromataz enzimini» inhibe ederler.

Eksemestan, Formestan, Anastrozol, Letrozol: Esas olarak **postmenopozal hormon reseptörü pozitif kadınlarda meme kanserinin tedavisi**nde kullanılırlar.



https://www.biorender.com/template/tamoxifen-mechanism-of-action-in-breast-cancer Erişim Tarihi: 17.11.2024)



Smith 2008; https://www.uspharmacist.com/article/the-third-generation-aromatase-inhibitors (Erişim Tarihi: 19.11.2024)

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 14

77- Aşağıdaki ilaçlardan hangisi adrenal tümöre bağlı Cushing sendromlu kırk altı yaşındaki erkek hasta için uygun tedavi seçeneğidir?

a) Betametazon
b) Kortizol
c) Fludrokortizon
d) Mitotan
e) Flutikazon

BF23 Bahar Final 2022–2023 · Soru 77

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده من محاضرة أدوية الغدة الكظرية في فاينال الترم التاني. بس سلايد 8 هنا بيقول إن الميتوتان بيموّت خلايا قشرة الكظر، وبيتستخدم في سرطان قشرة الكظر المتقدم وفي علاج متلازمة كوشينج.

الإجابة **D** Mitotan

من الدرس 1. Farklı Etki Mekanizmalı İlaçlar **سلايد 8**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

1. Farklı Etki Mekanizmalı İlaçlar

Mitotan: Adrenolitik etkili. Adrenal korteksin zona fasciculata ve zona retikularis bölgelerinde seçici nekroz yapar. Sadece ilerlemiş veya ameliyat edilemeyen adrenokortikal kanserlerde ve Cushing sendromunun tedavisinde kullanılır.

Endoplazmik retikulum stresi oluşturarak ve apoptoz yolağını aktive ederek, tümör hücrelerinin ölümü ve steroid üretiminin baskılanması.

Ağız yolundan verilir, temel olarak böbrek üstü bezi mitokondrisinde α-hidroksilasyon ve β-hidroksilasyon ile metabolize edilir.

Yan Etkileri: ishal, bulantı, kusma, anoreksi ve mukozit. Yüksek dozlarda MSS'e etki ve polinöropati.

Trabektedin: DNA yapısını bozarak sitotoksik etkinliğe neden olur. Yumuşak doku sarkomlarında ve platin duyarlı over kanserlerinde onaylanmıştır.

Hepatoksik ve güçlü emetik etkinliği (önlemek için deksametazon ile birlikte verilir) vardır.

Estramustin: Bir östrojenle alkilleyici ilacın (mekloretamin) kimyasal kombinasyonudur. Hem hormonal (testosteron düzeyinin azaltılması) hem de alkilleyici (antimitotik) etki yapar. Mikrotübül inhibe edici etkisi de bulunmaktadır.

Prostat kanserinin tedavisinde oral kullanılır.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 8

72- Aşağıdaki ilaçlardan hangisi overi baskılayarak östrojen ve progesteron konsantrasyonlarını azaltır, dolayısıyla, siklik değişiklikleri önler ve bu nedenle, endometriozis tedavisinde kullanılmaktadır?

a) Löprolid ✓
b) Avanafil
c) Miglitol
d) Mekasermin rinfabat
e) Fludrokortizon

K6-23 Kurul 2022–2023 · Soru 72

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده من محاضرة الهرمونات الجنسية في كورول 6. سلايد 17 هنا بيقول إن اللوبروليد شبيه الـ GnRH وإنه مفيد في بطانة الرحم المهاجرة (endometriozis)، وسلايد 16 بيقول إن استعماله المستمر بيقلل الـ LH والإستروجين.

الإجابة **A** Löprolid

من الدرس **سلايد 17** 2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

5. GnRH Analogları: GnRH; hipotalamus tarafından salgılanır ve ön hipofizi uyararak gonadotropik hormonları salgılatır;

Uzun etki süreli sentetik GnRH analogları; uygulamada geçici stimülasyondan sonra, hipofizde desentiziasyona (duyarsızlaşmaya) ve gonadotropin salgılanmasının durmasına neden olur.

Löprolid, Goserelin, Triptorelin: GnRH (gonadotropin salıverici hormon)'ın sentetik analoglarıdır, Bu ilaçlar kadınlarda meme kanseri ve endometriyozisde yararlıdır, Prostat kanserinde kullanılırlar, bu endikasyonda östrojen türevlerinin yerini almıştır.

Löprolid:

(a) Sürekli salınımlı intradermal implant

(b) Deri altı depo enjeksiyon

(c) Kas içine depo enjeksiyon şeklinde kullanılır.

Goserelin asetat: deri altına implant, Triptorelin pamoat: kas içine enjeksiyon suretiyle kullanılır.

Başlangıçta androjen düzeylerinde yükselmeye, sonrasında ise konsantrasyon seviyelerinde düşmeye neden olabilir.

Yan Etkileri: iktidarsızlık, sıcak basması, östrojen tedavisi ile yaşananlara kıyasla en az düzeydedir.

Prostate Cancer



https://www.centerforurologiccare.com/patient-education/prostate-cancer/ (Erişim Tarihi: 17.11.2024)

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 17

من الدرس **سلايد 16** 2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri


ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

5. GnRH Analogları: GnRH; hipotalamus tarafından salgılanır ve ön hipofizi uyararak gonadotropik hormonları salgılatır;

1. Luteinize Edici Hormon (LH): Kadınlarda ani bir artışla ovulasyonu başlatır ve korpus luteumun (sarı cisimcik) büyümesini sağlar. Erkeklerde ise testosteron salgılanmasını uyarır.

2. Folikül Uyarıcı Hormon (FSH): Kadınlarda yumurta üretimini kontrol etmeye ve yumurtalık rezervlerini düzenlemeye yardımcı olur FSH miktarı, bir kadının adet döngüsü boyunca değişir ve yumurta salınmadan hemen önce en yüksek seviyeye ulaşır. Erkeklerde FSH, sperm üretimini kontrol etmeye yardımcı olur.



5/21/2023 SİNAN ŞERMET 16

Soru 44 1 puan

Otuz dört yaşındaki bir erkek, son 2 gündür uzun süren yoğun sulu diyare nedeniyle hastaneye kaldırılıyor. Pankreas tümörü saptanan hastada radyoimmün assay testi ile vipoma tanısı doğrulanıyor. Hastanın diyaresini kontrol altına almak için aşağıdaki ilaçlardan hangisi uygundur?

En az bir doğru yanıt seçin

- A Somatotropin
- B ACTH
- C Oktreotid ✓ *Doğru yanıt*
- D Kabergolin
- E Degareliks

K6-21 Kurul 2020–2021 • Soru 44

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده من محاضرة الغدد في كورول 6. الـ VIPoma ورم نيوروإندوكرين في البنكرياس، وسلايد 19 هنا بيقول إن الأوكتريوتيد بيتستخدم في علاج الأورام النيوروإندوكرين زي الكارسينويد.

الإجابة **C Oktreotid**

من الدرس **سلايد 19** 2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

8. Somatostatin Analogları: Somatostatin; hipotalamustan salgılanan ve ön hipofizden büyüme hormonu (GH) salgılanmasını inhibe eden bir hormondur.

Lanreotid ve Oktreotid: Somatostatin'in analoglarıdır. Büyüme hormonu salgılayan hipofiz tümörlerinin (ör. akromegali) tedavisinde ve karsinoid tümör gibi nöroendokrin tümörlerin tedavisinde kullanılırlar.

Lanreotid i.v. infüzyon veya depo jel preparatı şeklinde cilt altına derin enjeksiyonla uygulanır.

Okreotid ayrıca; TSH salgılayan hipofiz adenomlarının tedavisi, pankreas cerrahisinde komplikasyonların önlenmesi, özofagus varislerinin kanamalarının önlenmesi ve yaşlılarda palyatif bakımda kusmaların tedavisinde kullanılır.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 19

Soru 50 1 puan

Elli beş yaşında kadın hasta, artan kas güçsüzlüğü, kaygı ve duygusal kontrol kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılıyor. Fizik muayenede karın bölgesinde yağ birikimi, ciltte incelme ve kolay morarma saptanıyor. Kemik röntgeninde osteoporoz gözleniyor. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi uzun süreli kullanıldığı için büyük olasılıkla hastanın belirti ve semptomlarına neden olmuştur?

En az bir doğru yanıt seçin

- A Metotreksat
- B Miferiston
- C Deksametazon ✓ *Doğru yanıt*
- D Spirinolakton
- E Kortikotropin

K6-21 Kurul 2020–2021 · Soru 50

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده من محاضرة الكورتيكوستيرويدات في كورول 6 (وموجود كمان في درس 12). سلايد 13 هنا بيقول إن الجلوكوكورتيكويدات بالجرعات العالية بتعمل وش قمري (aydede yüz)، هشاشة عظام، وتغيّر في المزاج — وده وصف الحالة بالظبط. والديكساميثازون جلوكوكورتيكويد.

الإجابة **C Deksametazon**

من الدرس 2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri **سلايد 13**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

1. Glukokortikoidler:

Lenfoid dokuda proliferasyonu inhibe eder ve «**lenfolitik**» etki yaparlar. Mezenkimal dokunun proliferasyonunu engellerler. Antiproliferatif, apoptotik.

Glukokortikoidler; **akut lenfoblastik lösemi (ALL)** veya **akut farklılaşmamış lösemiler**, **Hodgkin ve Hodgkin-dışı (Non-Hodgkin) lenfomalar** ve **multipl miyeloma** tedavisinde kullanılırlar.

Bununla birlikte diğer antineoplastik ilaçların neden olduğu bulantı ve kusma (emezis), trombositopenide damar stabilizasyonu, hepatotoksik ilaçların neden olduğu karaciğer harabiyetine karşı karaciğeri koruyucu olarak, radyoterapi ve tanı sırasında tümöre bağlı ödemin sorun yarattığı durumlarda tümöre bağlı ödemin giderilmesi, antineoplastik ilaçlara bağlı alerji-anafilaksinin giderilmesi, fibrozisin önlenmesi amacıyla tedavide kullanılırlar.

Bu grupta en sık **prednizolon**dur. Antineoplastik tedavide bu ilaçlar **yüksek dozlarda** kullanılır.

Yüksek dozlarda yan tesirleri de şiddetlenir; su ve tuz tutulması, hiperglisemi, gastrik irritasyon, aydede yüz, hipertansiyon, osteoporoz, immünsüpresyon ve enfeksiyona eğilim bu yan tesirlerden bazılarıdır. Ciddi sonuçlar doğuran adrenal korteks atrofisi de yaparlar.

Hiperglisemi, hiperlipidemi, pankreatit, duygudurum değişikliği, katarakt ve osteoporozdur.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 13

11-12. sorular; aşağıdaki olguya göre cevaplandırılacaktır:

OLGU: 58 yaşındaki post menapozal kadının kemik yoğunluğu (dansitesi) DEXA (Dual enegy X-ray absorptiometry) ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar tüm bölgelerde yaygın ve belirgin düşük kemik mineral yoğunluğunu göstermiştir.

11. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin kronik kullanımının bu hastanın osteoporozuna katkıda bulunma olasılığı en yüksektir?

a) Lovastatin
b) Metformin
c) Prednizolon ✓
d) İbandronik asit
e) Tiazid Diüretik

K3-20 Kurul 2019–2020 · Soru 11

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

جه كمان في **K3-19** Kurul 2018–2019 · Soru 14

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده من محاضرة أدوية هشاشة العظام. سلايد 13 هنا بيقول إن أشهر كورتيزون مستعمل هو البريدنيزولون، وإن من آثاره الجانبية هشاشة العظام. ونفس السؤال بنفس الاختيارات اتسأل كمان في K3-19 (سؤال 14).

الإجابة **C Prednizolon**

من الدرس **سلايد 13** 2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

1. Glukokortikoidler:

Lenfoid dokuda proliferasyonu inhibe eder ve «**lenfolitik**» etki yaparlar. Mezenkimal dokunun proliferasyonunu engellerler. Antiproliferatif, apoptotik.

Glukokortikoidler; **akut lenfoblastik lösemi (ALL)** veya **akut farklılaşmamış lösemiler, Hodgkin ve Hodgkin-dışı (Non-Hodgkin) lenfomalar** ve **multipl miyeloma** tedavisinde kullanılırlar.

Bununla birlikte diğer antineoplastik ilaçların neden olduğu bulantı ve kusma (emezis), trombositopenide damar stabilizasyonu, hepatotoksik ilaçların neden olduğu karaciğer harabiyetine karşı karaciğeri koruyucu olarak, radyoterapi ve tanı sırasında tümöre bağlı ödemin sorun yarattığı durumlarda tümöre bağlı ödemin giderilmesi, antineoplastik ilaçlara bağlı alerji-anafilaksinin giderilmesi, fibrozisin önlenmesi amacıyla tedavide kullanılırlar.

Bu grupta en sık **prednizolon**dur. Antineoplastik tedavide bu ilaçlar **yüksek dozlarda** kullanılır.

Yüksek dozlarda yan tesirleri de şiddetlenir; su ve tuz tutulması, hiperglisemi, gastrik irritasyon, aydede yüz, hipertansiyon, osteoporoz, immünsüpresyon ve enfeksiyona eğilim bu yan tesirlerden bazılarıdır. Ciddi sonuçlar doğuran adrenal korteks atrofisi de yaparlar.

Hiperglisemi, hiperlipidemi, pankreatit, duygudurum değişikliği, katarakt ve osteoporozdur.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 13

14) Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin kronik kullanımının bu hastanın osteoporozuna katkıda bulunma olasılığı en yüksektir?

a) Lovastatin
b) Metformin
c) Prednizolon
d) İbandronik asit
e) Tiazid Diüretik

K3-19 Kurul 2018–2019 · Soru 14

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

جه كمان في · K3-20 Kurul 2019–2020 Soru 11

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده من محاضرة أدوية هشاشة العظام. سلايد 13 هنا بيقول إن أشهر كورتيزون مستعمل هو البريدنيزولون، وإن من آثاره الجانبية هشاشة العظام. ونفس السؤال بنفس الاختيارات اتسأل كمان في K3-20 (سؤال 11).

الإجابة **C** Prednizolon

من الدرس **سلايد 13** 2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

1. Glukokortikoidler:

Lenfoid dokuda proliferasyonu inhibe eder ve «**lenfolitik**» etki yaparlar. Mezenkimal dokunun proliferasyonunu engellerler. Antiproliferatif, apoptotik.

Glukokortikoidler; **akut lenfoblastik lösemi (ALL)** veya **akut farklılaşmamış lösemiler, Hodgkin ve Hodgkin-dışı (Non-Hodgkin) lenfomalar** ve **multipl miyeloma** tedavisinde kullanılırlar.

Bununla birlikte diğer antineoplastik ilaçların neden olduğu bulantı ve kusma (emezis), trombositopenide damar stabilizasyonu, hepatotoksik ilaçların neden olduğu karaciğer harabiyetine karşı karaciğeri koruyucu olarak, radyoterapi ve tanı sırasında tümöre bağlı ödemin sorun yarattığı durumlarda tümöre bağlı ödemin giderilmesi, antineoplastik ilaçlara bağlı alerji-anafilaksinin giderilmesi, fibrozisin önlenmesi amacıyla tedavide kullanılırlar.

Bu grupta en sık **prednizolon**dur. Antineoplastik tedavide bu ilaçlar **yüksek dozlarda** kullanılır.

Yüksek dozlarda yan tesirleri de şiddetlenir; su ve tuz tutulması, hiperglisemi, gastrik irritasyon, aydede yüz, hipertansiyon, osteoporoz, immünsüpresyon ve enfeksiyona eğilim bu yan tesirlerden bazılarıdır. Ciddi sonuçlar doğuran adrenal korteks atrofisi de yaparlar.

Hiperglisemi, hiperlipidemi, pankreatit, duygudurum değişikliği, katarakt ve osteoporozdur.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 13

18. 47 yaşındaki bir erkek hastada akromegalinin belirti ve bulguları saptanmıştır. Radyolojik inceleme ile büyük hipofizer bir tümör belirlenmiştir. Cerrahi tedavi hastalığın kontrolünde kısmen etkili olmuştur. Bu aşamada farmakolojik tedavi için kullanıma olasılığı en yüksek olan ilaç hangisidir?

a) Kabergolin
b) Desmopresin
c) Löprorelin
d) Oktreotid ✓
e) Somatotrpin

K5-19 Kurul 2018–2019 · Soru 18


جه كمان في · Kurul 2019–2020 **K3-20** Soru 19

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده من محاضرة أدوية الغدة النخامية. سلايد 19 هنا بيقول إن الأوكتريوتيد بيتستخدم في أورام النخامية اللي بتفرز هرمون النمو (الأكروميجالي). ونفس السؤال بنفس الاختيارات اتسأل كمان في K3-20 (سؤال 19).

الإجابة **D** Oktreotid

من الدرس **سلايد 19** 2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri



19. 47 yaşındaki bir erkek hastada akromegalinin belirti ve bulguları saptanmıştır. Radyolojik inceleme ile büyük hipofizer bir tümör belirlenmiştir. Cerrahi tedavi hastalığın kontrolünde kısmen etkili olmuştur. Bu aşamada farmakolojik tedavi için kullanıma olasılığı en yüksek olan ilaç hangisidir?

a) Kabergolin
b) Desmopresin
c) Löprorelin
d) Oktreotid ✓
e) Somatotropin

K3-20 Kurul 2019–2020 • Soru 19

K5-19 Kurul 2018–2019 · Soru 18 في كمان جه

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده من محاضرة أدوية الغدة النخامية. سلايد 19 هنا بيقول إن الأوكتريوتيد بيتستخدم في أورام النخامية اللي بتفرز هرمون النمو (الأكروميجالي). ونفس السؤال بنفس الاختيارات اتسأل كمان في K5-19 (سؤال 18).

الإجابة **D** Oktreotid

من الدرس **سلايد 19** 2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

8. Somatostatin Analogları: Somatostatin; hipotalamustan salgılanan ve ön hipofizden büyüme hormonu (GH) salgılanmasını inhibe eden bir hormondur.

Lanreotid ve Oktreotid: Somatostatin'in analoglarıdır. Büyüme hormonu salgılayan hipofiz tümörlerinin (ör. akromegali) tedavisinde ve karsinoid tümör gibi nöroendokrin tümörlerin tedavisinde kullanılırlar.

Lanreotid i.v. infüzyon veya depo jel preparatı şeklinde cilt altına derin enjeksiyonla uygulanır.

Okreotid ayrıca; TSH salgılayan hipofiz adenomlarının tedavisi, pankreas cerrahisinde komplikasyonların önlenmesi, özofagus varislerinin kanamalarının önlenmesi ve yaşlılarda palyatif bakımda kusmaların tedavisinde kullanılır.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 19