11

Aşılar ve Aşı Adjuvanları

Dr. Öğr. Üyesi Sinan ŞERMET

1 سؤال	1 أساسي
0 للمراجعة	1 امتحان

01 K26 · 17 Aşağıdaki aşılardan hangisi canlı bir aşıdır?

ملاحظات

17. **Aşağıdaki aşılardan hangisi canlı bir aşıdır?**

A) Kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı ✓
B) Hepatit A aşısı
C) Hepatit B aşısı
D) Difteri, tetanoz, aselüler boğmaca aşısı
E) Kuduz aşısı

K26 Kurul 2025–2026 • Soru 17

الإجابة

A Kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı

من الدرس Aşılar **سلايد 4**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

Aşılar

(1) Canlı Aşılar: Hastalık oluşturma güçleri azaltılmış, ancak vücutta çoğalabilme yeteneklerine sahip bakteri veya virüslerden oluşan aşılardır. Hastanın immün sistemine göre virülans kazanırlar. Hem hümoral hem de hücresel bağışıklık yanıt oluşmasını sağlarlar. Çok sayıda bellek hücresinin uyarılması sonucu genellikle ömür boyu bağışıklık kazanılır. Gebelikte canlı aşılar uygulanmaz (uygulamanın riski değerlendirilip uzman değerlendirmesi sonrası uygulanabilir).

BCG verem aşısı (canlı bakteri aşısı, s.c. uygulanır, çocukluk çağı aşı takviminde 2. ayın sonunda uygulanır, miliyer tüberküloz ve tüberküloz menenjiti gibi ciddi enfeksiyonları önler), lokal enjeksiyon bölgesi reaksiyonları, püstül, ülserasyon, lenfadenopati, lenfadenit gibi yan etkiler oluşturabilir.



https://www.acibadem.com.tr/ilgi-alani/kizamik/ (Erişim: 18.11.2025)

Tifo aşısı (immün yetmezlik ve gebelikte önerilmez, tifo ateşi önlemede seyahat aşısı),

Kolera aşısı (oral uygulanır, kolera salgını bulunan bölgelere seyahat durumunda),

Sarıhumma aşısı (Afrika ve Güney Amerika gibi sarıhumma görülen bölgelere seyahat durumunda koruma amaçlı uygulanır),

Kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı (canlı virüs aşısı) s.c., ülkemizde çocuklara 12. ayın sonu ve 48. ayda uygulanır, teratojenite riski gebelikte uygulanmaz, uygulama bölgesinde ağrı, tükürük bezlerinde şişlik, trombositopeni gibi yan etkiler)

Suçiçeği (varicella) aşısı: Canlı virüs aşısı, s.c. veya i.m., ülkemizde 12. ayın sonunda uygulanır, aşı yapılmamış ve suçiçeği geçirmemiş ≥13 yaşındaki çocuklara en az 28 gün arayla 2 doz aşı yapılmalıdır. Enjeksiyon bölgesinde lokal reaksiyonlar, döküntü, ateş gibi yan etkiler.



https://www.medicana.com.tr/sucicegi-nedir-sucicegi-hastaligi-kac-gun-surer/blog/23389 Erişim Tarihi: 18.11.2025)

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 4

من الدرس Aşılar **سلايد 6**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

Aşılar

(2) İnaktif Aşılar: Üreme ve çoğalma yetenekleri yoktur, ancak antijenik özellikleri korunmuştur. Hümoral immün yanıt oluştururlar. Hücresel immün yanıt ve IgA salgısına etkileri düşüktür. Antikor titreleri zamanla azalır, bu yeterli nedenle bağışıklık yanıtı oluşması için birkaç doz uygulanmaları gerekir.

İnaktif Polio Virüs aşısı (IPV, Salk Aşısı) (inaktif virüs aşısı, üç poliovirüs serotipi formalin ile inaktive edilerek hazırlanır, i.m. veya s.c., ülkemizde 2., 4., 6., 18. ve 48. ayın sonunda uygulanır, ciddi bir yan etkiye neden olmaz, nadiren anafilaksi)

İnfluenza aşısı (4 virüs suşundan oluşur (2A ve 2B virüsü), i.m., virüsün antijenik değişikliği nedeniyle her yıl aşı içeriği belirlenir, risk gruplarına uygulanması önerilir, yan etkileri enjeksiyon yerinde lokal reaksiyonlar, ses kısıklığı, gözlerde ağrı, kızarıklık veya kaşıntı, öksürük, ateş, miyalji, halsizlik, baş ağrısı)

Hepatit A aşısı (inaktif virüs aşısı) i.m., en erken 12. ayda uygulanır, ülkemizde çocuklara 18. ve 24. aylarda uygulanır, yan etkileri enjeksiyon yerinde lokal reaksiyonlar, iştahsızlık, halsizlik, baş ağrısı),

Hepatit B aşısı (i.m. uygulanır) ülkemizde doğumda, 1. ve 6. ayın sonunda uygulanır, enjeksiyon bölgesinde lokal reaksiyonlar ve ateşe neden olabilir),

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 6